

# Vacuna COVID-19

## Oxford /AstraZeneca



### Com actua?

- Utilitza un virus atenuat i modificat genèticament (adenovirus).
- Produeix immunitat a partir de la reacció del cos a les proteïnes del virus.
- Eficàcia del 59,5%, 7 dies després de la segona dosi.



### Presentació i conservació

- Vial multidosi amb 8 o 10 dosis de 0,5 ml.
- Mantenir entre els 2 °C i els 8 °C.
- No s'ha de congelar.
- 6 mesos de caducitat.
- No s'ha de diluir.



### A qui es pot administrar?

#### Indicada

- Des dels 18 anys fins a 56.


#### Contraindicada

- Majors de 56 anys
- Hipersensibilitat greu a alguna dosi



### Administració

- Intramuscular en el deltoides.
- Dues dosis de 0,5 ml.
- Interval entre dosis: 4 a 12 setmanes (28 – 84 dies).



### Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
  - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
  - Febre o febrícula
  - Fatiga
  - Maldecap
  - Calfreds
  - Nàusees
  - Dolor articular o muscular

Per a més informació, consulteu [canalsalut.gencat.cat/vacuna-astrazeneca](https://canalsalut.gencat.cat/vacuna-astrazeneca)

# Vacuna COVID-19 Pfizer/BioNTech



## Com actua?

- Utilitza ARN missatger basat en el genoma de la COVID-19.
- Produeix immunitat combinada: humoral i cel·lular.
- Eficàcia del 95%, 7 dies després de la segona dosi



## Presentació i conservació

- Vial multidosi amb unes 5 dosis de 0,3 ml.
- Cada vial s'ha de diluir amb 1,8 ml de sèrum salí al 0,9%.
- Conservar a -70 °C.
- Descongelar abans de la dilució.



## A qui es pot administrar?

### Indicada

- Des dels 16 anys.


### Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



## Administració

- Intramuscular.
- Dues dosis de 0,3 ml.
- Interval entre dosis: almenys 3 setmanes (21 dies).



## Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
  - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
  - Febre o febrícula
  - Fatiga
  - Maldecap
  - Calfreds
  - Nàusees
  - Dolor articular o muscular

Per a més informació, consulteu [canalsalut.gencat.cat/vacuna-pfizer](https://canalsalut.gencat.cat/vacuna-pfizer)

# Vacuna COVID-19 Moderna/Lonza



## Com actua?

- Utilitza ARN missatger basat en el genoma de la COVID-19.
- Produeix immunitat combinada: humoral i cel·lular.
- Eficàcia del 94,5%, 14 dies després de la segona dosi.



## Presentació i conservació

- Vial multidosi amb 10 dosis de 0,5 ml.
- Conservar entre -25 °C i -15 °C.
- Caducitat de 7 mesos.
- Es pot mantenir refrigerada 30 dies entre 2 °C i 8° C



## A qui es pot administrar?

### Indicada

- Des dels 16 anys.


### Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



## Administració

- Intramuscular en el deltoide o múscul vast de la cuixa.
- Dues dosis de 0,5 ml.
- Interval entre dosis: almenys 4 setmanes (28 dies)



## Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
  - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
  - Febre o febrícula
  - Fatiga
  - Maldecap
  - Calfreds
  - Nàusees
  - Dolor articular o muscular

Per a més informació, consulteu [canalsalut.gencat.cat/vacuna-moderna](https://canalsalut.gencat.cat/vacuna-moderna)