

Programa d'immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS) a Catalunya

Indicacions



Hospital

Infants nascuts **durant** la temporada de VRS
Protecció en nèixer



Abr. **Maig** **Juny** **Jul.** **Ag.** **Set.** **Oct.** **Nov.** **Des.** **Gen.** **Febr.** **Març**



CAP

Infants nascuts **abans** de la temporada de VRS
Campanya d'immunització abans de l'inici de l'epidèmia de VRS

Abr. **Maig** **Juny** **Jul.** **Ag.** **Set.** **Oct.** **Nov.** **Des.** **Gen.** **Febr.** **Març**



En **lactants i nadons d'alt risc**, l'administració es realitzarà al centre d'atenció primària o al centre hospitalari de referència (fins els 24 mesos, excepte en prematurs que és fins els 12 mesos).

Beyfortus® disposa de dues presentacions

Pes

Dosi

Color de la xeringa



< 5 kg

50 mg = 0,5 ml

Morat

≥ 5 kg

100 mg = 1 ml

Blau clar



S'administra en una única dosi de nirsevimab per via intramuscular (excepte en lactants fins a 24 mesos d'alt risc).



Conserveu entre 2°C i 8°C.
No ho agiteu ni exposeu a fonts de calor directes.
Protegir de la llum.



Tenint en compte les diferents presentacions del fàrmac i les indicacions, és imprescindible identificar correctament els productes a les neveres per evitar errors.

És obligatori el registre de totes les dosis administrades a Catalunya de nirsevimab, i es distribuirà a tots els centres d'atenció primària i hospitals públics i privats amb més de 50 naixements anuals. No es facilitarà als centres que no en garanteixin la correcta gestió i registre.

