

# Guia de codificació diagnòstica de l'atenció geriàtrica

Codificació de les síndromes geriàtriques. Conjunt mínim bàsic de dades d'atenció intermèdia (CMBD-AI).

**Servei Català de la Salut**

Febrer de 2024

/Salut

 **Generalitat  
de Catalunya**

## Índex

1. Introducció.....	3
2. Estat funcional i caigudes.....	4
3. Estat cognitiu i afectiu .....	6
3.1. Estat cognitiu .....	6
3.2. Estat afectiu .....	8
4. Situació social .....	9
5. Situació nutricional .....	10
5.1. Pèrdua de pes .....	10
5.2. Disfàgia.....	10
6. Son i disfunció sensorial.....	12
7. Integritat de la pell .....	13
7.1. Úlceres per pressió.....	13
7.2. Úlceres venoses .....	13
8. Hàbits intestinals i miccionals.....	15
8.1. Restrenyiment .....	15
8.2. Incontinència .....	15
9. Simptomatologia rellevant.....	17
10. Polifarmàcia.....	19

## 1. Introducció

El registre sistemàtic de la morbiditat atesa i de l'activitat assistencial de la xarxa sanitària de Catalunya és una eina imprescindible tant per als proveïdors com per a les administracions sanitàries. L'anàlisi d'aquesta informació pot ser una guia en la gestió dels centres, la millora de la qualitat assistencial, l'adequació de l'atenció i la definició de la cartera de serveis.

La utilització creixent de la informació clínica en l'atenció intermèdia fa imprescindible disposar d'una eina que serveixi per garantir a tots els centres el màxim rigor i la màxima homogeneïtat en la codificació dels diagnòstics i els procediments dels pacients. Aquest document pretén facilitar les instruccions necessàries per unificar els conceptes quant a la utilització de la informació diagnòstica i també per a una correcta codificació d'aquesta.

El document conté els diagnòstics més habituals atesos a l'atenció geriàtrica dins de l'àmbit de l'atenció intermèdia. Aquest document recull les instruccions de codificació de les principals síndromes geriàtriques i malalties neurodegeneratives que afecten les persones ateses en aquest àmbit. A cada apartat s'inclou el codi corresponent a la CIM-9-MC i la proposta de conversió a la CIM-10-MC.

És important tenir en compte que les correspondències exactes entre els codis de la CIM-10-MC poden variar a causa de factors com la lateralitat de la lesió o si la condició és aguda o crònica. Aquests detalls específics poden no quedar reflectits amb la mateixa exactitud en els codis de la CIM-9-MC. Actualment, en l'atenció intermèdia es manté l'ús de la codificació CIM-9-MC, però està previst un canvi a la codificació CIM-10-MC en un futur pròxim, el que proporcionarà una major especificitat i flexibilitat en la classificació de les malalties.

Per a la consulta d'altres diagnòstics que no apareguin en aquest document recomanem visitar l'enllaç següent: <https://catsalut.gencat.cat/ca/proveïdors-professionals/registres-catalegs/catalegs/diagnostics-procediments/cim-10-mc-scp/fitxers/taules-conversio/>.

## 2. Estat funcional i caigudes

L'estat funcional de les persones és un indicador important a l'hora de valorar la dependència del pacient. Un estat funcional deteriorat implica una major dependència en les activitats de la vida diària i limitacions en la mobilitat de les persones d'edat avançada. Aquesta informació és vital per a una avaluació acurada del risc i permet desenvolupar estratègies de prevenció i intervencions terapèutiques més adaptades i efectives per a cada cas. Les caigudes són també accidents freqüents en persones d'edat avançada o amb dependències funcionals i/o cognitives. És important codificar si la persona atesa té antecedents de caigudes prèvies. Cal codificar els antecedents de caigudes com a diagnòstic secundari.

### Situació funcional

Inclou: diagnòstics habituals de fragilitat, sarcopènia, hemiplegia, hemiparèsia i paràlisi.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Fragilitat i debilitat	S'aconsella identificar amb aquest codi pacients que hagin resultat positius a la valoració de fragilitat amb alguna escala validada, com un índex de fragilitat (IF-VIG).	Senilitat sense menció de psicosi	797		Debilitat física relacionada amb l'edat	R54
		Debilitat no especificada	799.3			
Sarcopènia		Altres trastorns musculars específics	728.3		Sarcopènia	M62.84
Hemiplegia i hemiparèsia	L'últim dígit correspon al costat afectat, per a més especificitat, consulteu el catàleg. "0": costat no especificat.	Hemiplegia flàccida que afecta un costat no especificat	342.00		Hemiplegia flàccida que afecta un costat no especificat	G81.00
		Hemiplegia espàstica que afecta un costat no especificat	342.10		Hemiplegia espàstica que afecta un costat no especificat	G81.10
		Hemiplegia no especificada que afecta un costat no especificat	342.90		Hemiplegia no especificada que afecta un costat no especificat	G81.90
		Hemiplegia que afecta un costat no especificat com a conseqüència de malaltia cerebrovascular	438.20		Cal codificar primer, si escau, la malaltia cerebrovascular que l'ha ocasionat.	Hemiplegia i hemiparèsia consecutives a malalties cerebrovasculars no especificades, que afecten un costat no especificat
Paràlisi		Paraplegia	344.1		Paraplegia no especificada	G82.20
		Quadriplegia no especificada	344.00		Quadriplegia no especificada	G82.50

### Caigudes

Inclou: antecedents de caigudes i risc de caiguda.

Els codis d'aquest apartat s'han d'incloure com a diagnòstics secundaris, segons la seva gravetat en relació amb altres comorbiditats.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Historial de caigudes		Antecedents personals de caiguda que presenten riscos per a la salut	V15.88		Antecedents de caiguda	Z91.81

### 3. Estat cognitiu i afectiu

#### 3.1. Estat cognitiu

##### Deteriorament cognitiu

Inclou: trastorns cognitius més comuns (demència, Alzheimer, etc.).

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Demència		Deterioració cognitiva lleu, així declarada	331.83		Deterioració cognitiva lleu, així declarada	G31.84
		Altres demències frontotemporals	331.19		Altres tipus de demència frontotemporal	G31.09
	Requereix codi addicional.	Demència amb cossos de Lewy	331.82		Demència amb cossos de Lewy	G31.83
		Demència vascular sense complicacions	290.40		Demència vascular sense alteració del comportament	F01.50
		Demència vascular amb delirium	290.41		Demència vascular, gravetat no especificada, amb agitació	F01.511
					Demència vascular, gravetat no especificada, amb altres tipus d'alteració del comportament	F01.518
		Demència no especificada, sense trastorn de conducta	294.20		Demència no especificada sense alteració del comportament	F03.90
	Demència no especificada, amb trastorn de conducta	294.21		Demència no especificada, gravetat no especificada, amb agitació	F03.911	
				Demència no especificada, gravetat no especificada, amb altres tipus d'alteració del comportament	F03.918	
Alzheimer		Malaltia d'Alzheimer	331.0	Requereix codi addicional.	Malaltia d'Alzheimer amb inici precoç	G30.0
					Malaltia d'Alzheimer amb inici tardà	G30.1
					Altres tipus de malaltia d'Alzheimer	G30.8
					Malaltia d'Alzheimer no especificada	G30.9
Altres		Malaltia de Pick	331.11		Malaltia de Pick	G31.01
	S'aconsella identificar pacients positius a la valoració de fragilitat amb alguna escala com un índex de fragilitat (IF-VIG).	Senilitat sense menció de psicosi	797		Deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat	R41.81

### Alteració de la consciència

Inclou: coma, alteració transitòria de la consciència, estat vegetatiu, estupor, inconsciència, somnolència, etc.

Alguns codis recomanats són NO FINALISTES. Cal cercar el codi finalista al catàleg corresponent.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Somnolència, estupor i coma		Coma	780.01	Codis NO FINALISTES. Cal consultar el catàleg corresponent.	<i>Coma no especificat, moment no especificat</i>	R40.20*
		Alteració transitòria de la consciència	780.02		<i>Alteració transitòria de la consciència, moment no especificat</i>	R40.4*
		Estat vegetatiu persistent	780.03		<i>Estat vegetatiu persistent, moment no especificat</i>	R40.3*
		Altres alteracions de la consciència	780.09		<i>Somnolència, moment no especificat</i>	R40.0*
Alteració de funcions cognitives		Estat mental alterat	780.97		<i>Estupor, moment no especificat</i>	R40.1*
		Dèficit d'atenció o concentració	799.51		Estat mental alterat no especificat	R41.82
		Altres signes i símptomes que afecten la cognició	799.59		Dèficit d'atenció i concentració	R41.840
		Vertigen i mareig	780.4		Altres signes i símptomes que afecten les funcions cognitives i la consciència	R41.89
		Al·lucinacions	780.1		Vertigen i mareig	R42
				Al·lucinacions no especificades	R44.3	

### Delírium

Inclou: delírium.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Delírium	Trastorn mental que cursa amb alteracions cognitives com trastorns de la memòria, alteracions del llenguatge, desorientació, al·lucinacions, alteració de la percepció i alteració del cicle son-vigília.	Delírium provocat per afeccions classificades en un altre lloc	293.0	Conversió a un sol codi	Delírium causat per factors fisiològics coneguts	F05
		Delírium subagut provocat per afeccions classificades en un altre lloc	293.1			

### 3.2. Estat afectiu

Aquest capítol inclou els factors emocionals principals i els trastorns de l'estat d'ànim que s'observen majoritàriament en l'atenció geriàtrica dins de l'àmbit de l'atenció intermèdia. Els codis d'aquest capítol s'han de reflectir als diagnòstics secundaris segons l'ordre de gravetat de la patologia respecte de les altres comorbiditats de la persona atesa.

#### Estat afectiu

Inclou: depressió ansiosa, depressió amb ansietat, depressió reactiva, estat depressiu neuròtic, reacció depressiva, ansietat, etc.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Ansietat		Estat d'ansietat no especificat	300.00		Trastorn d'ansietat no especificat	F41.9
		Trastorn d'ansietat generalitzat	300.02		Trastorn d'ansietat generalitzat	F41.1
		Altres estats d'ansietat	300.09		Altres trastorns d'ansietat especificats	F41.8
Depressió		Trastorn depressiu no classificat a cap altre lloc	311		Depressió no especificada	F32.A
		Trastorn distímic	300.4		Trastorn distímic	F34.1
		Reacció depressiva prolongada	309.1		Trastorn d'adaptació amb estat d'ànim deprimat	F43.21
		Trastorn depressiu major moderat d'episodi únic	296.22		Trastorn depressiu major d'episodi únic, moderat	F32.1
		Trastorn depressiu major greu d'episodi únic, sense menció de comportament psicòtic	296.23		Trastorn depressiu major d'episodi únic sense símptomes psicòtics, greu	F32.2
		Trastorn depressiu major greu d'episodi únic, especificat com a acompanyat de comportament psicòtic	296.24		Trastorn depressiu major d'episodi únic amb símptomes psicòtics, greu	F32.3
		Psicosi de tipus depressiu	298.0			
		Altres trastorns de l'estat d'ànim episòdics especificats	296.99		Altres trastorns especificats persistents de l'estat d'ànim	F34.89



#### 4. Situació social

La situació de les persones grans també té a veure amb problemes de salut derivats de la seva situació social i socioeconòmica. Els codis d'aquest capítol s'han de reflectir als diagnòstics secundaris segons l'ordre de gravetat respecte de les altres comorbiditats de la persona atesa.

#### Situació social

Inclou: viure sol, ingrés per RESPIR, etc.

Els codis d'aquest apartat s'han d'incloure com a diagnòstics secundaris, segons la seva gravetat en relació amb altres comorbiditats.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Habitatge o aïllament		Manca d'habitatge	V60.0		Absència de llar	Z59.0
		Habitatge inadequat	V60.1		Habitatge inadequat	Z59.1
		Persona que viu sola	V60.3		Problemes relacionats amb viure sol	Z60.2
		Estat d'allitament	V49.84		Estat d'allitament	Z74.01
Entorn familiar i RESPIR		Assistència per a la facilitació de vacances	V60.5		Servei de suport al cuidador	Z75.5
		Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per altres circumstàncies familiars especificades	V61.8		Altres problemes especificats relacionats amb l'entorn més proper	Z63.8
Situació social		Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per altres circumstàncies d'habitatge o econòmiques especificades	V60.89		Altres problemes relacionats amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge	Z59.89
		Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per circumstàncies d'habitatge o econòmiques no especificades	V60.9		Problema no especificat relacionat amb circumstàncies econòmiques i d'habitatge	Z59.9

## 5. Situació nutricional

Els trastorns relacionats amb la nutrició són habituals en l'atenció a persones d'edat avançada o amb perfils geriàtrics i crònics. La desnutrició en les persones incrementa significativament el risc de morbiditat. Sovint, aquestes persones requereixen atenció en unitats de convalsència, fet que repercuteix negativament en la seva qualitat de vida.

Es recomana utilitzar aquests codis com a diagnòstic principal en el cas que la causa principal de l'ingrés sigui un trastorn alimentari. No obstant això, els codis s'han de reflectir als diagnòstics secundaris segons l'ordre de gravetat de la patologia respecte de les altres comorbiditats de la persona atesa.

### 5.1. Pèrdua de pes

Per codificar una pèrdua de pes anòmla cal utilitzar dos codis, un que descriu que existeix una patologia de pèrdua de pes i a continuació un codi que identifiqui l'índex de massa corporal (IMC) de la persona atesa. En l'àmbit d'atenció intermèdia, la pèrdua de pes es codificarà sempre i quan aquesta sigui més gran o igual al 5 % en els últims 30 dies, o més gran o igual al 10 % en els últims 180 dies.

### 5.2. Disfàgia

També són habituals trastorns resultants de malalties cerebrovasculars, com la disfàgia. Si és el cas, cal codificar primer la malaltia cerebrovascular que l'ha ocasionada i a continuació el codi de disfàgia corresponent.

### Estat nutricional

Inclou: problemes d'alimentació, anorèxia, caquèxia, disfàgia, etc.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Malnutrició		Anorèxia	783.0		Anorèxia	R63.0
		Altres malnutricions proteïnocalòriques greus	262		Malnutrició proteïnocalòrica greu no especificada	E43
		Malnutrició moderada	263.0		Malnutrició proteïnocalòrica moderada	E44.0
		Malnutrició lleu	263.1		Malnutrició proteïnocalòrica lleu	E44.1
		Malnutrició proteïnocalòrica no especificada	263.9		Malnutrició proteïnocalòrica no especificada	E46
		Caquèxia	799.4		Caquèxia	R64
Obesitat		Obesitat mòrbida	278.01		Obesitat mòrbida (greu) causada per excés de calories	E66.01
		Síndrome d'hipoventilació pulmonar i obesitat	278.03		Obesitat mòrbida (greu) amb hipoventilació alveolar	E66.2
		Obesitat no especificada	278.00		Obesitat no especificada	E66.9
Deshidratació		Deshidratació	276.51		Deshidratació	E86.0
Disfàgia	Cal codificar primer, si escau, la malaltia cerebrovascular que l'ha ocasionat.	Disfàgia no especificada	787.20	Cal codificar primer, si escau, la malaltia cerebrovascular que l'ha ocasionat.	Disfàgia no especificada	R13.10
		Disfàgia, fase oral	787.21		Disfàgia, fase oral	R13.11
		Disfàgia, fase orofaríngia	787.22		Disfàgia, fase orofaríngia	R13.12
		Disfàgia, fase faríngia	787.23		Disfàgia, fase faríngia	R13.13
		Disfàgia, fase faringoesofàgica	787.24		Disfàgia, fase faringoesofàgica	R13.14
Pèrdua de pes	Quan aquesta sigui $\geq 5\%$ en els últims 30 dies, o $\geq 10\%$ en els últims 180 dies. Requereix un codi addicional (IMC).	Pèrdua de pes	783.21	Requereix un codi addicional (IMC).	Pèrdua anòmala de pes	R63.4
		<i>Codis addicionals d'IMC (V85.0-V85.54)</i>			<i>Codis addicionals d'IMC (Z68.1-Z68.45)</i>	

## 6. Son i disfunció sensorial

### Son

Inclou: trastorns del son, insomni, etc.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Insomni		Altres insomnis no especificats	780.52	Cal codificar també l'afecció mèdica associada	Insomni no especificat	G47.00
		Insomni orgànic no especificat	327.00		Insomni causat per una afecció mèdica	G47.01
		Insomni causat per una afecció mèdica classificada en un altre lloc	327.01			
		Altres tipus d'insomni orgànic	327.09		Altres tipus d'insomni	G47.09

### Disfunció sensorial

Inclou: hipoacúsia, ceguesa i problemes visuals.

Alguns codis recomanats són NO FINALISTES. Cal cercar el codi finalista al catàleg corresponent. Els codis d'aquest apartat s'han d'incloure com a diagnòstics secundaris segons la seva gravetat en relació amb altres comorbiditats.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Hipoacúsia	Els codis recomanats són NO FINALISTES.	<i>Hipoacúsia</i>	389.*	Codis NO FINALISTES. Cal consultar el catàleg corresponent.	<i>Hipoacúsia conductiva i neurosensorial</i>	<i>H90.*</i>
Problemes visuals	Els codis recomanats són NO FINALISTES.	<i>Ceguesa i visió disminuïda</i>	369.*	Codis NO FINALISTES. Cal consultar el catàleg corresponent.	<i>Ceguesa i visió disminuïda</i>	<i>H54.*</i>
		Cataracta senil no especificada	366.10		Cataracta relacionada amb l'edat no especificada	H25.9
		Cataracta no especificada	366.9		Cataracta no especificada	H26.9
		Degeneració macular (senil) no especificada	362.50		Degeneració macular no especificada	H35.30
		Glaucoma no especificat	365.9	Codis NO FINALISTES. Cal consultar el catàleg corresponent.	<i>Glaucoma no especificat</i>	<i>H40.9*</i>
		Deterioració visual profunda d'ambdós ulls, nivell de deterioració no especificat més endavant	369.00		Ceguesa legal, segons la definició emprada als EUA	H54.8

## **7. Integritat de la pell**

### **7.1. Úlceres per pressió**

En la classificació CIM-9-MC, la codificació de les úlceres per pressió consta d'una doble codificació: en primer lloc, el codi de localització de l'úlcera, i, en segon lloc, l'estadi. Les correspondències amb la classificació CIM-10-MC d'aquestes patologies es fan mitjançant un sol codi, és a dir, la conversió de dos codis de la CIM-9-MC es converteix en un únic codi de la CIM-10-MC que identifica tant la localització com l'estadi.

En cas d'haver-hi úlceres en més d'una localització, caldrà utilitzar un codi per a cadascuna d'elles segons la gravetat.

### **7.2. Úlceres venoses**

En cas d'haver-hi úlceres en més d'una localització, caldrà codificar primer la que condicioni més clarament l'ingrés i, a continuació, un codi per a cadascuna d'elles segons la gravetat.

### Integritat de la pell

Inclou: nafres i úlceres, i venes varicoses.

Alguns codis recomanats són NO FINALISTES. Cal cercar el codi finalista al catàleg corresponent.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Úlceres per pressió	Requereix un codi addicional (estadi).	Úlcera per pressió de localització no especificada	707.00	Codis NO FINALISTES. Cal consultar el catàleg corresponent.	Úlcera per pressió de localització no especificada	L89.9*
		Úlcera per pressió del colze	707.01		Úlcera per pressió de colze dret	L89.01*
		Úlcera per pressió de la part superior de l'esquena	707.02		Úlcera per pressió d'esquena	L89.1*
		Úlcera per pressió de la part inferior de l'esquena	707.03		Úlcera per pressió de regió sacra	L89.15*
		Úlcera per pressió del maluc	707.04		Úlcera per pressió de maluc	L89.2*
		Úlcera per pressió de les natges	707.05		Úlcera per pressió de natja	L89.3*
		Úlcera per pressió del turmell	707.06		Úlcera per pressió de turmell	L89.5*
		Úlcera per pressió del taló	707.07		Úlcera per pressió de taló	L89.6*
		Úlcera per pressió d'altres localitzacions	707.09		Úlcera per pressió d'altres localitzacions	L89.8*
	Codis addicionals d'estadi	Úlcera per pressió, estadi no especificat	707.20	Les conversions amb la classificació CIM-10-MC es fan mitjançant un sol codi, és a dir, la conversió de dos codis de la CIM-9-MC es converteix en un únic codi de la CIM-10-MC que identifica la localització i l'estadi de les úlceres.		
		Úlcera per pressió, estadi I	707.21			
		Úlcera per pressió, estadi II	707.22			
		Úlcera per pressió, estadi III	707.23			
		Úlcera per pressió, estadi IV	707.24			
Úlceres venoses	Venes varicoses de les extremitats inferiors amb úlcera	454.0	Codis NO FINALISTES. Cal consultar el catàleg corresponent.	Venes varicoses d'extremitats inferiors amb úlcera	I83.0*	
	Venes varicoses de les extremitats inferiors amb inflamació	454.1		Venes varicoses d'extremitats inferiors amb inflamació	I83.1*	
	Venes varicoses de les extremitats inferiors amb úlcera i inflamació	454.2		Venes varicoses d'extremitats inferiors amb úlcera i inflamació	I83.2*	
	Venes varicoses de les extremitats inferiors amb altres complicacions	454.8		Venes varicoses d'extremitats inferiors amb altres complicacions	I83.8*	
	Venes varicoses asimptomàtiques	454.9		Venes varicoses asimptomàtiques d'extremitats inferiors	I83.9*	

## **8. Hàbits intestinals i miccionals**

Els codis d'aquest capítol, tant per al restrenyiment com per a la incontinència, s'han de reflectir als diagnòstics secundaris segons l'ordre de gravetat de la patologia respecte de les altres comorbiditats de la persona atesa.

### **8.1. Restrenyiment**

El restrenyiment és un trastorn comú en les persones d'edat avançada. Es caracteritza per la dificultat en l'evacuació de la femta. Aquest problema pot conduir a una disminució significativa de la qualitat de vida, a l'augment de la sensació de malestar i a l'aparició d'altres complicacions.

### **8.2. Incontinència**

La incontinència és una afecció habitual en l'atenció geriàtrica. Aquesta condició implica una pèrdua de control sobre la micció o la defecació que genera un alt grau de dependència.

### Hàbits intestinals

Inclou: restrenyiment i impacció fecal.

Els codis d'aquest apartat s'han d'incloure com a diagnòstics secundaris, segons la seva gravetat en relació amb altres comorbiditats.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Restrenyiment		Restrenyiment no especificat	564.00	Conversió a un sol codi	Restrenyiment no especificat	K59.00
		Restrenyiment de trànsit lent	564.01		Restrenyiment de trànsit lent	K59.01
		Altres tipus de restrenyiment	564.09		Restrenyiment induït per fàrmacs	K59.03
			Restrenyiment idiopàtic crònic		K59.04	
Impacció fecal		Impacció fecal	560.32		Impacció fecal	K56.41

### Incontinència urinària o fecal

Inclou: incontinència urinària, incontinència d'esforç i incontinència.

Els codis d'aquest apartat s'han d'incloure com a diagnòstics secundaris, segons la seva gravetat en relació amb altres comorbiditats.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Incontinència urinària		Incontinència urinària no especificada	788.30	Conversió a un sol codi	Incontinència urinària no especificada	R32
		Incontinència urinària mixta (masculina) (femenina)	788.33		Incontinència mixta	N39.46
		Incontinència urinària sense consciència sensorial	788.34		Incontinència sense consciència sensorial	N39.42
		Incontinència urinària per sobreeximent	788.38		Incontinència per sobreeximent	N39.490
		Incontinència urinària funcional	788.91		Incontinència urinària funcional	R39.81
Incontinència d'esforç	Masculina	Incontinència urinària d'esforç masculina	788.32	Conversió a un sol codi	Incontinència d'esforç (femenina) (masculina)	N39.3
	Femenina	Incontinència d'esforç femenina	625.6			
Incontinència fecal		Incontinència fecal completa	787.60	Conversió a un sol codi	Incontinència fecal completa	R15.9
		Defecació incompleta	787.61		Defecació incompleta	R15.0
		Pèrdues fecals	787.62		Pèrdues fecals	R15.1
		Urgència fecal	787.63		Urgència fecal	R15.2



## 9. Simptomatologia rellevant

Els codis d'aquest capítol són recomanacions de símptomes habituals i no exclouen altres codis que es puguin utilitzar per descriure altres signes i símptomes d'interès. Aquests s'han de reflectir als diagnòstics secundaris segons l'ordre de gravetat de la patologia respecte de les altres comorbiditats de la persona atesa.

### Dolor

Inclou: dolor agut, dolor crònic, dolor abdominal, etc.

Els codis d'aquest apartat s'han d'incloure com a diagnòstics secundaris, segons la seva gravetat en relació amb altres comorbiditats.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Dolor crònic		Dolor crònic per traumatisme	338.21		Dolor crònic causat per traumatisme	G89.21
		Altres dolors crònics	338.29		Altres tipus de dolor crònic	G89.29
		Síndrome de dolor crònic	338.4		Síndrome de dolor crònic	G89.4
Dolor neoplàstic	Cal codificar primer la neoplàsia causant.	Dolor neoplàstic (agut) (crònic)	338.3	Cal codificar primer la neoplàsia causant.	Dolor neoplàstic (agut) (crònic)	G89.3
Dolor abdominal		Dolor abdominal epigàstic	789.06		Dolor epigàstic	R10.13
		Dolor abdominal d'una altra localització especificada	789.09		Dolor a la part inferior de l'abdomen no especificat	R10.10
		Dolor abdominal de localització no especificada	789.00		Dolor a la part superior de l'abdomen no especificat	R10.30
Dolor agut		Altres dolors aguts	338.19		Dolor no especificat	R52

### Altra simptomatologia habitual

Inclou: signes i símptomes més habituals.

Els codis d'aquest apartat s'han d'incloure com a diagnòstics secundaris, segons la seva gravetat en relació amb altres comorbiditats.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Nàusees, vòmits i diarrea		Vòmits persistents	536.2		Síndrome de vòmits cíclics no relacionada amb la migranya	R11.15
		Només vòmits	787.03		Vòmits sense nàusees	R11.11
		Nàusees amb vòmits	787.01		Nàusees amb vòmits no especificats	R11.2
		Diarrea	787.91		Diarrea no especificada	R19.7
Alteracions de la parla		Afàsia	784.3		Afàsia	R47.01

## 10. Polifarmàcia

S'aconsella marcar el codi de polifarmàcia (com a diagnòstic secundari) si la persona atesa pren cinc o més medicaments, d'acord amb els principals estàndards internacionals.

### Polifarmàcia

Inclou: ús de medicaments a llarg termini.

S'aconsella marcar el codi de polifarmàcia (com a diagnòstic secundari) si la persona atesa pren cinc o més medicaments, d'acord amb els principals estàndards internacionals.

Grup	Comentaris	CIM-9-MC		Anotacions de conversió	CIM-10-MC	
		Descripció	Codi		Descripció	Codi
Polifarmàcia		Assistència per a ús d'altres medicaments a llarg termini (actual)	V58.69		Altres tipus de tractament farmacològic a llarg termini (actual)	Z79.899