

Informe sobre els microorganismes declarats durant l'any 2013

**Sistema de notificació microbiològica
de Catalunya**



Redactors

Pilar Ciruela Navas, Sergi Hernández Baeza, Montserrat Tomàs Pelegrina i Mireia Jané Checa.

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya

© 2014, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 3.0 de Creative Commons.

La llicència es pot consultar a:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>

Edita

Agència de Salut Pública de Catalunya

Dipòsit legal

B 22128-2014

1a edició

Barcelona, novembre de 2014

Assessorament lingüístic

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

URL

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=4778b088013da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnnextchannel=4778b088013da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnnextfmt=default#div_05

Índex

1. Introducció	5
2. Agents causants de micobacteriosis	7
2.1. Complex <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	7
2.2. <i>Mycobacterium</i> spp.	10
3. Agents causants d'infeccions de transmissió sexual	14
3.1. <i>Chlamydia trachomatis</i>	14
3.2. Gonococ	17
3.3. Herpes simple	20
3.4. <i>Treponema pallidum</i>	23
3.5. <i>Trichomonas vaginalis</i>	26
4. Agents causants de meningoencefalitis	30
4.1. <i>Haemophilus influenzae</i>	30
4.2. <i>Listeria monocytogenes</i>	33
4.3. Meningococ	36
4.4. Pneumococ	39
4.5. <i>Streptococcus agalactiae</i>	43
4.6. Altres agents	45
5. Agents causants d'infeccions de les vies respiratòries	49
5.1. Adenovirus	49
5.2. <i>Bordetella pertussis</i>	52
5.3. <i>Chlamydophila</i>	55
5.4. <i>Coxiella burnetii</i>	57
5.5. <i>Haemophilus influenzae</i>	59
5.6. <i>Legionella</i>	62
5.7. <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	65
5.8. Pneumococ	68
5.9. Virus de la grip	72
5.10. Virus de la parainfluença	75
5.11. Virus respiratori sincicial	78

6. Agents causants d'enteritis	82
6.1. Adenovirus	82
6.2. <i>Campylobacter</i>	85
6.3. <i>Escherichia coli</i> enterotoxigen	88
6.4. Rotavirus	91
6.5. <i>Salmonella</i> no tifòdica.....	93
6.6. <i>Shigella</i>	97
6.7. <i>Vibrio</i>	100
6.8. <i>Yersinia</i>	103
7. Agents causants de bacterièmies sense focus.....	107
7.1. <i>Haemophilus influenzae</i>	107
7.2. <i>Listeria monocytogenes</i>	110
7.3. Meningococ	113
7.4. Pneumococ	115
7.5. <i>Salmonella typhi</i> i <i>paratyphi</i>	119
7.6. <i>Streptococcus agalactiae</i>	122
8. Agents causants d'altres malalties infeccioses	126
8.1. <i>Brucella</i>	126
8.2. Dengue.....	128
8.3. <i>Leishmania</i>	131
8.4. <i>Listeria monocytogenes</i>	134
8.5. Meningococ	137
8.6. <i>Plasmodium</i>	139
8.7. Pneumococ	142
8.8. <i>Rickettsia conorii</i>	145
8.9. <i>Trypanosoma cruzi</i>	147
8.10. Virus de la parotiditis	150
8.11. Virus de l'hepatitis A	152
8.12. Virus de l'hepatitis B	154
8.13. Virus de la rubèola.....	156
8.14. Virus del xarampió.....	158
8.15. Altres agents	160
9. Annex	164

1. Introducció

El sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC) és un sistema sentinella d'informació que forma part de la xarxa de vigilància epidemiològica i que recull les declaracions periòdiques sobre els microorganismes que són rellevants en l'àmbit de la salut pública.

L'SNMC es va posar en funcionament l'any 1993. Durant els anys 1993 i 1994, se'n va realitzar una prova pilot amb 18 laboratoris hospitalaris. Per tal d'aconseguir una representativitat geogràfica més àmplia, l'any 1995 s'hi van incorporar hospitals d'altres comarques del territori fins a constituir un grup de 29 laboratoris. Des de llavors s'hi han incorporat altres centres hospitalaris i extrahospitalaris. Durant l'any 2013 el nombre de centres que han participat en l'SNMC ha estat de 50 (vegeu l'[annex](#)).

La cobertura de l'SNMC al territori es mesura pel nombre de llits hospitalaris d'aguts que componen la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya. Durant l'any 2013 aquests centres han representat el 82,2% del total de llits. El percentatge de declaració dels centres participants durant aquest any ha estat del 92,31%.

L'objectiu de l'SNMC és proporcionar informació a la xarxa de vigilància epidemiològica i als programes específics, vigilar i monitorar les tendències dels microorganismes i les resistències als antibiòtics d'elecció, i estudiar els canvis en el patró epidemiològic de malalties infeccioses que, per la seva freqüència, gravetat o contagiositat, tenen transcendència per a la salut pública.

En aquest informe es presenta l'anàlisi de les declaracions microbiològiques notificades pels laboratoris que participen en l'SNMC durant l'any 2013.

Tots els diagnòstics recollits corresponen a casos amb infecció aguda segons els [Criteris diagnòstics dels microorganismes que es declaren al sistema de notificació microbiològica de Catalunya](#) que consten a la pàgina web de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

La patologia que s'hi recull és tant hospitalària com extrahospitalària, ja que molts laboratoris que pertanyen a l'SNMC són laboratoris de referència per als centres d'assistència primària.

Els microorganismes analitzats estan distribuïts en les entitats clíniques següents: micobacteriosis, infeccions de transmissió sexual, meningoencefalitis, infeccions de les vies respiratòries, enteritis, bacterièmies sense focus i un grup d'altres malalties infeccioses. Per a cada entitat clínica s'han tingut en compte els microorganismes estudiats i se n'han analitzat les variables d'edat, sexe, setmana epidemiològica del diagnòstic, detall del microorganisme (espècie, serogrup, serotipus, etc.) i mostres i tècniques diagnòstiques. Respecte a aquestes dues últimes variables, s'han analitzat totes les mostres i tècniques diagnòstiques de què els microbiòlegs han informat, sempre tenint en compte que els casos en concret complien la definició de cas. També s'han incorporat un gràfic anual d'evolució de la incidència i un mapa amb taxes d'incidència per regions sanitàries segons l'hospital declarant.

Barcelona, novembre de 2014

2. Agents causants de micobacteriosis

2.1. Complex *Mycobacterium tuberculosis*


Taula 1. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	1	0,14%	0,14%
1-11 mesos	4	0,54%	0,55%
1-4 anys	11	1,49%	1,5%
5-9 anys	2	0,27%	0,27%
10-14 anys	6	0,81%	0,82%
15-19 anys	15	2,03%	2,05%
20-29 anys	149	20,16%	20,36%
30-39 anys	187	25,3%	25,55%
40-49 anys	125	16,91%	17,08%
50-59 anys	62	8,39%	8,47%
≥ 60 anys	169	22,87%	23,09%
No consta	8	1,08%	No consta
TOTAL	739	100,0%	100,0%

Taula 2. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	292	39,51%	39,62%
Home	445	60,22%	60,38%
No consta	2	0,27%	No consta
TOTAL	739	100,0%	100,0%

Figura 1. Distribució estacional



Taula 3. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Mycobacterium africanum</i>	1	0,14%	0,37%
<i>Mycobacterium bovis</i>	13	1,76%	4,8%
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	257	34,78%	94,83%
No consta	468	63,33%	No consta
TOTAL	739	100,0%	100,0%

Taula 4. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Secreció respiratòria	532	63,26%	72,58%
Orina	22	2,62%	3,0%
Líquid cefaloraquidi	6	0,71%	0,82%
Sang	1	0,12%	0,14%
Líquid pleural	20	2,38%	2,73%
Soca	115	13,67%	15,69%
Líquid articular	2	0,24%	0,27%
Altres mostres*	137	16,29%	18,69%
No consta	6	0,71%	No consta
TOTAL	841	100,0%	100,0%



* 59 biòpsia ganglionar; 27 biòpsia; 19 suc gàstric; 17 abscess; 5 líquid peritoneal; 3 femta; 2 cutània; 1 bursitis de maluc dret; 1 exsudat de fistula d'adenopatia; 1 frotis de ferida, 1 punció transtoràcica, 1 úlcera de colòn.

Taula 5. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	205	19,29%	19,29%
Cultiu	732	68,86%	68,86%
Examen directe	126	11,85%	11,85%
TOTAL	1.063	100,0%	100,0%

Taula 6. Distribució segons el resultat de l'examen directe

RESULTAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Positiu	126	17,05%	70,39%
Negatiu	53	7,17%	29,61%
No realitzat	560	75,78%	No consta
TOTAL	739	100,0%	100,0%

Figura 2. Evolució anual 1995-2013**Figura 3. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

2.2. *Mycobacterium* spp.


Taula 7. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	1	0,64%	0,65%
5-9 anys	1	0,64%	0,65%
15-19 anys	2	1,28%	1,29%
20-29 anys	2	1,28%	1,29%
30-39 anys	12	7,69%	7,74%
40-49 anys	14	8,97%	9,03%
50-59 anys	19	12,18%	12,26%
≥ 60 anys	104	66,67%	67,1%
No consta	1	0,64%	No consta
TOTAL	156	100,0%	100,0%

Taula 8. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	48	30,77%	30,97%
Home	107	68,59%	69,03%
No consta	1	0,64%	No consta
TOTAL	156	100,0%	100,0%

Figura 4. Distribució estacional



Taula 9. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Complex MAI+ <i>Mycobacterium kansasii</i>	4	2,56%	2,72%
<i>Mycobacterium abcessus</i>	7	4,49%	4,76%
<i>Mycobacterium avium intracellulare</i>	50	32,05%	34,01%
<i>Mycobacterium chelonae</i>	13	8,33%	8,84%
<i>Mycobacterium fortuitum</i>	21	13,46%	14,29%
<i>Mycobacterium gordonae</i>	21	13,46%	14,29%
<i>Mycobacterium kansasii</i>	6	3,85%	4,08%
<i>Mycobacterium xenopi</i>	17	10,9%	11,56%
Altres micobacteriosis*	8	5,13%	5,44%
No consta	9	5,77%	No consta
TOTAL	156	100,0%	100,0%

* 3 *M. celatum*, 1 *M. kumamotoense*, 1 *M. monacense*, 1 *M. goodii*, 1 *M. shimoidei*, 1 *M. algericum*.

Taula 10. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Secreció respiratòria	144	90,0%	90,0%
Orina	4	2,5%	2,5%
Sang	2	1,25%	1,25%
Líquid pleural	1	0,63%	0,63%
Soca	2	1,25%	1,25%
Líquid articular	1	0,63%	0,63%
Altres mostres*	6	3,75%	3,75%
TOTAL	160	100,0%	100,0%

* 2 biòpsia ganglionar; 1 moll d'os; 1 abscess; 1 punció aspirativa; 1 líquid peritoneal.

Taula 11. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	54	24,0%	24,0%
Cultiu	125	55,56%	55,56%
Examen directe	46	20,44%	20,44%
TOTAL	225	100,0%	100,0%

Taula 12. Distribució segons el resultat de l'examen directe

RESULTAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Positiu	46	29,49%	71,87%
Negatiu	18	11,54%	28,13%
No realitzat	92	58,97%	No consta
TOTAL	156	100,0%	100,0%

Figura 5. Evolució anual 1995-2013




Figura 6. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant





Figura 7. Micobacteriosis: distribució segons l'agent causal

3. Agents causants d'infeccions de transmissió sexual

3.1. *Chlamydia trachomatis*


Taula 13. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	6	0,57%	0,57%
1-11 mesos	2	0,19%	0,19%
1-4 anys	2	0,19%	0,19%
10-14 anys	3	0,28%	0,29%
15-19 anys	114	10,78%	10,85%
20-29 anys	462	43,67%	43,96%
30-39 anys	320	30,25%	30,45%
40-49 anys	116	10,96%	11,04%
50-59 anys	19	1,8%	1,81%
≥ 60 anys	7	0,66%	0,67%
No consta	7	0,66%	No consta
TOTAL	1.058	100,0%	100,0%

Taula 14. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	643	60,78%	60,78%
Home	415	39,22%	39,22%
TOTAL	1.058	100,0%	100,0%

Figura 8. Distribució estacional



Taula 15. Distribució segons el serovar

SEROVAR	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
D-K (no LGV)*	80	7,56%	49,69%
L1-L3	79	7,47%	49,07%
L2	2	0,19%	1,24%
No consta	897	84,78%	No consta
TOTAL	1.058	100,0%	100,0%

* LGV: limfogranuloma veneri,

Taula 16. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	54	5,05%	5,12%
Uretra	196	18,33%	18,6%
Endocèrvix	534	49,95%	50,66%
Vagina	80	7,48%	7,59%
Faringe	39	3,65%	3,7%
Canal anal	141	13,19%	13,38%
Altres mostres*	21	1,96%	1,99%
No consta	4	0,37%	No consta
TOTAL	1.069	100,0%	100,0%

* 8 exsudat conjuntival; 4 exsudat balanoprepucial; 3 biòpsia; 1 adenopatia inguinal; 1 biòpsia rectal; 1 biòpsia de tracte intestinal; 1 coll d'úter; 1 exsudat de xancro genital; 1 ferida genital.

Taula 17. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	966	90,53%	90,53%
Cultiu	20	1,87%	1,87%
Detecció d'antigen	81	7,59%	7,59%
TOTAL	1.067	100,0%	100,0%

Figura 9. Evolució anual 1995-2013





Figura 10. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



3.2. Gonococ


Taula 18. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	1	0,09%	0,09%
1-11 mesos	2	0,19%	0,19%
1-4 anys	1	0,09%	0,09%
10-14 anys	2	0,19%	0,19%
15-19 anys	92	8,54%	8,63%
20-29 anys	418	38,81%	39,21%
30-39 anys	389	36,12%	36,49%
40-49 anys	122	11,33%	11,44%
50-59 anys	33	3,06%	3,1%
≥ 60 anys	6	0,56%	0,56%
No consta	11	1,02%	No consta
TOTAL	1.077	100,0%	100,0%

Taula 19. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	123	11,42%	11,43%
Home	953	88,49%	88,57%
No consta	1	0,09%	No consta
TOTAL	1.077	100,0%	100,0%

Figura 11. Distribució estacional



Taula 20. Distribució segons el caràcter

CARÀCTER	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Beta-lactamasa negativa	148	13,74%	78,31%
Beta-lactamasa positiva	41	3,81%	21,69%
No consta	888	82,45%	No consta
TOTAL	1.077	100,0%	100,0%

Taula 21. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	28	2,48%	2,61%
Uretra	629	55,71%	58,57%
Endocèrvix	62	5,49%	5,77%
Vagina	34	3,01%	3,17%
Faringe	152	13,46%	14,15%
Canal anal	90	7,97%	8,38%
Altres mostres*	131	11,6%	12,2%
No consta	3	0,27%	No consta
TOTAL	1.129	100,0%	100,0%

* 117 soca; 7 exsudat balanoprepucial; 4 semen; 1 exsudat de sac de Douglas; 1 exsudat de xancre genital; 1 exsudat conjuntival.

Taula 22. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	475	38,06%	38,06%
Cultiu	765	61,3%	61,3%
Detecció d'antigen	3	0,24%	0,24%
Examen directe	5	0,4%	0,4%
TOTAL	1.248	100,0%	100,0%

Figura 12. Evolució anual 1995-2013





Figura 13. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



3.3. Herpes simple


Taula 23. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	1	0,24%	0,24%
1-11 mesos	1	0,24%	0,24%
1-4 anys	1	0,24%	0,24%
10-14 anys	2	0,48%	0,48%
15-19 anys	17	4,07%	4,08%
20-29 anys	140	33,49%	33,57%
30-39 anys	128	30,62%	30,7%
40-49 anys	66	15,79%	15,83%
50-59 anys	29	6,94%	6,95%
≥ 60 anys	32	7,66%	7,67%
No consta	1	0,24%	No consta
TOTAL	418	100,0%	100,0%

Taula 24. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	255	61,0%	61,0%
Home	163	39,0%	39,0%
TOTAL	418	100,0%	100,0%

Figura 14. Distribució estacional



Taula 25. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Tipus I	38	9,09%	10,27%
Tipus II	332	79,43%	89,73%
No consta	48	11,48%	No consta
TOTAL	418	100,0%	100,0%

Taula 26. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	3	0,71%	0,73%
Uretra	10	2,36%	2,42%
Endocèrvix	6	1,42%	1,45%
Vagina	114	26,95%	27,6%
Faringe	6	1,42%	1,45%
Canal anal	45	10,64%	10,9%
Altres mostres*	234	55,32%	56,66%
No consta	5	1,18%	No consta
TOTAL	423	100,0%	100,0%

* 104 exsudat de xancre genital; 80 exsudat balanoprepucial; 19 úlcera genital; 17 exsudat cutani; 6 mucosa genital; 4 pus; 2 exsudat conjuntival; 1 exsudat de cavitat oral; 1 vesícula.

Taula 27. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	321	76,79%	76,79%
Cultiu	86	20,57%	20,57%
Detecció d'antigen	11	2,63%	2,63%
TOTAL	418	100,0%	100,0%

Figura 15. Evolució anual 1999-2013





Figura 16. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



3.4. *Treponema pallidum*


Taula 28. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	13	2,02%	2,03%
1-11 mesos	3	0,47%	0,47%
15-19 anys	9	1,4%	1,41%
20-29 anys	111	17,24%	17,37%
30-39 anys	192	29,81%	30,05%
40-49 anys	157	24,38%	24,57%
50-59 anys	84	13,04%	13,15%
≥ 60 anys	70	10,87%	10,95%
No consta	5	0,78%	No consta
TOTAL	644	100,0%	100,0%

Taula 29. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	124	19,25%	19,28%
Home	519	80,59%	80,72%
No consta	1	0,16%	No consta
TOTAL	644	100,0%	100,0%

Figura 17. Distribució estacional



Taula 30. Distribució segons el caràcter

CARÀCTER	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Congènita	16	2,48%	80,0%
Sífilis primària	2	0,31%	10,0%
Sífilis secundària	1	0,16%	5,0%
Tractada	1	0,16%	5,0%
No consta	624	96,89%	No consta
TOTAL	644	100,0%	100,0%

Taula 31. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	633	97,38%	98,29%
Faringe	1	0,15%	0,16%
Canal anal	3	0,46%	0,47%
Altres mostres*	13	2,0%	2,02%
TOTAL	650	100,0%	100,0%

* 9 frotis de penis; 4 úlcera genital.

Taula 32. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	15	1,38%	1,38%
Serologia d'anticossos reagínica	348	32,01%	32,01%
Serologia d'anticossos treponèmica	702	64,58%	64,58%
Quimioluminescència	22	2,03%	2,03%
TOTAL	1.087	100,0%	100,0%



Figura 18. Evolució anual 1995-2013

Figura 19. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



3.5. *Trichomonas vaginalis*


Taula 33. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
15-19 anys	9	2,78%	2,78%
20-29 anys	66	20,37%	20,37%
30-39 anys	90	27,78%	27,78%
40-49 anys	93	28,7%	28,7%
50-59 anys	48	14,81%	14,81%
≥ 60 anys	18	5,56%	5,56%
TOTAL	324	100,0%	100,0%

Taula 34. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	313	96,6%	96,6%
Home	11	3,4%	3,4%
TOTAL	324	100,0%	100,0%

Figura 20. Distribució estacional



Taula 35. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	12	3,6%	3,6%
Uretra	4	1,2%	1,2%
Endocèrvix	27	8,11%	8,11%
Vagina	286	85,89%	85,89%
Faringe	3	0,9%	0,9%
Semen	1	0,3%	0,3%
TOTAL	333	100,0%	100,0%

Taula 36. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	21	5,88%	5,88%
Cultiu	165	46,22%	46,22%
Examen directe	171	47,9%	47,9%
TOTAL	357	100,0%	100,0%



Figura 21. Evolució anual 1997-2013

Figura 23. Infeccions de transmissió sexual: distribució segons l'agent causal

4. Agents causants de meningoencefalitis

4.1. *Haemophilus influenzae*


Taula 37. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	1	25,0%	25,0%
5-9 anys	1	25,0%	25,0%
≥ 60 anys	2	50,0%	50,0%
TOTAL	4	100,0%	100,0%

Taula 38. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	1	25,0%	25,0%
Home	3	75,0%	75,0%
TOTAL	4	100,0%	100,0%

Figura 24. Distribució estacional



Taula 39. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Haemophilus influenzae</i> sense tipificar	4	100,0%	No consta
TOTAL	4	100,0%	No consta

Taula 40. Distribució segons el biotipus

BIOTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
No consta	4	100,0%	No consta
TOTAL	4	100,0%	No consta

Taula 41. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefaloraquidi	3	42,86%	42,86%
Sang	4	57,14%	57,14%
TOTAL	7	100,0%	100,0%

Taula 42. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	4	100,0%	100,0%
TOTAL	4	100,0%	100,0%

Figura 25. Evolució anual 1995-2013





Figura 26. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



4.2. *Listeria monocytogenes*


Taula 43. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
20-29 anys	1	5,88%	5,88%
30-39 anys	2	11,76%	11,76%
40-49 anys	2	11,76%	11,76%
50-59 anys	5	29,41%	29,41%
≥ 60 anys	7	41,18%	41,18%
TOTAL	17	100,0%	100,0%

Taula 44. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	6	35,29%	35,29%
Home	11	64,71%	64,71%
TOTAL	17	100,0%	100,0%

Figura 27. Distribució estacional



Taula 45. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Listeria monocytogenes</i> 1/2 a	1	5,88%	10,0%
<i>Listeria monocytogenes</i> 4 abc	5	29,41%	50,0%
<i>Listeria monocytogenes</i> 4	4	23,53%	40,0%
No consta	7	41,18%	No consta
TOTAL	17	100,0%	100,0%

Taula 46. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefaloraquidi	15	68,18%	68,18%
Sang	7	31,82%	31,82%
TOTAL	22	100,0%	100,0%

Taula 47. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	5,56%	5,56%
Cultiu	17	94,44%	94,44%
TOTAL	18	100,0%	100,0%



Figura 28. Evolució anual 1995-2013

Figura 29. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



4.3. Meningococ


Taula 48. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	5	15,15%	15,15%
1-4 anys	5	15,15%	15,15%
5-9 anys	5	15,15%	15,15%
10-14 anys	2	6,06%	6,06%
15-19 anys	1	3,03%	3,03%
20-29 anys	2	6,06%	6,06%
30-39 anys	2	6,06%	6,06%
40-49 anys	3	9,09%	9,09%
50-59 anys	1	3,03%	3,03%
≥ 60 anys	7	21,21%	21,21%
TOTAL	33	100,0%	100,0%

Taula 49. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	18	54,55%	54,55%
Home	15	45,45%	45,45%
TOTAL	33	100,0%	100,0%

Figura 30. Distribució estacional



Taula 50. Distribució segons el grup

GRUP	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Meningococ grup B	28	84,85%	90,32%
Meningococ grup C	2	6,06%	6,45%
Meningococ grup Y	1	3,03%	3,23%
No consta serogrup	2	6,06%	No consta
TOTAL	33	100,0%	100,0%

Taula 51. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefaloraquidi	22	52,38%	66,67%
Sang	20	47,62%	60,61%
TOTAL	42	100,0%	100,0%

Taula 52. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	11	22,45%	22,45%
Cultiu	28	57,14%	57,14%
Detecció antigen	1	2,04%	2,04%
Examen directe	9	18,37%	18,37%
TOTAL	49	100,0%	100,0%



Figura 31. Evolució anual 1995-2013

Figura 32. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



4.4. Pneumococ


Taula 53. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	4	6,06%	6,06%
1-4 anys	7	10,61%	10,61%
20-29 anys	2	3,03%	3,03%
30-39 anys	4	6,06%	6,06%
40-49 anys	5	7,58%	7,58%
50-59 anys	14	21,21%	21,21%
≥ 60 anys	30	45,45%	45,45%
TOTAL	66	100,0%	100,0%

Taula 54. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	32	48,48%	48,48%
Home	34	51,52%	51,52%
TOTAL	66	100,0%	100,0%

Figura 33. Distribució estacional



Taula 55. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
10A	3	4,55%	5,17%
11A	3	4,55%	5,17%
12F	2	3,03%	3,45%
14	2	3,03%	3,45%
15A	2	3,03%	3,45%
15B	3	4,55%	5,17%
15C	1	1,52%	1,72%
16F	4	6,06%	6,9%
17F	1	1,52%	1,72%
19A	3	4,55%	5,17%
19F	2	3,03%	3,45%
21	1	1,52%	1,72%
22F	2	3,03%	3,45%
23A	2	3,03%	3,45%
23B	1	1,52%	1,72%
24F	5	7,58%	8,62%
3	9	13,64%	15,52%
31	2	3,03%	3,45%
33F	1	1,52%	1,72%
35B	1	1,52%	1,72%
38	1	1,52%	1,72%
6B	1	1,52%	1,72%
7F	1	1,52%	1,72%
8	2	3,03%	3,45%
9N	2	3,03%	3,45%
Altres	1	1,52%	1,72%
No consta	8	12,12%	No consta
TOTAL	66	100,0%	100,0%


Taula 56. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefaloraquidi	55	53,4%	53,4%
Sang	45	43,69%	43,69%
Orina*	3	2,91%	2,91%
TOTAL	103	100,0%	100,0%

* També al líquid cefaloraquidi o sang.

Taula 57. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	10	11,49%	11,49%
Cultiu	63	72,41%	72,41%
Detecció d'antigen	14	16,09%	16,09%
TOTAL	87	100,0%	100,0%

Figura 34. Evolució anual 1995-2013

4.5. *Streptococcus agalactiae*


Taula 58. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	3	75,0%	75,0%
40-49 anys	1	25,0%	25,0%
TOTAL	4	100,0%	100,0%

Taula 59. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	3	75,0%	75,0%
Home	1	25,0%	25,0%
TOTAL	4	100,0%	100,0%

Figura 36. Distribució estacional



Taula 60. Distribució segons el caràcter



CARÀCTER	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
No en consta el fenotip M	4	100,0%	No consta
TOTAL	4	100,0%	No consta

Taula 61. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefaloraquídi	3	50,0%	50,0%
Sang	3	50,0%	50,0%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Taula 62. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	4	100,0%	100,0%
TOTAL	4	100,0%	100,0%

Figura 37. Evolució anual 1995-2013**Figura 38. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

4.6. Altres agents


Taula 63. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	14	23,33%	23,33%
1-11 mesos	1	1,67%	1,67%
1-4 anys	9	15,0%	15,0%
5-9 anys	9	15,0%	15,0%
10-14 anys	3	5,0%	5,0%
20-29 anys	2	3,33%	3,33%
30-39 anys	6	10,0%	10,0%
40-49 anys	1	1,67%	1,67%
50-59 anys	6	10,0%	10,0%
≥ 60 anys	9	15,0%	15,0%
TOTAL	60	100,0%	100,0%

Taula 64. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	31	51,67%	51,67%
Home	29	48,33%	48,33%
TOTAL	60	100,0%	100,0%

Figura 39. Distribució estacional



Taula 65. Distribució segons el gènere

GÈNERE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Streptococcus oralis</i>	1	1,67%	1,67%
<i>Cryptococcus neoformans</i>	2	3,33%	3,33%
Enterovirus	26	43,33%	43,33%
<i>Escherichia coli</i>	7	11,67%	11,67%
Herpes simple	13	21,67%	21,67%
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	1,67%	1,67%
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	1,67%	1,67%
<i>Streptococcus pyogenes</i>	2	3,33%	3,33%
Virus de la varicel·la-zòster	7	11,67%	11,67%
TOTAL	60	100,0%	100,0%

Taula 66. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid cefaloraquídi	60	86,96%	86,96%
Sang	8	11,59%	11,59%
Orina*	1	1,45%	1,45%
TOTAL	69	100,0%	100,0%

* També aïllat al líquid cefaloraquídi.

Taula 67. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	47	75,81%	75,81%
Cultiu	13	20,97%	20,97%
Detecció d'antigen	1	1,61%	1,61%
Examen directe	1	1,61%	1,61%
TOTAL	62	100,0%	100,0%

Figura 40. Evolució anual 1995-2013




Figura 41. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant





Figura 42. Meningoencefalitis: distribució segons l'agent causal



5. Agents causants d'infeccions de les vies respiratòries

5.1. Adenovirus


Taula 68. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	2	1,08%	1,08%
1-11 mesos	52	27,96%	27,96%
1-4 anys	86	46,24%	46,24%
5-9 anys	15	8,06%	8,06%
10-14 anys	2	1,08%	1,08%
20-29 anys	3	1,61%	1,61%
30-39 anys	5	2,69%	2,69%
40-49 anys	6	3,23%	3,23%
50-59 anys	3	1,61%	1,61%
≥ 60 anys	12	6,45%	6,45%
TOTAL	186	100,0%	100,0%

Taula 69. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	80	43,01%	43,01%
Home	106	56,99%	56,99%
TOTAL	186	100,0%	100,0%

Figura 43. Distribució estacional



Taula 70. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
No consta	186	100,0%	No consta
TOTAL	186	100,0%	No consta

Taula 71. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Fibroskòpia	4	2,14%	2,14%
Aspiració nasofaríngia	176	94,12%	94,12%
Altres mostres*	7	3,74%	3,74%
TOTAL	187	100,0%	100,0%

* 6 rentada broncoalveolar; 1 aspirat traqueal.

Taula 72. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	55	29,1%	29,1%
Cultiu	65	34,39%	34,39%
Detecció d'antigen	69	36,51%	36,51%
TOTAL	189	100,0%	100,0%



Figura 44. Evolució anual 1995-2013

Figura 45. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



5.2. *Bordetella pertussis*


Taula 73. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	4	2,21%	2,22%
1-11 mesos	59	32,6%	32,78%
1-4 anys	36	19,89%	20,0%
5-9 anys	20	11,05%	11,11%
10-14 anys	30	16,57%	16,67%
15-19 anys	2	1,1%	1,11%
20-29 anys	1	0,55%	0,56%
30-39 anys	13	7,18%	7,22%
40-49 anys	7	3,87%	3,89%
50-59 anys	4	2,21%	2,22%
≥ 60 anys	4	2,21%	2,22%
No consta	1	0,55%	No consta
TOTAL	181	100,0%	100,0%

Taula 74. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	88	48,62%	48,62%
Home	93	51,38%	51,38%
TOTAL	181	100,0%	100,0%

Figura 46. Distribució estacional



Taula 75. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspiració nasofaríngia	181	100,0%	100,0%
TOTAL	181	100,0%	100,0%

Taula 76. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	177	87,62%	87,62%
Cultiu	23	11,39%	11,39%
Detecció d'antigen	2	0,99%	0,99%
TOTAL	202	100,0%	100,0%



Figura 47. Evolució anual 1996-2013

Figura 48. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



5.3. *Chlamydomphila*


Taula 77. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
10-14 anys	2	33,33%	33,33%
15-19 anys	1	16,67%	16,67%
30-39 anys	1	16,67%	16,67%
≥ 60 anys	2	33,33%	33,33%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Taula 78. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	4	66,67%	66,67%
Home	2	33,33%	33,33%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Figura 49. Distribució estacional



Taula 79. Distribució segons l'espècie



ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>	6	100,0%	100,0%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Taula 80. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	6	100,0%	100,0%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Taula 81. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	4	66,67%	66,67%
Títol alt	2	33,33%	33,33%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Figura 50. Evolució anual 1995-2013**Figura 51. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

5.4. *Coxiella burnetii*


Taula 82. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
20-29 anys	4	20,0%	20,0%
30-39 anys	2	10,0%	10,0%
40-49 anys	6	30,0%	30,0%
50-59 anys	1	5,0%	5,0%
≥ 60 anys	7	35,0%	35,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Taula 83. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	6	30,0%	30,0%
Home	14	70,0%	70,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Figura 52. Distribució estacional





Taula 84. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	20	100,0%	100,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Taula 85. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	7	35,0%	35,0%
Seroconversió	2	10,0%	10,0%
IgG en fase II	11	55,0%	55,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Figura 53. Evolució anual 1995-2013**Figura 54. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

5.5. *Haemophilus influenzae*


Taula 86. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	1	0,3%	0,3%
1-4 anys	4	1,19%	1,2%
5-9 anys	3	0,89%	0,9%
15-19 anys	1	0,3%	0,3%
20-29 anys	2	0,59%	0,6%
30-39 anys	15	4,45%	4,5%
40-49 anys	16	4,75%	4,8%
50-59 anys	31	9,2%	9,31%
≥ 60 anys	260	77,15%	78,08%
No consta	4	1,19%	No consta
TOTAL	337	100,0%	100,0%

Taula 87. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	124	36,8%	37,24%
Home	209	62,02%	62,76%
No consta	4	1,19%	No consta
TOTAL	337	100,0%	100,0%

Figura 55. Distribució estacional



Taula 88. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus b	2	0,59%	28,57%
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus no b	2	0,59%	28,57%
<i>Haemophilus influenzae</i> no tipificable	3	0,89%	42,86%
<i>Haemophilus</i> sense tipificar	330	97,92%	No consta
TOTAL	337	100,0%	100,0%

Taula 89. Distribució segons el biotipus

BIOTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biotipus III	1	0,3%	100,0%
No consta	336	99,7%	No consta
TOTAL	337	100,0%	100,0%

Taula 90. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Secreació respiratòria	8	2,35%	2,37%
Sang	25	7,35%	7,42%
Fibrosòpia	7	2,06%	2,08%
Aspiració nasofaríngia	2	0,59%	0,59%
Líquid pleural	2	0,59%	0,59%
Altres mostres*	296	87,06%	87,83%
TOTAL	340	100,0%	100,0%

* 256 esput; 29 aspiració broncoalveolar; 5 secrecions bronquials; 3 aspiració endotraqueal; 2 rentada broncoalveolar; 1 raspallada protegida.

Taula 91. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	337	100,0%	100,0%
TOTAL	337	100,0%	100,0%

Figura 56. Evolució anual 1995-2013





Figura 57. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



5.6. *Legionella*


Taula 92. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	1	0,62%	0,63%
20-29 anys	2	1,24%	1,25%
30-39 anys	9	5,59%	5,63%
40-49 anys	25	15,53%	15,63%
50-59 anys	25	15,53%	15,63%
≥ 60 anys	98	60,87%	61,25%
No consta	1	0,62%	No consta
TOTAL	161	100,0%	100,0%

Taula 93. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	41	25,47%	25,63%
Home	119	73,91%	74,38%
No consta	1	0,62%	No consta
TOTAL	161	100,0%	100,0%

Figura 58. Distribució estacional



Taula 94. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Legionella pneumophila</i>	161	100,0%	100,0%
TOTAL	161	100,0%	100,0%

Taula 95. Distribució segons el serogrup

SEROGRUP	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Legionella pneumophila</i> del serogrup 1	17	10,56%	100,0%
No consta	144	89,44%	No consta
TOTAL	161	100,0%	100,0%

Taula 96. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	153	93,29%	93,29%
Sèrum	2	1,22%	1,22%
Altres mostres*	9	5,49%	5,49%
TOTAL	164	100,0%	100,0%

* 7 esput; 1 necròpsia de pulmó; 1 secreció traqueobronquial.

Taula 97. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	5	3,03%	3,03%
Cultiu	9	5,45%	5,45%
Detecció d'antigen	149	90,3%	90,3%
IgM	2	1,21%	1,21%
TOTAL	165	100,0%	100,0%

5.7. *Mycoplasma pneumoniae*


Taula 98. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	2	0,72%	0,72%
1-4 anys	37	13,31%	13,41%
5-9 anys	67	24,1%	24,28%
10-14 anys	30	10,79%	10,87%
15-19 anys	4	1,44%	1,45%
20-29 anys	20	7,19%	7,25%
30-39 anys	28	10,07%	10,14%
40-49 anys	30	10,79%	10,87%
50-59 anys	14	5,04%	5,07%
≥ 60 anys	44	15,83%	15,94%
No consta	2	0,72%	No consta
TOTAL	278	100,0%	100,0%

Taula 99. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	140	50,36%	50,54%
Home	137	49,28%	49,46%
No consta	1	0,36%	No consta
TOTAL	278	100,0%	100,0%

Figura 61. Distribució estacional



Taula 100. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspiració nasofaríngia	1	0,36%	0,36%
Rentada broncoalveolar	1	0,36%	0,36%
Sèrum	276	99,28%	99,28%
TOTAL	278	100,0%	100,0%

Taula 101. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	2	0,72%	0,72%
IgM	229	82,37%	82,37%
Seroconversió	2	0,72%	0,72%
Títol alt	45	16,19%	16,19%
TOTAL	278	100,0%	100,0%



Figura 62. Evolució anual 1995-2013

Figura 63. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



5.8. Pneumococ


Taula 102. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	5	0,21%	0,21%
1-11 mesos	29	1,24%	1,24%
1-4 anys	104	4,43%	4,44%
5-9 anys	46	1,96%	1,96%
10-14 anys	8	0,34%	0,34%
15-19 anys	15	0,64%	0,64%
20-29 anys	27	1,15%	1,15%
30-39 anys	109	4,65%	4,65%
40-49 anys	205	8,74%	8,75%
50-59 anys	249	10,61%	10,63%
≥ 60 anys	1.545	65,86%	65,97%
No consta	4	0,17%	No consta
TOTAL	2.346	100,0%	100,0%

Taula 103. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	955	40,71%	40,78%
Home	1.387	59,12%	59,22%
No consta	4	0,17%	No consta
TOTAL	2.346	100,0%	100,0%

Figura 64. Distribució estacional



Taula 104. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1	71	3,03%	11,85%
10A	13	0,55%	2,17%
11A	13	0,55%	2,17%
12F	39	1,66%	6,51%
13	4	0,17%	0,67%
14	33	1,41%	5,51%
15A	9	0,38%	1,5%
15B	8	0,34%	1,34%
15C	1	0,04%	0,17%
16F	8	0,34%	1,34%
17F	6	0,26%	1,0%
18A	1	0,04%	0,17%
18C	7	0,3%	1,17%
19A	46	1,96%	7,68%
19F	8	0,34%	1,34%
20	2	0,09%	0,33%
21	1	0,04%	0,17%
22A	1	0,04%	0,17%
22F	24	1,02%	4,01%
23A	7	0,3%	1,17%
23B	4	0,17%	0,67%
23F	3	0,13%	0,5%
24F	20	0,85%	3,34%
29	3	0,13%	0,5%
3	78	3,32%	13,02%
31	9	0,38%	1,5%
33F	7	0,3%	1,17%
34	5	0,21%	0,83%
35B	6	0,26%	1,0%
35C	1	0,04%	0,17%
35F	2	0,09%	0,33%
38	6	0,26%	1,0%
4	10	0,43%	1,67%
6A	4	0,17%	0,67%
6B	5	0,21%	0,83%
6C	23	0,98%	3,84%
7F	34	1,45%	5,68%
8	36	1,53%	6,01%

9N	17	0,72%	2,84%
9V	11	0,47%	1,84%
Altres	13	0,55%	2,17%
No consta	1.747	74,47%	No consta
TOTAL	2.346	100,0%	100,0%

Taula 105. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	1.510	59,29%	59,29%
Sang	638	25,05%	25,05%
Fibrososcòpia	6	0,24%	0,24%
Aspiració nasofaríngia	4	0,16%	0,16%
Líquid pleural	89	3,49%	3,49%
Altres mostres*	300	11,78%	11,78%
TOTAL	2.547	100,0%	100,0%

* 245 esput; 31 aspiració broncoalveolar; 8 secrecions bronquials; 6 aspiració endotraqueal; 4 rentada broncoalveolar; 3 biòpsia pulmonar; 1 punció transabdominal; 1 raspallada protegida; 1 traqueostomia.

Taula 106. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	50	1,97%	1,97%
Cultiu	974	38,29%	38,29%
Detecció d'antigen	1.520	59,75%	59,75%
TOTAL	2.544	100,0%	100,0%

Figura 65. Evolució anual 1995-2013





Figura 66. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



5.9. Virus de la grip


Taula 107. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	12	1,21%	1,21%
1-11 mesos	103	10,35%	10,35%
1-4 anys	196	19,7%	19,7%
5-9 anys	110	11,06%	11,06%
10-14 anys	40	4,02%	4,02%
15-19 anys	10	1,01%	1,01%
20-29 anys	25	2,51%	2,51%
30-39 anys	77	7,74%	7,74%
40-49 anys	74	7,44%	7,44%
50-59 anys	93	9,35%	9,35%
≥ 60 anys	255	25,63%	25,63%
TOTAL	995	100,0%	100,0%

Taula 108. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	488	49,05%	49,05%
Home	507	50,95%	50,95%
TOTAL	995	100,0%	100,0%

Figura 67. Distribució estacional



Taula 109. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Virus de la grip A	320	32,16%	32,16%
Virus de la grip B	673	67,64%	67,64%
Virus de la grip C	2	0,2%	0,2%
TOTAL	995	100,0%	100,0%

Taula 110. Distribució segons el subtipus

SUBTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
H3N2	26	2,61%	19,85%
Nou H1N1	105	10,55%	80,15%
No consta	864	86,83%	No consta
TOTAL	995	100,0%	100,0%

Taula 111. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspiració nasofaríngia	983	98,79%	98,79%
Altres mostres*	12	1,21%	1,21%
TOTAL	995	100,0%	100,0%

* 10 rentada broncoalveolar; 2 aspiració traqueal.

Taula 112. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	545	53,17%	53,17%
Cultiu	136	13,27%	13,27%
Detecció d'antigen	344	33,56%	33,56%
TOTAL	1.025	100,0%	100,0%

Figura 68. Evolució anual 1995-2013





Figura 69. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



5.10. Virus de la parainfluença


Taula 113. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	2	1,27%	1,27%
1-11 mesos	58	36,71%	36,71%
1-4 anys	31	19,62%	19,62%
5-9 anys	12	7,59%	7,59%
10-14 anys	6	3,8%	3,8%
15-19 anys	1	0,63%	0,63%
20-29 anys	1	0,63%	0,63%
30-39 anys	9	5,7%	5,7%
40-49 anys	5	3,16%	3,16%
50-59 anys	8	5,06%	5,06%
≥ 60 anys	25	15,82%	15,82%
TOTAL	158	100,0%	100,0%

Taula 114. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	69	43,67%	43,67%
Home	89	56,33%	56,33%
TOTAL	158	100,0%	100,0%

Figura 70. Distribució estacional



Taula 115. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Virus de la parainfluença 1	44	27,85%	29,14%
Virus de la parainfluença 2	17	10,76%	11,26%
Virus de la parainfluença 3	90	56,96%	59,6%
No consta	7	4,43%	No consta
TOTAL	158	100,0%	100,0%

Taula 116. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Aspiració nasofaríngia	146	91,25%	91,25%
Fibroscòpia	4	2,5%	2,5%
Altres mostres*	10	6,25%	6,25%
TOTAL	160	100,0%	100,0%

* 6 rentada broncoalveolar, 4 aspiració broncoselectiva.

Taula 117. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	49	30,82%	30,82%
Cultiu	28	17,61%	17,61%
Detecció d'antigen	82	51,57%	51,57%
TOTAL	159	100,0%	100,0%



Figura 71. Evolució anual 1995-2013

Figura 72. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



5.11. Virus respiratori sincicial


Taula 118. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	113	10,25%	10,29%
1-11 mesos	682	61,89%	62,11%
1-4 anys	227	20,6%	20,67%
5-9 anys	15	1,36%	1,37%
10-14 anys	6	0,54%	0,55%
15-19 anys	2	0,18%	0,18%
20-29 anys	6	0,54%	0,55%
30-39 anys	5	0,45%	0,46%
40-49 anys	5	0,45%	0,46%
50-59 anys	8	0,73%	0,73%
≥ 60 anys	29	2,63%	2,64%
No consta	4	0,36%	No consta
TOTAL	1.102	100,0%	100,0%

Taula 119. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	475	43,1%	43,54%
Home	616	55,9%	56,46%
No consta	11	1,0%	No consta
TOTAL	1.102	100,0%	100,0%

Figura 73. Distribució estacional



Taula 120. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	1	0,09%	0,09%
Sèrum	1	0,09%	0,09%
Aspiració nasofaríngia	1.091	98,91%	98,91%
Altres mostres*	10	0,91%	0,91%
TOTAL	1.103	100,0%	100,0%

* 5 rentada broncoalveolar; 3 aspiració traqueal; 2 aspiració broncoselectiva.

Taula 121. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	91	8,02%	8,02%
Cultiu	29	2,56%	2,56%
Detecció d'antigen	1.014	89,42%	89,42%
TOTAL	1.134	100,0%	100,0%


Figura 74. Evolució anual 1995-2013

Figura 75. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant





Figura 76. Infeccions de les vies respiratòries: distribució segons l'agent causal



6. Agents causants d'enteritis

6.1. Adenovirus


Taula 122. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	6	2,52%	2,52%
1-11 mesos	77	32,35%	32,35%
1-4 anys	124	52,1%	52,1%
5-9 anys	17	7,14%	7,14%
10-14 anys	2	0,84%	0,84%
15-19 anys	2	0,84%	0,84%
20-29 anys	1	0,42%	0,42%
30-39 anys	2	0,84%	0,84%
40-49 anys	2	0,84%	0,84%
50-59 anys	1	0,42%	0,42%
≥ 60 anys	4	1,68%	1,68%
TOTAL	238	100,0%	100,0%

Taula 123. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	113	47,48%	47,48%
Home	125	52,52%	52,52%
TOTAL	238	100,0%	100,0%

Figura 77. Distribució estacional



Taula 124. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Adenovirus 40-41	5	2,1%	100,0%
No consta	233	97,9%	No consta
TOTAL	238	100,0%	100,0%

Taula 125. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	238	100,0%	100,0%
TOTAL	238	100,0%	100,0%

Taula 126. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'antigen	238	100,0%	100,0%
TOTAL	238	100,0%	100,0%



Figura 78. Evolució anual 1995-2013

Figura 79. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



6.2. *Campylobacter*


Taula 127. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	6	0,17%	0,17%
1-11 mesos	493	13,58%	13,66%
1-4 anys	1.549	42,67%	42,93%
5-9 anys	425	11,71%	11,78%
10-14 anys	147	4,05%	4,07%
15-19 anys	81	2,23%	2,25%
20-29 anys	140	3,86%	3,88%
30-39 anys	119	3,28%	3,3%
40-49 anys	102	2,81%	2,83%
50-59 anys	122	3,36%	3,38%
≥ 60 anys	424	11,68%	11,75%
No consta	22	0,61%	No consta
TOTAL	3.630	100,0%	100,0%

Taula 128. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	1.556	42,87%	43,01%
Home	2.062	56,8%	56,99%
No consta	12	0,33%	No consta
TOTAL	3.630	100,0%	100,0%

Figura 80. Distribució estacional



Taula 129. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Campylobacter coli</i>	66	1,82%	2,0%
<i>Campylobacter coli-jejuni</i>	29	0,8%	0,88%
<i>Campylobacter fetus</i>	2	0,06%	0,06%
<i>Campylobacter jejuni</i>	3.196	88,04%	96,85%
<i>Campylobacter lari</i>	7	0,19%	0,21%
<i>Campylobacter spp.</i>	330	9,09%	No consta
TOTAL	3.630	100,0%	100,0%

Taula 130. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	3.624	99,7%	99,7%
Sang	10	0,28%	0,28%
Líquid peritoneal	1	0,03%	0,03%
TOTAL	3.635	100,0%	100,0%

Taula 131. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	3.630	100,0%	100,0%
TOTAL	3.630	100,0%	100,0%



Figura 81. Evolució anual 1995-2013

Figura 82. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



6.3. *Escherichia coli* enterotoxigen


Taula 132. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	5	15,63%	15,63%
10-14 anys	1	3,13%	3,13%
15-19 anys	1	3,13%	3,13%
20-29 anys	7	21,88%	21,88%
30-39 anys	8	25,0%	25,0%
40-49 anys	6	18,75%	18,75%
50-59 anys	3	9,38%	9,38%
≥ 60 anys	1	3,13%	3,13%
TOTAL	32	100,0%	100,0%

Taula 133. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	18	56,25%	56,25%
Home	14	43,75%	43,75%
TOTAL	32	100,0%	100,0%

Figura 83. Distribució estacional



Taula 134. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Escherichia coli</i> O157:H7	4	12,5%	100,0%
No consta	28	87,5%	No consta
TOTAL	32	100,0%	100,0%

Taula 135. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	32	100,0%	100,0%
TOTAL	32	100,0%	100,0%

Taula 136. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	20	62,5%	62,5%
Cultiu	12	37,5%	37,5%
TOTAL	32	100,0%	100,0%



Figura 84. Evolució anual 1999-2013

Figura 85. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



6.4. Rotavirus


Taula 137. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	35	2,11%	2,11%
1-11 mesos	615	37,05%	37,07%
1-4 anys	902	54,34%	54,37%
5-9 anys	39	2,35%	2,35%
10-14 anys	10	0,6%	0,6%
15-19 anys	2	0,12%	0,12%
20-29 anys	1	0,06%	0,06%
30-39 anys	10	0,6%	0,6%
40-49 anys	8	0,48%	0,48%
50-59 anys	7	0,42%	0,42%
≥ 60 anys	21	1,27%	1,27%
No consta	10	0,6%	No consta
TOTAL	1.660	100,0%	100,0%

Taula 138. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	747	45,0%	45,03%
Home	912	54,94%	54,97%
No consta	1	0,06%	No consta
TOTAL	1.660	100,0%	100,0%

Figura 86. Distribució estacional



Taula 139. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	1.660	100,0%	100,0%
TOTAL	1.660	100,0%	100,0%

Taula 140. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Detecció d'antigen	1.660	100,0%	100,0%
TOTAL	1.660	100,0%	100,0%

Figura 87. Evolució anual 1995-2013





Figura 88. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



6.5. *Salmonella* no tifòdica


Taula 141. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	1	0,04%	0,04%
1-11 mesos	131	5,72%	5,74%
1-4 anys	877	38,28%	38,4%
5-9 anys	397	17,33%	17,38%
10-14 anys	106	4,63%	4,64%
15-19 anys	47	2,05%	2,06%
20-29 anys	70	3,06%	3,06%
30-39 anys	93	4,06%	4,07%
40-49 anys	98	4,28%	4,29%
50-59 anys	101	4,41%	4,42%
≥ 60 anys	363	15,84%	15,89%
No consta	7	0,31%	No consta
TOTAL	2.291	100,0%	100,0%

Taula 142. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	1.092	47,66%	47,79%
Home	1.193	52,07%	52,21%
No consta	6	0,26%	No consta
TOTAL	2.291	100,0%	100,0%

Figura 89. Distribució estacional



Taula 143. Distribució segons el grup

GRUP	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Salmonella</i> no tifòdica 4,5	307	13,4%	35,09%
<i>Salmonella</i> no tifòdica 6,7	8	0,35%	0,91%
<i>Salmonella</i> no tifòdica 6,8	4	0,17%	0,46%
<i>Salmonella</i> no tifòdica 8	12	0,52%	1,37%
<i>Salmonella</i> no tifòdica 9	17	0,74%	1,94%
<i>Salmonella</i> no tifòdica A	3	0,13%	0,34%
<i>Salmonella</i> no tifòdica B	176	7,68%	20,11%
<i>Salmonella</i> no tifòdica C	35	1,53%	4,0%
<i>Salmonella</i> no tifòdica C1	15	0,65%	1,71%
<i>Salmonella</i> no tifòdica C2	11	0,48%	1,26%
<i>Salmonella</i> no tifòdica C3	2	0,09%	0,23%
<i>Salmonella</i> no tifòdica D	59	2,58%	6,74%
<i>Salmonella</i> no tifòdica E 3,10,15	2	0,09%	0,23%
<i>Salmonella</i> no tifòdica OMA	148	6,46%	16,91%
<i>Salmonella</i> no tifòdica OMA, OMB	60	2,62%	6,86%
<i>Salmonella</i> no tifòdica OMB	14	0,61%	1,6%
<i>Salmonella</i> no tifòdica OMB 6,7,8	2	0,09%	0,23%
No consta	1.416	61,81%	No consta
TOTAL	2.291	100,0%	100,0%

Taula 144. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Salmonella arizonae</i>	3	0,13%	0,27%
<i>Salmonella blockey</i>	1	0,04%	0,09%
<i>Salmonella bredeney</i>	2	0,09%	0,18%
<i>Salmonella cholerasuis</i>	3	0,13%	0,27%
<i>Salmonella enteritidis</i>	263	11,48%	23,87%
<i>Salmonella hadar</i>	1	0,04%	0,09%
<i>Salmonella infantis</i>	2	0,09%	0,18%
<i>Salmonella poona</i>	2	0,09%	0,18%
<i>Salmonella typhimurium</i>	825	36,01%	74,86%
<i>Salmonella</i> spp.	1.189	51,9%	No consta
TOTAL	2.291	100,0%	100,0%

Taula 145. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	16	0,7%	0,7%
Sang	19	0,83%	0,83%
Femta	2.255	98,09%	98,09%
Soca	4	0,17%	0,17%
Altres mostres*	5	0,22%	0,22%
TOTAL	2.299	100,0%	100,0%

* 4 líquid peritoneal; 1 biòpsia de còlon.

Taula 146. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	2.291	100,0%	100,0%
TOTAL	2.291	100,0%	100,0%



Figura 90. Evolució anual 1995-2013

Figura 91. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



6.6. *Shigella*


Taula 147. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	9	12,86%	12,86%
5-9 anys	3	4,29%	4,29%
10-14 anys	2	2,86%	2,86%
15-19 anys	3	4,29%	4,29%
20-29 anys	16	22,86%	22,86%
30-39 anys	16	22,86%	22,86%
40-49 anys	12	17,14%	17,14%
50-59 anys	5	7,14%	7,14%
≥ 60 anys	4	5,71%	5,71%
TOTAL	70	100,0%	100,0%

Taula 148. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	35	50,0%	50,0%
Home	35	50,0%	50,0%
TOTAL	70	100,0%	100,0%

Figura 92. Distribució estacional



Taula 149. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Shigella boydii</i>	3	4,29%	4,48%
<i>Shigella dysenteriae</i>	1	1,43%	1,49%
<i>Shigella flexneri</i>	31	44,29%	46,27%
<i>Shigella sonnei</i>	32	45,71%	47,76%
<i>Shigella</i> spp.	3	4,29%	No consta
TOTAL	70	100,0%	100,0%

Taula 150. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina	1	1,43%	1,43%
Femta	69	98,57%	98,57%
TOTAL	70	100,0%	100,0%

Taula 151. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	70	100,0%	100,0%
TOTAL	70	100,0%	100,0%



Figura 93. Evolució anual 1995-2013

Figura 94. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



6.7. *Vibrio*


Taula 152. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
20-29 anys	1	33,33%	33,33%
≥ 60 anys	2	66,67%	66,67%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Taula 153. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	1	33,33%	33,33%
Home	2	66,67%	66,67%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Figura 95. Distribució estacional



Taula 154. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Vibrio fluvialis</i>	1	33,33%	33,33%
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	2	66,67%	66,67%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Taula 155. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
No consta	3	100,0%	No consta
TOTAL	3	100,0%	No consta

Taula 156. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	3	100,0%	100,0%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Taula 157. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	3	100,0%	100,0%
TOTAL	3	100,0%	100,0%



Figura 96. Evolució anual 1995-2013

Figura 97. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



6.8. *Yersinia*


Taula 158. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	2	25,0%	25,0%
5-9 anys	1	12,5%	12,5%
20-29 anys	1	12,5%	12,5%
30-39 anys	3	37,5%	37,5%
50-59 anys	1	12,5%	12,5%
TOTAL	8	100,0%	100,0%

Taula 159. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	2	25,0%	25,0%
Home	6	75,0%	75,0%
TOTAL	8	100,0%	100,0%

Figura 98. Distribució estacional



Taula 160. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Yersinia enterocolitica</i>	8	100,0%	100,0%
TOTAL	8	100,0%	100,0%

Taula 161. Distribució segons el grup

GRUP	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Yersinia enterocolitica</i> O3	8	100,0%	100,0%
TOTAL	8	100,0%	100,0%

Taula 162. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Femta	8	100,0%	100,0%
TOTAL	8	100,0%	100,0%

Taula 163. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	8	100,0%	100,0%
TOTAL	8	100,0%	100,0%


Figura 99. Evolució anual 1995-2013

Figura 100. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant





Figura 101. Enteritis: distribució segons l'agent causal



7. Agents causants de bacterièmies sense focus

7.1. *Haemophilus influenzae*


Taula 164. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
30-39 anys	2	10,0%	10,0%
40-49 anys	2	10,0%	10,0%
50-59 anys	4	20,0%	20,0%
≥ 60 anys	12	60,0%	60,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Taula 165. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	9	45,0%	45,0%
Home	11	55,0%	55,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Figura 102. Distribució estacional



Taula 166. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus b	1	5,0%	20,0%
<i>Haemophilus influenzae</i> serotipus no b	2	10,0%	40,0%
<i>Haemophilus influenzae</i> no tipificable	2	10,0%	40,0%
<i>Haemophilus</i> sense tipificar	15	75,0%	No consta
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Taula 167. Distribució segons el biotipus

BIOTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biotipus III	1	5,0%	50,0%
Biotipus IV	1	5,0%	50,0%
No consta	18	90,0%	No consta
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Taula 168. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	20	100,0%	100,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Taula 169. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	20	100,0%	100,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Figura 103. Evolució anual 1997-2013





Figura 104. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



7.2. *Listeria monocytogenes*


Taula 170. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	6	14,63%	14,63%
20-29 anys	4	9,76%	9,76%
30-39 anys	3	7,32%	7,32%
40-49 anys	1	2,44%	2,44%
50-59 anys	3	7,32%	7,32%
≥ 60 anys	24	58,54%	58,54%
TOTAL	41	100,0%	100,0%

Taula 171. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	25	60,98%	60,98%
Home	16	39,02%	39,02%
TOTAL	41	100,0%	100,0%

Figura 105. Distribució estacional



Taula 172. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Listeria monocytogenes</i> 1/2 b	1	2,44%	14,28%
<i>Listeria monocytogenes</i> 1	2	4,88%	28,58%
<i>Listeria monocytogenes</i> 4	2	4,88%	28,58%
<i>Listeria monocytogenes</i> 4a	1	2,44%	14,28%
<i>Listeria monocytogenes</i> 4abc	1	2,44%	14,28%
No consta	34	82,93%	No consta
TOTAL	41	100,0%	100,0%

Taula 173. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	41	100,0%	100,0%
TOTAL	41	100,0%	100,0%

Taula 174. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	2,44%	2,44%
Cultiu	40	97,56%	97,56%
TOTAL	41	100,0%	100,0%



Figura 106. Evolució anual 2000-2013

Figura 107. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



7.3. Meningococ


Taula 175. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	3	50,0%	50,0%
30-39 anys	1	16,67%	16,67%
≥ 60 anys	2	33,33%	33,33%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Taula 176. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	6	100,0%	100,0%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Figura 108. Distribució estacional



Taula 177. Distribució segons el grup



GRUP	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Meningococ del grup B	3	50,0%	60,0%
Meningococ del grup W135	1	16,67%	20,0%
Meningococ no agrupable/autoaglutinable	1	16,67%	20,0%
No consta	1	16,67%	No consta
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Taula 178. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	6	100,0%	100,0%
TOTAL	6	100,0%	100,0%

Taula 179. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	2	28,57%	28,57%
Cultiu	5	71,43%	71,43%
TOTAL	7	100,0%	100,0%

Figura 109. Evolució anual 2000-2013**Figura 110. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

7.4. Pneumococ


Taula 180. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	8	5,76%	5,76%
1-4 anys	15	10,79%	10,79%
5-9 anys	1	0,72%	0,72%
10-14 anys	2	1,44%	1,44%
15-19 anys	2	1,44%	1,44%
20-29 anys	7	5,04%	5,04%
30-39 anys	6	4,32%	4,32%
40-49 anys	5	3,6%	3,6%
50-59 anys	11	7,91%	7,91%
≥ 60 anys	82	58,99%	58,99%
TOTAL	139	100,0%	100,0%

Taula 181. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	56	40,29%	40,29%
Home	83	59,71%	59,71%
TOTAL	139	100,0%	100,0%

Figura 111. Distribució estacional



Taula 182. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1	7	5,04%	5,38%
10A	2	1,44%	1,54%
11A	4	2,88%	3,08%
12F	8	5,76%	6,15%
14	8	5,76%	6,15%
15A	4	2,88%	3,08%
15B	2	1,44%	1,54%
16F	1	0,72%	0,77%
17F	2	1,44%	1,54%
18C	1	0,72%	0,77%
19A	8	5,76%	6,15%
19F	2	1,44%	1,54%
22F	3	2,16%	2,31%
23A	3	2,16%	2,31%
23B	6	4,32%	4,62%
23F	2	1,44%	1,54%
24F	13	9,35%	10,0%
29	3	2,16%	2,31%
3	9	6,47%	6,92%
31	1	0,72%	0,77%
33F	1	0,72%	0,77%
34	1	0,72%	0,77%
35B	2	1,44%	1,54%
35F	2	1,44%	1,54%
38	2	1,44%	1,54%
4	2	1,44%	1,54%
6A	4	2,88%	3,08%
6B	1	0,72%	0,77%
6C	4	2,88%	3,08%
7F	10	7,19%	7,69%
8	3	2,16%	2,31%
9N	6	4,32%	4,62%
9V	2	1,44%	1,54%
Altres	1	0,72%	0,77%
No consta	9	6,47%	No consta
TOTAL	139	100,0%	100,0%

Taula 183. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Orina*	6	4,14%	4,14%
Sang	139	95,86%	95,86%
TOTAL	145	100,0%	100,0%

* També aïllat en sang.

Taula 184. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	139	95,86%	95,86%
Detecció d'antigen	6	4,14%	4,14%
TOTAL	145	100,0%	100,0%



Figura 112. Evolució anual 1995-2013

Figura 113. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



7.5. *Salmonella typhi* i *paratyphi*


Taula 185. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	2	11,76%	11,76%
5-9 anys	2	11,76%	11,76%
10-14 anys	1	5,88%	5,88%
15-19 anys	1	5,88%	5,88%
20-29 anys	4	23,53%	23,53%
30-39 anys	3	17,65%	17,65%
40-49 anys	2	11,76%	11,76%
50-59 anys	1	5,88%	5,88%
≥ 60 anys	1	5,88%	5,88%
TOTAL	17	100,0%	100,0%

Taula 186. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	7	41,18%	41,18%
Home	10	58,82%	58,82%
TOTAL	17	100,0%	100,0%

Figura 114. Distribució estacional



Taula 187. Distribució segons el serovar

SEROVAR	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Salmonella paratyphi</i> A	9	52,94%	100,0%
No consta	8	47,06%	No consta
TOTAL	17	100,0%	100,0%

Taula 188. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	17	100,0%	100,0%
TOTAL	17	100,0%	100,0%

Taula 189. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	17	100,0%	100,0%
TOTAL	17	100,0%	100,0%



Figura 115. Evolució anual 1995-2013

Figura 116. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



7.6. *Streptococcus agalactiae*


Taula 190. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
< 1 mes	12	24,49%	25,0%
1-11 mesos	9	18,37%	18,75%
1-4 anys	1	2,04%	2,08%
10-14 anys	1	2,04%	2,08%
30-39 anys	1	2,04%	2,08%
50-59 anys	6	12,24%	12,5%
≥ 60 anys	18	36,73%	37,5%
No consta	1	2,04%	No consta
TOTAL	49	100,0%	100,0%

Taula 191. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	28	57,14%	57,14%
Home	21	42,86%	42,86%
TOTAL	49	100,0%	100,0%

Figura 117. Distribució estacional



Taula 192. Distribució segons el caràcter

CARÀCTER	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Fenotip M -	2	4,08%	100,0%
No consta fenotip M	47	95,92%	No consta
TOTAL	49	100,0%	100,0%

Taula 193. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	49	100,0%	100,0%
TOTAL	49	100,0%	100,0%

Taula 194. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	3	6,12%	6,12%
Cultiu	46	93,88%	93,88%
TOTAL	49	100,0%	100,0%


Figura 118. Evolució anual 2001-2013

Figura 119. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant





Figura 120. Bacterièmies sense focus: distribució segons l'agent causal



8. Agents causants d'altres malalties infeccioses

8.1. *Brucella*


Taula 195. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
≥ 60 anys	3	100,0%	100,0%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Taula 196. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Home	3	100,0%	100,0%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Figura 121. Distribució estacional



Taula 197. Distribució segons l'espècie



ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Brucella</i> spp.	3	100,0%	No consta
TOTAL	3	100,0%	No consta

Taula 198. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	3	100,0%	100,0%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Taula 199. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	3	100,0%	100,0%
TOTAL	3	100,0%	100,0%

Figura 122. Evolució anual 1995-2013**Figura 123. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

8.2. Dengue


Taula 200. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	2	5,26%	6,06%
10-14 anys	2	5,26%	6,06%
15-19 anys	1	2,63%	3,03%
20-29 anys	4	10,53%	12,12%
30-39 anys	15	39,47%	45,45%
40-49 anys	4	10,53%	12,12%
50-59 anys	5	13,16%	15,15%
No consta	5	13,16%	No consta
TOTAL	38	100,0%	100,0%

Taula 201. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	20	52,63%	52,63%
Home	18	47,37%	47,37%
TOTAL	38	100,0%	100,0%

Figura 124. Distribució estacional



Taula 202. Distribució segons el serotipus

SEROTIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dengue serotipus 1	1	2,63%	100,0%
No consta	37	97,37%	No consta
TOTAL	38	100,0%	100,0%

Taula 203. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	1	2,63%	2,63%
Sèrum	37	97,37%	97,37%
TOTAL	38	100,0%	100,0%

Taula 204. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	2,63%	2,63%
IgM	37	97,37%	97,37%
TOTAL	38	100,0%	100,0%



Figura 125. Evolució anual 2007-2013

Figura 126. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant

8.3. *Leishmania*


Taula 205. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	1	7,14%	7,69%
1-4 anys	1	7,14%	7,69%
5-9 anys	1	7,14%	7,69%
30-39 anys	3	21,43%	23,08%
40-49 anys	1	7,14%	7,69%
50-59 anys	3	21,43%	23,08%
≥ 60 anys	3	21,43%	23,08%
No consta	1	7,14%	No consta
TOTAL	14	100,0%	100,0%

Taula 206. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	4	28,57%	28,57%
Home	10	71,43%	71,43%
TOTAL	14	100,0%	100,0%

Figura 127. Distribució estacional



Taula 207. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Leishmania</i> spp.	14	100,0%	No consta
TOTAL	14	100,0%	No consta

Taula 208. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	5	33,33%	33,33%
Medul·la òssia	10	66,67%	66,67%
TOTAL	15	100,0%	100,0%

Taula 209. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	5	33,33%	33,33%
Cultiu	2	13,33%	13,33%
Examen directe	4	26,67%	26,67%
Títol alt	4	26,67%	26,67%
TOTAL	15	100,0%	100,0%



Figura 128. Evolució anual 1995-2013

Figura 129. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



8.4. *Listeria monocytogenes*


Taula 210. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
20-29 anys	3	23,08%	25,0%
30-39 anys	6	46,15%	50,0%
≥ 60 anys	3	23,08%	25,0%
No consta	1	7,69%	No consta
TOTAL	13	100,0%	100,0%

Taula 211. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	10	76,92%	76,92%
Home	3	23,08%	23,08%
TOTAL	13	100,0%	100,0%

Figura 130. Distribució estacional



Taula 212. Distribució segons l'espècie

ESPÈCIE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Listeria monocytogenes</i> 4	1	7,69%	20,0%
<i>Listeria monocytogenes</i> 4abc	4	30,77%	80,0%
No consta	8	61,54%	No consta
TOTAL	13	100,0%	100,0%

Taula 213. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	2	10,53%	10,53%
Líquid articular	1	5,26%	5,26%
Líquid peritoneal	1	5,26%	5,26%
Líquid amniòtic	5	26,32%	26,32%
Placenta	9	47,37%	47,37%
Bilis	1	5,26%	5,26%
TOTAL	19	100,0%	100,0%

Taula 214. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	13	100,0%	100,0%
TOTAL	13	100,0%	100,0%



Figura 131. Evolució anual 2000-2013

Figura 132. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



8.5. Meningococ


Taula 215. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
≥ 60 anys	1	100,0%	100,0%
TOTAL	1	100,0%	100,0%

Taula 216. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Home	1	100,0%	100,0%
TOTAL	1	100,0%	100,0%

Figura 133. Distribució estacional



Taula 217. Distribució segons l'espècie



GRUP	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Meningococ del grup W135	1	100,0%	100,0%
TOTAL	1	100,0%	100,0%

Taula 218. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Líquid peritoneal	1	100,0%	100,0%
TOTAL	1	100,0%	100,0%

Taula 219. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Cultiu	1	100,0%	100,0%
TOTAL	1	100,0%	100,0%

Figura 134. Evolució anual 2000-2013**Figura 135. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

8.6. *Plasmodium*


Taula 220. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	9	6,52%	6,52%
5-9 anys	9	6,52%	6,52%
10-14 anys	11	7,97%	7,97%
15-19 anys	2	1,45%	1,45%
20-29 anys	26	18,84%	18,84%
30-39 anys	41	29,71%	29,71%
40-49 anys	33	23,91%	23,91%
50-59 anys	5	3,62%	3,62%
≥ 60 anys	2	1,45%	1,45%
TOTAL	138	100,0%	100,0%

Taula 221. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	40	28,99%	28,99%
Home	98	71,01%	71,01%
TOTAL	138	100,0%	100,0%

Figura 136. Distribució estacional



Taula 222. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Plasmodium falciparum</i>	109	78,99%	93,16%
<i>Plasmodium ovale</i>	1	0,72%	0,85%
<i>Plasmodium vivax</i>	7	5,07%	5,98%
<i>Plasmodium</i> spp.	21	15,22%	No consta
TOTAL	138	100,0%	100,0%

Taula 223. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	130	67,71%	67,71%
Sèrum	62	32,29%	32,29%
TOTAL	192	100,0%	100,0%

Taula 224. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	6	3,05%	3,05%
Detecció d'antigen	62	31,47%	31,47%
Examen directe	129	65,48%	65,48%
TOTAL	197	100,0%	100,0%



Figura 137. Evolució anual 1995-2013

Figura 138. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



8.7. Pneumococ


Taula 225. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	1	2,86%	2,86%
1-4 anys	2	5,71%	5,71%
5-9 anys	5	14,29%	14,29%
20-29 anys	1	2,86%	2,86%
30-39 anys	1	2,86%	2,86%
40-49 anys	5	14,29%	14,29%
50-59 anys	3	8,57%	8,57%
≥ 60 anys	17	48,57%	48,57%
TOTAL	35	100,0%	100,0%

Taula 226. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	13	37,14%	37,14%
Home	22	62,86%	62,86%
TOTAL	35	100,0%	100,0%

Figura 139. Distribució estacional



Taula 227. Distribució segons el tipus

TIPUS	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1	1	2,86%	3,33%
11A	3	8,57%	10,0%
12F	1	2,86%	3,33%
14	2	5,71%	6,67%
17F	1	2,86%	3,33%
19A	2	5,71%	6,67%
19F	2	5,71%	6,67%
22F	2	5,71%	6,67%
23A	1	2,86%	3,33%
23B	1	2,86%	3,33%
24F	2	5,71%	6,67%
33F	1	2,86%	3,33%
35F	4	11,43%	13,33%
6C	2	5,71%	6,67%
9N	4	11,43%	13,33%
Altres	1	2,86%	3,33%
No consta	5	14,29%	No consta
TOTAL	35	100,0%	100,0%

Taula 228. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	21	44,68%	44,68%
Líquid articular	5	10,64%	10,64%
Líquid peritoneal	12	25,53%	25,53%
Altres mostres*	9	19,15%	19,15%
TOTAL	47	100,0%	100,0%

* 2 líquid biliar; 1 abscess al bíceps braquial; 1 abscess corneal; 1 abscess epidural; 1 mastoïdectomia; 1 humor aquós; 1 líquid amniòtic; 1 líquid pleural.

Taula 229. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	2,78%	2,78%
Cultiu	34	94,44%	94,44%
Detecció d'antigen	1	2,78%	2,78%
TOTAL	36	100,0%	100,0%

Figura 140. Evolució anual 1996-2013





Figura 141. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



8.8. *Rickettsia conorii*


Taula 230. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
10-14 anys	3	11,54%	11,54%
20-29 anys	1	3,85%	3,85%
30-39 anys	2	7,69%	7,69%
40-49 anys	5	19,23%	19,23%
50-59 anys	5	19,23%	19,23%
≥ 60 anys	10	38,46%	38,46%
TOTAL	26	100,0%	100,0%

Taula 231. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	15	57,69%	57,69%
Home	11	42,31%	42,31%
TOTAL	26	100,0%	100,0%

Figura 142. Distribució estacional



Taula 232. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	26	100,0%	100,0%
TOTAL	26	100,0%	100,0%

Taula 233. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	22	81,48%	81,48%
Seroconversió	3	11,11%	11,11%
Títol alt	2	7,41%	7,41%
TOTAL	27	100,0%	100,0%

Figura 143. Evolució anual 1995-2013





Figura 144. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



8.9. *Trypanosoma cruzi*


Taula 234. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	1	1,96%	1,96%
1-4 anys	3	5,88%	5,88%
5-9 anys	3	5,88%	5,88%
10-14 anys	4	7,84%	7,84%
15-19 anys	2	3,92%	3,92%
20-29 anys	9	17,65%	17,65%
30-39 anys	21	41,18%	41,18%
40-49 anys	8	15,69%	15,69%
TOTAL	51	100,0%	100,0%

Taula 235. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	45	88,24%	88,24%
Home	6	11,76%	11,76%
TOTAL	51	100,0%	100,0%

Figura 145. Distribució estacional




Taula 236. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	1	1,96%	1,96%
Sèrum	50	98,04%	98,04%
TOTAL	51	100,0%	100,0%

Taula 237. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	0,98%	0,98%
Examen directe	1	0,98%	0,98%
IgG	50	49,02%	49,02%
IgG (2)	50	49,02%	49,02%
TOTAL	102	100,0%	100,0%

Figura 146. Evolució anual 2007-2013

8.10. Virus de la parotiditis


Taula 238. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	3	11,54%	12,0%
5-9 anys	1	3,85%	4,0%
10-14 anys	4	15,38%	16,0%
15-19 anys	7	26,92%	28,0%
20-29 anys	5	19,23%	20,0%
30-39 anys	3	11,54%	12,0%
40-49 anys	1	3,85%	4,0%
≥ 60 anys	1	3,85%	4,0%
No consta	1	3,85%	No consta
TOTAL	26	100,0%	100,0%

Taula 239. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	7	26,92%	26,92%
Home	19	73,08%	73,08%
TOTAL	26	100,0%	100,0%

Figura 148. Distribució estacional





Taula 240. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	15	57,69%	57,69%
Saliva	11	42,31%	42,31%
TOTAL	26	100,0%	100,0%

Taula 241. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	11	42,31%	42,31%
IgM	15	57,69%	57,69%
TOTAL	26	100,0%	100,0%

Figura 149. Evolució anual 2007-2013**Figura 150. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

8.11. Virus de l'hepatitis A


Taula 242. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	8	25,81%	25,81%
5-9 anys	10	32,26%	32,26%
10-14 anys	3	9,68%	9,68%
15-19 anys	1	3,23%	3,23%
30-39 anys	4	12,9%	12,9%
40-49 anys	1	3,23%	3,23%
50-59 anys	1	3,23%	3,23%
≥ 60 anys	3	9,68%	9,68%
TOTAL	31	100,0%	100,0%

Taula 243. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	13	41,94%	41,94%
Home	18	58,06%	58,06%
TOTAL	31	100,0%	100,0%

Figura 151. Distribució estacional





Taula 244. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	31	100,0%	100,0%
TOTAL	31	100,0%	100,0%

Taula 245. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	3,13%	3,13%
IgM anti-VHA	31	96,88%	96,88%
TOTAL	32	100,0%	100,0%

Figura 152. Evolució anual 1995-2013**Figura 153. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

8.12. Virus de l'hepatitis B


Taula 246. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
20-29 anys	2	5,41%	5,56%
30-39 anys	10	27,03%	27,78%
40-49 anys	9	24,32%	25,0%
50-59 anys	9	24,32%	25,0%
≥ 60 anys	5	13,51%	13,89%
No consta	2	5,41%	No consta
TOTAL	37	100,0%	100,0%

Taula 247. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	11	29,73%	30,56%
Home	25	67,57%	69,44%
No consta	1	2,7%	No consta
TOTAL	37	100,0%	100,0%

Figura 154. Distribució estacional





Taula 248. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	37	100,0%	100,0%
TOTAL	37	100,0%	100,0%

Taula 249. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	2,7%	2,7%
IgM anti-VHBc	36	97,3%	97,3%
TOTAL	37	100,0%	100,0%

Figura 155. Evolució anual 1995-2013**Figura 156. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

8.13. Virus de la rubèola


Taula 250. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	2	100,0%	100,0%
TOTAL	2	100,0%	100,0%

Tula 251. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Home	2	100,0%	100,0%
TOTAL	2	100,0%	100,0%

Figura 157. Distribució estacional



Taula 252. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sèrum	2	100,0%	100,0%
TOTAL	2	100,0%	100,0%

Taula 253. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
IgM	2	100,0%	100,0%
TOTAL	2	100,0%	100,0%

Figura 158. Evolució anual 1996-2013





Figura 159. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant



8.14. Virus del xarampió


Taula 254. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-11 mesos	4	10,0%	10,0%
1-4 anys	5	12,5%	12,5%
20-29 anys	9	22,5%	22,5%
30-39 anys	16	40,0%	40,0%
40-49 anys	6	15,0%	15,0%
TOTAL	40	100,0%	100,0%

Tula 255. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	16	40,0%	40,0%
Home	24	60,0%	60,0%
TOTAL	40	100,0%	100,0%

Figura 160. Distribució estacional





Taula 256. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	32	58,18%	58,18%
Sèrum	23	41,82%	41,82%
TOTAL	55	100,0%	100,0%

Taula 257. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	32	58,18%	58,18%
IgM	23	41,82%	41,82%
TOTAL	55	100,0%	100,0%

Figura 161. Evolució anual 1995-2013**Figura 162. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant**

8.15. Altres agents


Taula 258. Distribució segons el grup d'edat

GRUP D'EDAT	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
1-4 anys	1	5,26%	5,26%
5-9 anys	2	10,53%	10,53%
15-19 anys	1	5,26%	5,26%
20-29 anys	1	5,26%	5,26%
30-39 anys	3	15,79%	15,79%
40-49 anys	1	5,26%	5,26%
50-59 anys	3	15,79%	15,79%
≥ 60 anys	7	36,84%	36,84%
TOTAL	19	100,0%	100,0%

Tula 259. Distribució segons el sexe

SEXE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Dona	10	52,63%	52,63%
Home	9	47,37%	47,37%
TOTAL	19	100,0%	100,0%

Figura 163. Distribució estacional



Taula 260. Distribució segons el gènere

GÈNERE	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
<i>Echinococcus granulosus</i>	3	15,79%	15,79%
<i>Escherichia coli</i>	2	10,53%	10,53%
<i>Staphylococcus aureus</i>	5	26,32%	26,32%
<i>Streptococcus pyogenes</i>	6	31,58%	31,58%
Virus de la varicel·la-zòster	2	10,53%	10,53%
Virus del chikungunya	1	5,26%	5,26%
TOTAL	19	100,0%	100,0%

Taula 261. Distribució segons la mostra

MOSTRA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Sang	8	40,0%	40,0%
Sèrum	4	20,0%	20,0%
Altres mostres*	8	40,0%	40,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

* 5 esput; 1 abscess rectal; 1 lesió pustulosa; 1 vesícula cutània.

Taula 262. Distribució segons la tècnica

TÈCNICA	FREQÜÈNCIA	TOTALS (%)	CONEGUTS (%)
Biologia molecular	1	5,0%	5,0%
Cultiu	14	70,0%	70,0%
IgM	1	5,0%	5,0%
Immunohistoquímica	1	5,0%	5,0%
Títol alt	2	10,0%	10,0%
Western Blott	1	5,0%	5,0%
TOTAL	20	100,0%	100,0%

Figura 164. Evolució anual 1995-2013




Figura 165. Taxes d'incidència per regió sanitària segons el centre declarant





Figura 166. Altres malalties infeccioses: distribució segons l'agent causal



9. Annex

Laboratoris i centres que participen en el sistema de notificació microbiològica de Catalunya. Any 2013

Hospital Universitari Vall d'Hebron-H08000794	
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-H08000089	
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitari-H08000307	
Hospital Casa de Maternitat - Hospital Clínic-H08000610	
Hospital del Mar-H08000240	
Hospital de l'Esperança-H08000321	
Hospital Universitari de Bellvitge-H08000924	
Hospital de Viladecans-H08002142	
Hospital General de l'Hospitalet-H08000917	
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès Vilafranca-H08001325	
Hospital Residència Sant Camil - Consorci Sanitari del Garraf-H08001195	
Hospital de Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat-H08000875	
Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Martorell-H08001043	
Hospital de Mataró-H08002897	
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona-H08002022	
Hospital Municipal de Badalona-H08000032	
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella-H08000850	
Hospital de Terrassa-H08002086	
Hospital Universitari Mútua de Terrassa-H08002713	
Catlab-Centre d'Analítiques Terrassa, AIE-E08800230	
Hospital General de Granollers-H08000890	
Hospital General de Catalunya-H08002061	ND
Hospital de Sabadell-H08002103	
Hospital de Sant Celoni-H08001170	
Hospital de Sant Joan de Déu. Manresa-Fundació Althaia-H08002280	
Centre Hospitalari. Manresa-Fundació Althaia-H08000995	
Hospital d'Igualada-H08634977	
Hospital General de Vic-H08002135	
Hospital Comarcal de Sant Bernabé-H08000836	
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-H43001903	
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla-H43001893	
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus-H43001830	ND
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa-H43001974	
Hospital Comarcal Móra d'Ebre-H43002128	
Hospital d'Amposta-H43002858	ND
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta-H17001484	
Hospital de Figueres-H17001438	
Hospital de Sant Jaume d'Olot-H17001565	
Hospital Comarcal de Blanes-H17002551	
Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova-H25001621	
Hospital Santa Maria-H25001685	

ND: aquest centre no ha declarat durant el període d'estudi.