

2007

INFORME ANUAL 2007

**Sistema d'informació
sobre drogodependències
a Catalunya**



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

D.L.B. B-46.800-08

I.S.S.N. 1697-1906

Tiratge : 800 unitats

Edició
Direcció General de Salut Pública
Subdirecció General de Drogodependències

Producció i distribució



Disseny portada
Silvia Rotllant

Correcció
Intertext®

Duplicació
Seven Bis S.L.

Impressió i Enquadernació
TRES GE, S.L.

ÍNDIX DE GRÀFICS I TAULES (CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS).....	4
COMENTARIS (CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS)	10
PERFIL DELS USUARIS QUE INICIEN TRACTAMENT A LA XAD	22
ACTIVITAT PER REGIÓ SANITÀRIA DE RESIDÈNCIA	45
ACTIVITAT PER COMARCA DE RESIDÈNCIA	48
ACTIVITAT DELS CENTRES D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	51
ACTIVITAT DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT EN METADONA (PMM)	64
ACTIVITAT DE LES UNITATS HOSPITALÀRIES DE DESINTOXICACIÓ I DE LES COMUNITATS TERAPÈUTIQUES	77
PROGRAMA D'INTERCANVI DE XERINGUES	81
LÍNIA VERDA D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ SOBRE L'ALCOHOLISME I LES ALTRES DROGODEPENDÈNCIES	83
MORBIDITAT I MORTALITAT ASSOCIADA	85
CONSUM D'ESTUPEFAENTS I PSICÒTROPES	87
ENQUESTA SOBRE CONSUM DE DROGUES	89
RECURSOS ASSISTENCIALS	91
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ	92
RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ	93
FONTS DE LA INFORMACIÓ	100
ENTITATS COL·LABORADORES	102

Gràfics

Distribució dels inicis de tractament per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	22
Distribució per sexe en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)	37
Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)	37
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)	38
Distribució per procedència del pacient i any de primer ús en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)	38
Distribució per sexe en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2007)	39
Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2007)	39
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2007)	40
Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2007)	40
Distribució per sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)	41
Distribució per edat i sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)	41
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)	42
Distribució per procedència del pacient en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)	42
Distribució per sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)	43
Distribució per edat i sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)	43
Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)	44
Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)	44
Evolució anual dels inicis de tractament (anys 1988 - 2007)	55
Evolució anual dels inicis de tractament per tipus de droga (anys 1991-2007)	55
Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2007)	68
Temps en programa dels usuaris en PMM (anys 1996 - 2007)	74
Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2007)	77
Motius que ocasionen les altes de les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2007)	78
Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques (gener - desembre 2007)	80
Percentatge de les xeringues distribuïdes segons l'agent de distribució (gener - desembre 2007)	81
Evolució anual total de xeringues distribuïdes (anys 1993 - 2007)	81
Consultes telefòniques al servei Línia Verda (anys 1993 - 2007)	83
Perfil de les persones que realitzen la consulta al servei Línia Verda (any 2007)	83
Derivacions a d'altres serveis del servei Línia Verda (any 2007)	84
Evolució anual per sexe dels casos diagnosticats de sida en usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2007)	86
Distribució comarcal dels recursos el 31 de desembre de 2007	92

Taules

Distribució dels inicis de tractament per sexe i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	22
Distribució dels inicis de tractament per grups d'edat i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	23
Distribució dels inicis de tractament per nivell d'instrucció i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	24
Distribució dels inicis de tractament per situació laboral i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	25
Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	26
Distribució dels inicis de tractament per convivència en els 30 dies anteriors i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	27
Distribució dels inicis de tractament per residència en els 30 dies previs a l'inici de tractament i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	28
Distribució dels inicis de tractament per freqüència de consum de la droga principal i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	29
Distribució dels inicis de tractament per país de naixement i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	30
Distribució dels inicis de tractament segons els països més freqüents de naixement per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	31
Distribució dels inicis de tractament per droga principal i altres drogues consumides (gener - desembre 2007)	32
Distribució dels inicis de tractament per la via d'administració més freqüent de la droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	33

Notificacions d'inici de tractament segons que l'usuari hagi seguit o no tractaments anteriors i la droga principal que els motiva (gener - desembre 2007).....	33
Distribució dels inicis de tractament per temps transcorregut des que es va injectar per última vegada qualsevulla substància psicoactiva (gener - desembre 2007)	34
Distribució dels inicis de tractament per estat serològic i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	35
Distribució de les drogues que causen l'inici de tractament (gener - desembre 2007)	36
Inicis de tractament per regions sanitàries de residència i droga principal (gener - desembre 2007)	45
Sol·licituds d'ingrés a UHD i CT per regions sanitàries de residència (gener - desembre 2007)	46
Inclusions en PMM per regions sanitàries de residència (gener - desembre 2007)	47
Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)	48
Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2007)	51
Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2007)	56
Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2007)	59
Activitat mensual mitjana dels centres de la regió (gener - desembre 2007)	63
Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2007)	64
Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2007)	68
Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2007)	69
Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris i dosi mitjana per Regió Sanitària del centre (gener - desembre 2007)	73
Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada tipologia de centre (gener - desembre 2007)	74
Motiu principal que ocasiona les inclusions en PMM als centres de la XAD (gener - desembre 2007)	75
Motius que ocasionen les altes de PMM als centres de la XAD (gener - desembre 2007)	76
Sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació per trimestre i unitat sol·licitada (gener - desembre 2007)..	77
Estades mitjanes i altes a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2007)	78
Altes a les UHD per droga principal (gener - desembre 2007)	79
Sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques per trimestre i comunitat sol·licitada (gener - desembre 2007)	80
Activitat dels recursos socio-sanitaris d'atenció urgent (any 2007)	82
Vacunacions realitzades als centres socio-sanitaris d'atenció urgent (any 2007).....	82
Droga principal que motiva la consulta al servei Línia Verda (any 2007)	84
Distribució dels casos per grup de transmissió i sexe en adults (>=13 anys) (01/01/1981 - 31/12/2007)	85
Distribució dels casos i defuncions de sida residents a Catalunya per sexe corresponents a usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2007)	85
Distribució dels casos de sida residents a Catalunya per grups d'edat i sexe corresponents a usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2007)	86
Dispensació de psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, en nombre d'envasos (gener - desembre 2007)	87
Dispensació dels psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, expressat en mg i en DHD (gener - desembre 2007)	87
Relació d'especialitats farmacèutiques per cada principi actiu (gener - desembre 2007)	88
Evolució de la prevalença de consum de drogues entre la població escolar de 14-18 anys (%). Catalunya 1994 -2006	89
Edat mitjana d'inici en el consum de substàncies psicoactives entre els estudiants d'educació secundària de 14-18 anys, segons el sexe. Catalunya 2006	90
Ús d'altres substàncies en els 12 mesos previs entre persones que declaren haver utilitzat les substàncies indicades a l'encapçalament de cada columna en el mateix període. Catalunya 2006	90
Risc percebut associat al consum de substàncies psicoactives entre els estudiants d'educació secundària de 14-18 anys, segons el sexe. Catalunya 2006	90
Distribució de la població general per grups d'edat i regió sanitària (any 2007)	92

Gráficos

Distribución de los inicios de tratamiento por droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	22
Distribución por sexo en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2007)	37
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2007)	37
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2007)	38
Distribución por procedencia del paciente y año del primer uso en casos de dependencia de la heroína (enero - diciembre 2007)	38
Distribución por sexo en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2007)	39
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2007)	39
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2007)	40
Distribución por procedencia del paciente en casos de dependencia del alcohol (enero - diciembre 2007)	40
Distribución por sexo en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2007)	41
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2007)	41
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2007)	42
Distribución por procedencia del paciente en casos de dependencia del tabaco (enero - diciembre 2007)	42
Distribución por sexo en casos de dependencia de la cocaína (enero - diciembre 2007)	43
Distribución por edad y sexo en casos de dependencia del cocaína (enero - diciembre 2007)	43
Distribución por nivel de instrucción y situación laboral en casos de dependencia del cocaína (enero - diciembre 2007)	44
Distribución por procedencia del paciente en casos de dependencia del cocaína (enero - diciembre 2007)	44
Evolución anual de los inicios de tratamiento (años 1988 - 2007)	55
Evolución anual de los inicios de tratamiento por tipo de droga (años 1988 - 2007)	55
Inclusiones en PMM por grupos de edad y sexo (enero - diciembre 2007)	68
Tiempo en programa de los usuarios de PMM (años 1996 - 2007)	74
Motivos que ocasionan las solicitudes de ingreso en las unidades hospitalarias de desintoxicación (enero - diciembre 2007)	77
Motivos que ocasionan las altas de las unidades hospitalarias de desintoxicación (enero - diciembre 2007)	78
Motivos que ocasionan las solicitudes de ingreso en las comunidades terapéuticas (enero - diciembre 2007)	80
Porcentaje de las jeringuillas distribuidas según el agente de distribución (enero - diciembre 2007)	81
Evolución anual del total de jeringuillas distribuidas (años 1993 - 2007)	81
Consultas telefónicas al servicio 'Línea Verda' (años 1993 - 2007)	83
Perfil de las personas que realizan la consulta al servicio 'Línea Verda' (año 2007)	83
Derivaciones a otros servicios desde el servicio 'Línea Verda' (año 2007)	84
Evolución anual por sexo de los casos diagnosticados de sida en usuarios de drogas por vía parenteral (enero 1981 - diciembre 2007)	86
Distribución comarcal de los recursos el 31 de diciembre de 2007	92

Tablas

Distribución de los inicios de tratamiento por sexo y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	22
Distribución de los inicios de tratamiento por grupos de edad y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	23
Distribución de los inicios de tratamiento por nivel de instrucción y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	24
Distribución de los inicios de tratamiento por situación laboral y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	25
Distribución de los inicios de tratamiento por procedencia del paciente y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	26
Distribución de los inicios de tratamiento por convivencia en los 30 días anteriores i droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	27
Distribución de los inicios de tratamiento por residencia en los 30 días previos al inicio de tratamiento y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	28
Distribución de los inicios de tratamiento por frecuencia de consumo de la droga principal y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	29
Distribución de los inicios de tratamiento por país de nacimiento y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	30
Distribución de los inicios de tratamiento según los países más frecuentes de nacimiento por droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	31
Distribución de los inicios de tratamiento por droga principal y otras drogas consumidas (enero - diciembre 2007)	32
Distribución de los inicios de tratamiento por la vía de administración más frecuente de la droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	33

Notificaciones de inicio de tratamiento según si el usuario ha seguido o no tratamientos anteriores y la droga principal que los motiva (enero - diciembre 2007)	33
Distribución de los inicios de tratamiento por tiempo transcurrido desde que se inyectó por última vez cualquier sustancia psicoactiva (enero - diciembre 2007)	34
Distribución de los inicios de tratamiento por estado serológico y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	35
Distribución de las drogas que causan el inicio de tratamiento (enero - diciembre 2007)	36
Inicios de tratamiento por regiones sanitarias de residencia y droga principal (enero - diciembre 2007)	45
Solicitudes de ingreso a UHD y CT por regiones sanitarias de residencia (enero - diciembre 2007)	46
Inclusiones en PMM por regiones sanitarias de residencia (enero - diciembre 2007)	47
Inicios de tratamiento notificados por comarcas de residencia y droga principal que motiva el tratamiento (enero - diciembre 2007)	48
Inicios de tratamiento notificados por cada centro de atención y seguimiento (enero - diciembre 2007)	51
Solicitudes de ingreso UHD y CT por cada centro de atención y seguimiento (enero - diciembre 2007)	56
Actividad notificada por cada centro de atención y seguimiento (enero - diciembre 2007)	59
Actividad media mensual de los centros de la región (enero - diciembre 2007)	63
Inclusiones en PMM por centro prescriptor (enero - diciembre 2007)	64
Inclusiones en PMM por grupos de edad y sexo (enero - diciembre 2007)	68
Número de inclusiones, casos activos, altas, retención y dosis media de los usuarios en PMM de cada centro dispensador (enero - diciembre 2007)	69
Número de inclusiones, casos activos, altas, retención y dosis media de los usuarios en PMM por región sanitaria del centro (enero - diciembre 2007)	73
Número de inclusiones, casos activos, altas, retención y dosis media de los usuarios en PMM de cada tipología de centro (enero - diciembre 2007)	74
Motivo principal que ocasiona las inclusiones en PMM en los centros de la XAD (enero - diciembre 2007)	75
Motivos que ocasionan las altas de PMM en los centros de la XAD (enero - diciembre 2007)	76
Solicitudes de ingresos a las unidades hospitalarias de desintoxicación por trimestre y unidad solicitada (enero - diciembre 2007)	77
Estancias medias y altas en las unidades hospitalarias de desintoxicación (enero - diciembre 2007)	78
Altas en UHD por droga principal (enero - diciembre 2007)	79
Solicitudes de ingreso a las comunidades terapéuticas por trimestre y comunidad solicitada (enero - diciembre 2007)	80
Actividad de los recursos sociosanitarios de atención urgente (año 2007)	82
Vacunaciones realizadas en los centros sociosanitarios de atención urgente (año 2007)	82
Droga principal que motiva la consulta al servicio 'Línea Verda' (año 2007)	84
Distribución de los casos por grupo de transmisión y sexo en adultos (>=13 años) (01/01/1981-31/12/2007)	85
Distribución de los casos y defunciones de sida residentes en Cataluña por sexo correspondientes a usuarios de drogas por vía parenteral (enero 1981 - diciembre 2007)	85
Distribución de los casos de sida residentes en Cataluña por grupos de edad y sexo correspondientes a usuarios de drogas por vía parenteral (enero 1981 - diciembre 2007)	86
Dispensación de psicofármacos que podrían servir como indicadores de un posible uso desviado, en número de envases (enero - diciembre 2007)	87
Dispensación de los psicofármacos que podrían utilizarse como indicador de un posible uso desviado, expresado en mg y en DHD (enero - diciembre 2007)	87
Relación de especialidades farmacéuticas por cada principio activo (enero - diciembre 2007)	88
Evolución de la prevalencia de consumo de drogas entre la población escolar de 14-18 años (%). Cataluña, 1994-2004....	89
Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de educación secundaria de 14-18 años, según el sexo. Catalunya 2006	90
Uso de otras sustancias en los 12 meses previos entre personas que declaran haber utilizado las sustancias indicadas en el encabezado de casa columna en el mismo periodo. Catalunya 2006	90
Riesgo percibido asociado al consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de educación secundaria de 14-18 años, según el sexo. Catalunya 2006	90
Distribución de la población general por grupos de edad y región sanitaria (año 2007)	92

Figures

Distribution of admissions to treatment by primary drug (January-December 2007)	22
Distribution of heroine dependency cases by sex (January-December 2007)	37
Distribution of heroine dependency cases by age and sex (January-December 2007)	37
Distribution of heroine dependency cases by educational level and employment status (January-December 2007)	38
Distribution of heroine dependency cases by patient source and year of first use (January-December 2007)	38
Distribution of alcohol dependency cases by sex (January-December 2007)	39
Distribution of alcohol dependency cases by age and sex (January-December 2007)	39
Distribution of alcohol dependency cases by educational level and employment status (January-December 2007)	40
Distribution of alcohol dependency cases by patient source (January-December 2007)	40
Distribution of tobacco dependency cases by sex (January-December 2007)	41
Distribution of tobacco dependency cases by age and sex (January-December 2007)	41
Distribution of tobacco dependency cases by educational level and employment status (January-December 2007)	42
Distribution of tobacco dependency cases by patient source (January-December 2007)	42
Distribution of cocaine dependency cases by sex (January-December 2007)	43
Distribution of cocaine dependency cases by age and sex (January-December 2007)	43
Distribution of cocaine dependency cases by educational level and employment status (January-December 2007)	44
Distribution of cocaine dependency cases by patient source (January-December 2007)	44
Evolution of admissions to treatment over the years (year 1988-2007)	55
Evolution of admissions to treatment for each type drug (year 1988-2007)	55
Inclusions into PMM by age group and sex (January-December 2007)	68
Duration in treatment of PMM users (year 1996 - 2007)	74
Reasons for requests for admission to hospital based detoxification units (January-December 2007)	77
Reasons for discharges from hospital based detoxification units (January-December 2007)	78
Reasons for requests for admission to therapeutic communities (January-December 2007)	80
Percentage of syringes by distribution agent (January - December 2007)	81
Yearly trend in total number of syringes distributed (Years 1993-2007)	81
Phone request at the Green Line service (Years 1993-2007)	83
Profile of persons making consultations to the Green Line service (Year 2007)	83
Referrals to other services from the Green Line service (Year 2007)	84
Yearly trend in cases diagnosed of AIDS among injecting drug users by sex (January 1981-December 2007)	86
Regional distribution of resources (31 December 2007)	92

Tables

Distribution of admissions to treatment by sex and primary drug (January-December 2007)	22
Distribution of admissions to treatment by age group and primary drug (January-December 2007)	23
Distribution of admissions to treatment by educational level and primary drug (January-December 2007)	24
Distribution of admissions to treatment by employment status and primary drug (January-December 2007)	25
Distribution of admissions to treatment by patient source and primary drug (January-December 2007)	26
Distribution of admissions to treatment by place of residence in the lived 30 days prior and primary drug (January-December 2007)	27
Distribution of admissions to treatment of type of residence in the 30 days previous and primary drug (January-December 2007).....	28
Distribution of admissions to treatment by frequency of consumption and primary drug (January-December 2007)	29
Distribution of admissions to treatment by Country of origen and primary drug (January-December 2007).....	30
Distribution of admission to treatment by more frequent Country of origen and primary drug (January-December 2007).....	31
Distribution of admissions to treatment by primary drug and other drugs consumed (January-December 2007)	32
Distribution of admissions to treatment by most frequent method of administration and primary drug (January-December 2007)	33
Notifications of admission to treatment by treatment history and primary drug (January-December 2007)	33
Distribution of admissions to treatment by time elapsed since last injection of any psychoactive drug (January-December 2007)	34
Distribution of admissions to treatment by serological status and primary drug (January-December 2007)	35

Distribution of drugs for which cases were admitted to treatment (January-December 2007)	36
Admissions to treatment by Health Region of residence and primary drug (January-December 2007)	45
Requests for admission to HDU and TC by health region of residence (January-December 2007)	46
Inclusions into PMM by health region of residence (January-December 2007)	47
Admissions to treatment notified, by county of residence and primary drug (January-December 2007)	48
Admissions to treatment notified by each treatment centre (January-December 2007)	51
Requests for admission to HDU and TC made by each treatment centre (January-December 2007)	56
Activity notified by each treatment centre (January-December 2007)	59
Activity notified by Health Region (January-December 2007)	63
Inclusions into PMM by each prescribing centre (January-December 2007)	64
Inclusions into PMM by age group and sex (January-December 2007)	68
Numbers of inclusions, active cases, discharges, keeping and dose of PMM users for each dispensing centre (January-December 2007)	69
Numbers of inclusions, active cases, discharges, keeping and dose of PMM users for each Health Region (January-December 2007).....	73
Numbers of inclusions, active cases, discharges, keeping and dose of PMM users for each type centre (January-December 2007)	74
Principal reason for inclusion in OMM in XAD centres (January-December 2007).....	75
Reasons for discharges from PMM in XAD centres (January-December 2007).....	76
Requests for admission to hospital based detoxification units by quarter and unit requested (January-December 2007)	77
Mean lengths of stay in, and discharges from, hospital based detoxification units (January-December 2007)	78
Discharges to HDU by primary drug (January-December 2007).....	79
Requests for admission to therapeutic communities by quarter and unit requested (January-December 2007)	80
Activity of emergency drug care resources (Year 2007)	82
Vaccinations in emergency drug care centers (Year 2007).....	82
Principal drug responsible for consultation to the Green Line service (Year 2007)	84
Distribution of AIDS cases in residents of Catalonia by transmission group and sex in adults (>=13 years) (01/01/1981-31/12/2007)	85
Distribution of AIDS cases and deaths in residents of Catalonia by sex, among injecting drug users (January 1981-December 2007)	85
Distribution of AIDS cases in residents of Catalonia by age group and sex, among injecting drug users (January 1981-December 2007)	86
Dispensing of psychoactive drugs which could serve as indicators of possible abuse, in number of packages (January-December 2007)	87
Dispensing of psychoactive drugs which could serve as indicators of possible abuse, expressed in mg and DDI (January-December 2007)	87
List of pharmaceutical specifics by active ingredient (January-December 2007)	88
Evolution of drug consumption prevalence between school population 14-18 years (%). Catalonia 1994-2004.....	89
Mean age of starting consumption of psychoactive drugs between high school students from 14-18 years, by sex. Catalonia 2006	90
Using other drugs in the previous 12 months among people who reported having used the drugs indicated in the column headed home in the same period. Catalonia 2006	90
Perceived risk associated with the consumption of psychoactive drugs among high school students 14-18 years, by sex. Catalonia 2006	90
Distribution of the general population by age group and health region (Year 2007)	92

La informació detallada en aquest informe correspon a l'activitat notificada durant l'any 2007 pel conjunt de recursos assistencials que componen la **Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD)**, del **Sistema d'Informació sobre Drogodependències de Catalunya**.

L'informe s'agrupa en quatre grans apartats: inicis de tractament, activitat de la XAD, programa de manteniment amb metadona i altres programes específics.

INICIS DE TRACTAMENT

En total, durant l'any 2007 s'han enregistrat 13.580 inicis de tractament corresponents a usuaris diferents, 413 inicis menys respecte de l'any 2006. Aquesta disminució en el nombre de casos admesos a tractament manté la tendència descendent de la sèrie, iniciada l'any 2005.

L'alcohol i la cocaïna han estat les principals drogues notificades, amb un 43,6% i un 27,6% dels casos, respectivament, seguides de l'heroïna, amb un 13,6%. S'observa un lleuger increment dels usuaris que inicien tractament per cocaïna i cànnabis respecte l'any 2006. La cocaïna segueix sent la substància il·legal que ha motivat un nombre més alt d'inicis de tractament, superant l'heroïna en gairebé 1.900 casos.

Pel que fa al **sexe**, en general, el perfil de les persones que han iniciat tractament segueix sent clarament masculí, amb un 78,7% d'homes i un 21,3% de dones. Només en el cas del tabaquisme el percentatge de dones que inicien tractament (45,3%) es proper al dels homes (54,7%).

L'**edat mitjana** de les persones que han iniciat un tractament varia segons el tipus de substància. En el cas de l'heroïna és de 35 anys, en el cas de la cocaïna és de 32 anys, en el cas del cànnabis és de 26 anys i en el cas del tabac és de 46 anys. L'edat mitjana en el cas de l'alcohol ha estat de 43 anys, i per a la resta de drogues, de 37 anys.

Quant al **nivell d'instrucció**, tenir estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària és la

situació més freqüent en el cas de l'heroïna (35%) i en el cas de l'alcohol (32%); també és la situació més freqüent en el cas del tabac (26%). Tenir batxillerat elemental, graduat escolar o ESO continua sent la situació més freqüent en el cas de la cocaïna (32%) i el cànnabis (33%).

La **situació laboral** més freqüent en el cas de l'heroïna (36%) és l'atur, mentre que estar treballant (ja sigui amb contracte laboral indefinit, contracte laboral temporal o per compte propi) és la situació més freqüent en les persones que inicien el tractament per tabac (59%), cocaïna (56%), alcohol (48%) i cànnabis (47%).

Quant a la **procedència** dels pacients, acudir per iniciativa pròpia, de familiars o d'amics (45%) i procedir de centres de tractament de les drogodependències (22%) són les situacions més freqüents en els casos d'heroïna; acudir per iniciativa pròpia, de familiars o d'amics (43%) i procedir d'atenció primària de salut (30%) són les situacions més freqüents en els casos de cocaïna. L'atenció primària de salut és la procedència més freqüent per als inicis de cànnabis (38%) i alcohol (41%). En el cas dels inicis per tabac, acudir per iniciativa pròpia, de familiars o d'amics (42%) és el més freqüent. El 44% del total de les persones que han iniciat tractament l'any 2007 ja havien seguit tractament anteriorment.

Pel que fa a la **convivència** en els 30 dies anteriors a l'inici del tractament, conviure amb els pares continua sent la situació més freqüent en el cas de la cocaïna (27%) i el cànnabis (37%), tot i que s'observa un increment respecte del 2006 en els pacients que viuen sols i que s'admeten a tractament per aquestes substàncies. Viure sol ha estat la situació més freqüent en els casos d'heroïna (22%) i alcohol (24%), produint-se un canvi respecte d'anys anteriors, en què la situació més freqüent en els casos d'inicis per heroïna era viure amb els pares, i en els casos d'inicis per alcohol era viure amb la parella i amb els fills. Viure amb la parella i els fills segueix sent la situació més freqüent en el cas del tabac (38%).

Quant a la **residència** en els 30 dies previs a l'inici del tractament, residir en cases, pisos i apartaments continua sent la situació més freqüent en totes les drogues el 2007.

Respecte a la **freqüència de consum** de la droga principal, la pauta més freqüent és tots els dies, excepte en el cas de la cocaïna, en què la pauta de consum més freqüent és de dos a tres dies a la setmana (20%).

Perfil dels usuaris que han iniciat tractament

La persona tipus que inicia tractament per **heroïna** és un home entre els 30 i els 39 anys que ha consumit també cocaïna i cànnabis. Té estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària, actualment és a l'atur, tot i que ha treballat abans, i viu sol o amb els pares. Ha començat el tractament per iniciativa pròpia o de familiars després d'haver seguit algun tractament amb anterioritat, utilitza la via injectada, amb menys d'una setmana des de la darrera injecció de substàncies psicoactives, i la freqüència de consum és diària.

L'usuari que inicia tractament per **cocaïna** és, principalment, un home entre els 25 i els 34 anys, que ha consumit també alcohol i tabac, amb estudis primaris o batxillerat elemental o superior, que actualment està treballant i viu amb els pares. Ha començat el tractament per primer cop per iniciativa pròpia o de familiars, utilitza la via intranassal, mai no s'ha injectat substàncies psicoactives i la seva freqüència de consum és de dos a tres dies a la setmana o diària.

Pel que fa al perfil del consumidor de **cànnabis**, es tracta d'un home entre els 15 i els 24 anys, que ha consumit també tabac i/o alcohol, amb estudis primaris o batxillerat elemental i que actualment treballa i viu amb els pares. Ha començat el tractament per primera vegada bé per iniciativa pròpia o de familiars o bé per indicació d'un centre de medicina general o atenció primària de salut, utilitza la via pulmonar, mai no s'ha injectat substàncies psicoactives i la seva freqüència de consum és diària.

En el cas del **tabac**, el perfil és principalment el d'un home o una dona entre els 35 i els 49 anys, que ha consumit també alcohol, amb estudis primaris, secundaris o batxillerat superior i que actualment treballa i viu amb la parella i els fills. Ha iniciat el tractament per iniciativa pròpia o de familiars.

La persona que inicia tractament per **alcohol** és principalment un home entre els 35 i els 49 anys, que ha consumit també tabac, te estudis primaris, actualment treballa i viu amb la parella i els fills o sol. Ha començat el tractament bé per iniciativa d'un centre d'atenció primària de salut o bé per iniciativa pròpia o de familiars, utilitza la via oral, mai no s'ha injectat substàncies psicoactives, i la seva freqüència de consum és diària.

Distribució geogràfica dels inicis de tractament

Pel que fa a les notificacions d'inicis de tractament per **regió sanitària de residència**, la regió Metropolitana (74%) continua sent la que més casos notifica durant l'any; la segueixen Girona (10%), Tarragona (7%) i la regió Central (5%).

Respecte a la distribució per **comarques**, el Barcelonès (38%), el Vallès Occidental (11%), el Baix Llobregat (10%), el Vallès Oriental (6%) i el Maresme (6%) són les comarques amb més inicis de tractament.

Pel que fa al **país de naixement**, s'observa que el 10% dels casos corresponen a persones no nascudes a Espanya. Els països més freqüents són el Marroc (1,2%), Colòmbia (0,5%) i l'Equador (0,4%).

ACTIVITAT DE LA XAD

L'**activitat** notificada pels centres d'atenció i seguiment de la XAD ha estat, per a l'any 2007, de 534.894 **visites individuals**, 73.043 **assistències a pacients en grup**, 10.082 **assistències a familiars de pacients en grup**, 6.799 **desintoxicacions** i 196.950 **determinacions de drogues en orina**.

PROGRAMA DE MANTENIMENT AMB METADONA (PMM)

Inclusions en PMM

Durant el 2007, s'han enregistrat 5.546 **inclusions** en PMM, el 85% de les quals eren homes i el 15% restant eren dones, amb una majoria (66%) entre els 30 i els 44 anys. El **motiu principal** d'aquestes inclusions ha estat el trasllat (48%).

El nombre de **casos actius en PMM** el 31 de desembre del 2007 era de 8.050, un 3,6% més que els notificats el 2006. Pel que fa al **temps en el programa** dels usuaris de PMM, la mitjana ha estat de 30 mesos. El nombre d'**altes notificades** durant l'any 2007 pels centres ha estat de 5.759. La causa principal que ha motivat aquestes altes ha estat el trasllat (47%).

Cal esmentar que la **dosi mitjana** de metadona durant l'últim mes de tractament ha estat de 60,8 mg.

ACTIVITAT DE LES UHD i CT

S'han notificat 765 **sol·licituds d'ingrés a UHD** per part dels centres d'atenció i seguiment. Els motius principals han estat el fracàs repetit de la desintoxicació ambulatoria (57%) i la manca de suport familiar (27%).

El motius més freqüents que han ocasionat les 493 **sol·licituds d'ingrés a CT** han estat el fracàs de la desintoxicació ambulatoria (55%), la manca de suport familiar (21%) i la desestructuració social (19%). El lloc de residència més freqüent d'aquestes sol·licituds ha estat la regió Metropolitana (67%), seguida de Tarragona (10%).

S'han notificat 1.183 **altes d'UHD**, el motiu principal de les quals ha estat el final de la desintoxicació (87%). L'estada mitjana en aquests centres ha estat de 10 dies.

PROGRAMES ESPECÍFICS

Programa d'Intercanvi de Xeringues

Entre l'any 1993 i el 2007, el total de xeringues i kits distribuïts pel **Programa d'intercanvi de**

xeringues a Catalunya va ser de 12.119.842. Només l'any 2007 se n'han distribuït 701.220, la qual cosa suposa una disminució del nombre de distribucions respecte de l'any anterior. Els **agents de distribució de xeringues** amb més activitat han estat els centres habilitats (221.560, 32%), les farmàcies (191.745, 27%) i les sales de consum (87.841, 13%).

Pel que fa a l'activitat dels recursos socio sanitàris d'atenció urgent, durant el 2007, els centres que més xeringues han distribuït han estat: el Centre Baluard (139.851) i SAPS (54.270), de Barcelona, i la Unitat Mòbil Àmbit Prevenció (45.387), situada a Gavà.

Línia Verda

Durant l'any 2007, s'han atès 3.755 consultes telefòniques al servei de la **Línia Verda**, que han donat lloc a 171 entrevistes personals. D'aquestes consultes i entrevistes, el 55% han estat efectuades pels familiars, la parella o els amics. Cal destacar que continua la tendència decreixent d'aquestes consultes respecte de l'any anterior, iniciada el 2004. La droga que ha motivat més consultes telefòniques i entrevistes ha estat la cocaïna (28 i 24 % respectivament).

Sida i drogodependències

Fins al dia 31 de desembre del 2007 s'han notificat 15.623 **casos de sida de residents a Catalunya**, dels quals 12.639 són homes (81%) i 2.984 dones (19%). El grup de transmissió més freqüent és el d'UDVP (usuaris de droga per via parenteral) heterossexuals, amb un 56%. El grup d'edat més freqüent d'aquests 8.712 casos inclosos és el de 25 a 39 anys.

Consum de psicofàrmacs

Comparant les dades de facturació d'aquests psicofàrmacs al Servei Català de la Salut amb les de l'any anterior, observem un increment en el consum d'un 1,36%, inferior en 1,65 punts a l'experimentat en el període anterior (l'any 2006 respecte al 2005 va créixer un 3,01%).

Observem que només tres dels principis actius estudiats han incrementat el seu consum respecte de l'any 2006. Aquests increments han estat el del metilfenidat (16,27%), el de la buprenorfina, CIH (2,05%), i el del clometiazole (2,02%). La disminució més elevada és la del triazolam (-13,94%).

No observem diferències molt destacables respecte de l'any anterior entre l'evolució del nombre d'envasos i el consum expressat en mg o en DHD, excepte en el cas del metilfenidat, que augmenta un 16,27% en nombre d'envasos, un 45% en mg i un 43% en DHD.

El consum expressat en mg i en DHD del conjunt d'aquests psicofàrmacs durant l'any 2007, respecte al del 2006, ha experimentat un increment del 2,73% en mg i un increment del 0,93% en DHD (cal tenir en compte que s'han actualitzat les DHD amb les dades poblacionals d'RCA 2006 i 2007).

Enquestes sobre consum de drogues

En aquest informe es presenten els resultats de l'enquesta escolar 2006-2007.

En general, el consum de drogues entre els estudiants de 14 a 18 anys continua sent experimental o ocasional.

L'alcohol i el tabac continuen sent les drogues més consumides, seguides del cànnabis.

Les dades del 2006 mostren una evolució positiva, amb un descens del consum d'algunes de les drogues més esteses entre els estudiants.

Aquest descens s'ha observat per al tabac (especialment per als qui declaren haver fumat alguna vegada a la vida), el cànnabis i la cocaïna. En el cas d'aquestes dues últimes drogues, s'ha trencat la tendència creixent que han presentat durant els últims anys.

Pel que fa a les begudes alcohòliques, el seu consum ha anat augmentant progressivament des de l'any 2002, tot i que durant el període 2004-2006 aquest increment ha estat inferior al que es va produir durant el període 2002-2004.

A Catalunya, els psicoestimulants, com l'èxtasi o les amfetamines, i els al·lucinògens estan menys estesos que la cocaïna (el percentatge de consumidors anuals no supera en cap de les tres drogues citades en primer lloc el 3,6%).

Una proporció important d'estudiants consumeixen diverses drogues, i s'observa una associació bastant estreta entre el consum d'alcohol, tabac i cànnabis, d'una banda, i entre el d'estimulants (cocaïna, èxtasi o amfetamines) i al·lucinògens, de l'altra. No obstant això, els estudiants que consumeixen estimulants o al·lucinògens també presenten unes prevalences de consum de tabac, alcohol i cànnabis molt elevades.

RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ

Al final d'aquest informe es presenten, juntament amb les fonts d'informació utilitzades, les butlletes de recollida de dades pel que fa a la notificació d'inicis de tractament, la notificació d'inclusió en PMM, el llistat mensual d'usuaris dels PMM, l'activitat mensual dels centres d'atenció i seguiment, les sol·licituds d'ingrés a comunitats terapèutiques i/o unitats hospitalàries de desintoxicació, les altes d'unitats hospitalàries de desintoxicació i les altes de comunitats terapèutiques.

La información detalla en este informe corresponde a la actividad notificada durante el año 2007 por el conjunto de recursos asistenciales que componen la **Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de Catalunya (XAD)**, del **Sistema de Información sobre Drogodependencias de Cataluña**.

El informe se agrupa en cuatro grandes apartados: inicios de tratamiento, actividad de la XAD, programa de mantenimiento con metadona y programas específicos.

INICIOS DE TRATAMIENTO

En total, durante el año 2007 se han registrado 13.580 inicios de tratamiento correspondientes a usuarios diferentes, 413 inicios menos con respecto al año 2006. Esta disminución en el número de casos admitidos a tratamiento mantiene la tendencia descendente en la serie, iniciada en el año 2005.

El alcohol y la cocaína han sido las principales drogas notificadas, con un 43,6% y un 27,6% de los casos, respectivamente, seguidas de la heroína, con un 13,6%. Se observa un leve incremento de los usuarios que inician tratamiento por cocaína y cannabis respecto al año 2006. La cocaína sigue siendo la sustancia ilegal que ha motivado un número más alto de inicios de tratamiento, superando a la heroína en casi 1.900 casos.

Respecto al **sexo**, en general, el perfil de las personas que han iniciado tratamiento sigue siendo claramente masculino, con un 78,7% de hombres y un 21,3% de mujeres. Sólo en el caso del tabaquismo el porcentaje de mujeres que inician tratamiento (45,3%) es cercano al de los hombres (54,7%).

La **edad media** de las personas que han iniciado un tratamiento varía según el tipo de sustancia. En el caso de la heroína es de 35 años, en el caso de la cocaína, de 32 años, en el caso del cannabis, de 26 años y en el caso del tabaco, de 46 años. La edad media en el caso del alcohol ha sido de 43 años, y para el resto de drogas, de 37 años.

En cuanto al **nivel de instrucción**, tener estudios primarios, certificado de escolaridad o de educación primaria es la situación más frecuente en el caso de la heroína (35%) y en el caso del alcohol (32%); también es la situación más frecuente en el caso del tabaco (26%). Tener bachillerato elemental, graduado escolar o ESO continúa siendo la situación más frecuente en el caso de la cocaína (32%) y el cannabis (33%).

La **situación laboral** más frecuente en el caso de la heroína (36%) es el paro, mientras que estar trabajando (ya sea con contrato laboral indefinido, contrato laboral temporal o por cuenta propia) es la situación más frecuente en las personas que inician tratamiento por tabaco (59%), cocaína (56%), alcohol (48%) y cannabis (47%).

En cuanto a la **procedencia** de los pacientes, acudir por iniciativa propia, de familiares o de amigos (45%) y proceder de centros de tratamiento de las drogodependencias (22%) es la situación más frecuente en los casos de heroína; acudir por iniciativa propia, de familiares o de amigos (43%) y proceder de atención primaria de salud (30%) son las situaciones más frecuentes en los casos de cocaína. La atención primaria de salud es la procedencia más frecuente para los inicios de cannabis (38%) y alcohol (41%). En el caso de los inicios por tabaco, acudir por iniciativa propia, de familiares o de amigos (42%) es lo más frecuente. El 44% del total de las personas que han iniciado tratamiento en el año 2007 ya habían seguido tratamiento anteriormente.

Respecto a la **convivencia** en los 30 días anteriores al inicio del tratamiento, convivir con los padres continúa siendo la situación más frecuente en el caso de la cocaína (27%) y el cannabis (37%), a pesar de observarse un incremento respecto al año 2006 en los pacientes que viven solos y que se admiten a tratamiento para estas sustancias. Vivir solo ha sido la situación más frecuente en los casos de heroína (22%) y alcohol (24%), produciéndose un cambio respecto a años anteriores, en que la situación

más frecuente en los casos de inicios por heroína era vivir con los padres y en los casos de inicios por alcohol era vivir con la pareja y con los hijos. Vivir con la pareja y los hijos sigue siendo la situación más frecuente en los casos de tabaco (38%).

En cuanto a la **residencia**, en los 30 días previos al inicio del tratamiento, residir en casas, pisos y apartamentos es la situación más frecuente en todas las drogas en 2007.

Respecto a la **frecuencia de consumo** de la droga principal, la pauta más frecuente es todos los días, excepto en el caso de la cocaína, en que la pauta de consumo más frecuente es de dos a tres días a la semana (20%).

Perfil de los usuarios que han iniciado el tratamiento

El tipo de persona que inicia el tratamiento por **heroína** es un hombre de entre 30 y 39 años que también ha consumido cocaína y cannabis. Tiene estudios primarios, certificado de escolaridad o de educación primaria, actualmente está en paro, habiendo trabajado antes, y vive solo o con sus padres. Ha empezado el tratamiento por iniciativa propia o de familiares, después de haber seguido algún tratamiento con anterioridad, utiliza la vía inyectada, con menos de una semana desde la última inyección de sustancias psicoactivas, y la frecuencia de consumo es diaria.

El usuario que inicia tratamiento por **cocaína** es, principalmente, un hombre de entre 25 y 34 años, que también ha consumido alcohol y tabaco, con estudios primarios o bachillerato elemental o superior, que actualmente está trabajando y viviendo con sus padres. Ha empezado el tratamiento por primera vez por iniciativa propia o de familiares, utiliza la vía intranasal, nunca se ha inyectado sustancias psicoactivas y su frecuencia de consumo es de dos a tres días a la semana o diaria.

En cuanto al perfil básico del consumidor de **cannabis**, se trata de un hombre de entre 15 y 24

años, que también ha consumido tabaco y/o alcohol, con estudios primarios o bachillerato elemental y que actualmente trabaja y vive con sus padres. Ha empezado el tratamiento por primera vez bien por iniciativa propia o de familiares o bien por indicación de un centro de medicina general o atención primaria de salud, utiliza la vía pulmonar, nunca se ha inyectado sustancias psicoactivas y su frecuencia de consumo es diaria.

En el caso del **tabaco**, el perfil es un hombre o una mujer de entre 35 y 49 años que también ha consumido alcohol, con estudios primarios, secundarios o bachillerato superior y que actualmente trabaja y vive con su pareja y sus hijos. Ha iniciado tratamiento por iniciativa propia o de familiares.

La persona que inicia tratamiento por **alcohol** es principalmente un hombre entre 35 y 49 años, que también ha consumido tabaco, tiene estudios primarios, actualmente trabaja y vive con su pareja y sus hijos o solo. Ha empezado el tratamiento bien por iniciativa de un centro de atención primaria en salud o bien por iniciativa propia o de familiares, utiliza la vía oral, nunca se ha inyectado sustancias psicoactivas, y su frecuencia de consumo es diaria.

Distribución geográfica de los inicios de tratamiento

Respecto a las notificaciones de los inicios de tratamiento por **región sanitaria de residencia**, la región Metropolitana (75%) continúa siendo la que más casos notifica durante el año; la siguen Gerona (10%), Tarragona (7%) y la región Central (5%).

Respecto a la distribución por **comarcas**, el Barcelonès (38%), el Vallès Occidental (11%), el Baix Llobregat (10%), el Vallès Oriental (6%) y el Maresme (6%) son las comarcas con más inicios de tratamiento.

Respecto a la distribución por **país de nacimiento**, se observa que el 10% de los casos corresponden

a personas no nacidas en España. Los países más frecuentes son Marruecos (1,2%), Colombia (0,5%) y Ecuador (0,4%).

ACTIVIDAD DE LA XAD

La **actividad notificada** por los centros de atención y seguimiento de la XAD ha sido, para el año 2007, de 534.894 **visitas individuales**; 73.043 **asistencias a pacientes en grupo**; 10.082 **asistencias a familiares de pacientes en grupo**; 6.799 **desintoxicaciones** y 196.950 **determinaciones de drogas en orina**.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA (PMM)

Inclusiones en PMM

Durante 2007, se han registrado 5.546 **inclusiones en PMM**, el 85% de las cuales eran hombres y el 15% restante eran mujeres, con una mayoría (66%) entre los 30 y los 44 años. El **motivo principal** de estas inclusiones ha sido el traslado (48%)

El número de **casos activos en PMM** a 31 de diciembre de 2007 era de 8.050, un 3,6% más que los notificados en 2006. En cuanto al **tiempo en el programa** de los usuarios de PMM, la media ha sido de 30 meses. El número de altas notificadas durante el año 2007 para los centros ha sido de 5.759. La causa principal que motiva estas altas ha sido el traslado (47%).

Cabe comentar que la **dosis media** de metadona durante el último mes de tratamiento ha sido de 60,8 mg.

ACTIVIDAD DE LAS UHD y CT

Se han notificado 765 **solicitudes de ingreso en UHD** por parte de los centros de atención y seguimiento. Los motivos principales han sido el fracaso repetido de la desintoxicación ambulatoria (57%) y la falta de apoyo familiar (27%).

Los motivos más frecuentes que han ocasionado las 493 **solicitudes de ingreso en CT** han sido el fracaso de la desintoxicación ambulatoria (55%), la falta de apoyo familiar (21%) y la

desestructuración social (19%). El lugar de residencia más frecuente de estas solicitudes ha sido la región Metropolitana (67%), seguida de Tarragona (10%).

Se han notificado 1.183 **altas de UHD**, el motivo principal de las cuales ha sido el final de la desintoxicación (87%). La **estancia media** en estos centros ha sido de 10 días.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Programa de Intercambio de Jeringuillas

Entre el año 1993 y el 2007, el total de jeringuillas y kits distribuidos por el **Programa de intercambio de jeringuillas en Cataluña** ha sido de 12.119.842. Sólo en el año 2007 se han distribuido 701.220, observándose una disminución del número de distribuciones respecto al año anterior. Los **agentes de distribución** de jeringuillas con mayor actividad han sido los centros habilitados (221.560, 32%), las farmacias (191.745, 27%) y las salas de consumo (87.841, 13%).

Respecto a la actividad de los recursos sociosanitarios de atención urgente, durante 2007, los centros que más jeringuillas han distribuido han sido: el Centro Baluard (139.851) y SAPS (54.270), de Barcelona, y la Unidad Móvil Àmbit Prevenció (45.387), situada en Gavá.

Línea Verde

Durante el año 2007, se han atendido 3.755 consultas telefónicas en el servicio de la Línea Verde, que han dado lugar a 171 entrevistas personales. De estas consultas y entrevistas, el 55% han sido efectuadas por familiares, la pareja o los amigos. Cabe destacar que continúa la tendencia decreciente de estas consultas respecto al año anterior, iniciada en 2004. La droga que ha motivado más consultas telefónicas y entrevistas ha sido la cocaína (28% y 24% respectivamente).

Sida y drogodependencias

Hasta el día 31 de diciembre de 2007 se han notificado 15.623 **casos de sida residentes en**

Cataluña, de los que 12.639 son hombres (81%) y 2.984 mujeres (19%). El grupo de transmisión más frecuente es el de UDVP (usuarios de droga por vía parenteral) heterosexuales, con el 56%. El grupo de edad más frecuente de estos 8.712 casos incluidos es el de 25 a 39 años.

Consumo de psicofármacos

Si comparamos las cifras de facturación de estos psicofármacos en el Servei Català de la Salut con las del año anterior, observamos un incremento en el consumo del 1,36%, inferior en 1,65 puntos al experimentado en el periodo anterior (en el año 2006 respecto a 2005 creció un 3,01%).

Observamos que sólo tres de los principios activos estudiados han incrementado su consumo respecto al año 2006. Estos incrementos han sido el del metilfenidato (16,27%), el de la buprenorfina, CIH (2,05%), y el del clometiazol (2,02%). La disminución más elevada es la del triazolam (-13,94%).

No observamos diferencias muy destacables, respecto al año anterior, entre la evolución del número de envases y el consumo expresado en mg o en DHD, excepto en el caso del metilfenidato, que aumenta un 16,27% el número de envases, un 45% en mg y un 43% en DHD.

El consumo expresado en mg y en DHD del conjunto de estos psicofármacos durante el año 2007, respecto al de 2006, ha experimentado un incremento del 2,73% en mg y un incremento del 0,93% en DHD (debe tenerse en cuenta que se han actualizado las DHD con los datos poblacionales de 2006 y 2007).

Encuestas sobre consumo de drogas

En este informe se presentan los resultados de la encuesta escolar 2006-2007.

En general, el consumo de drogas entre los estudiantes de 14 a 18 años continúa siendo experimental u ocasional.

El alcohol y el tabaco siguen siendo las drogas más consumidas, seguidas del cannabis. Los datos

de 2006 muestran una evolución positiva, con un descenso del consumo de algunas de las drogas más extendidas entre los estudiantes.

Este descenso se ha observado para el tabaco (especialmente para los que declaran haber fumado alguna vez en la vida), el cannabis y la cocaína. En el caso de estas dos últimas drogas se ha roto la tendencia creciente que han presentado durante los últimos años.

Respecto a las bebidas alcohólicas, su consumo ha ido aumentando progresivamente desde el año 2002, aunque durante el periodo 2004-2006 este incremento ha sido inferior al que se produjo durante el periodo 2002-2004.

En Cataluña, los psicofármacos, del tipo del éxtasis o las anfetaminas, y los alucinógenos están menos extendidos que la cocaína (el porcentaje de consumidores anuales no supera en ninguna de las tres drogas citadas en primer lugar el 3,6%).

Una proporción importante de estudiantes consumen diversas drogas, y se observa una asociación bastante estrecha entre el consumo de alcohol, tabaco y cannabis, por una parte, y entre el de estimulantes (cocaína, éxtasis o anfetaminas) y alucinógenos, por otra. No obstante, los estudiantes que consumen estimulantes o alucinógenos también presentan unas prevalencias de consumo de tabaco, alcohol y cannabis muy elevadas.

RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

Al final de este informe se presentan, junto con las fuentes de información utilizadas, los boletines de recogida de datos utilizados en la notificación de inicios de tratamiento, la notificación de inclusión en PMM, el listado mensual de usuarios de los PMM, la actividad mensual de los centros de atención y seguimiento, las solicitudes de ingreso en comunidades terapéuticas y/o unidades hospitalarias de desintoxicación, las altas de unidades hospitalarias de desintoxicación y las altas de comunidades terapéuticas.

The information contained in this report refers to the activity reported during the year 2007 by the healthcare resources under the **Catalan Drug Addiction Treatment Network** (XAD, Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de Catalunya), of the **Catalonia Drug Addiction Reporting System**.

The report is divided in 4 main sections: admissions to treatment, XAD activity, methadone maintenance programme and other specific programmes.

ADMISSIONS TO TREATMENT

A total of 13,580 admissions to treatment were recorded, corresponding to the number of different individual users during 2007, which means 413 admissions less when compared to 2006. This decrease in the number of cases admitted to treatment follows the decreasing trend of the last few years, which started in 2005. Alcohol and cocaine were the primary drugs reported, accounting for 43.6% and 27.6% of cases, respectively, followed by heroine (13.6%). There has been a slight increase in users admitted to treatment for cocaine and cannabis with regard to 2006. Cocaine is still the illegal drug accounting for the highest number of admissions to treatment, topping heroin in almost 1,900 cases.

With regard to **gender**, generally speaking, the profile of people admitted to treatment is clearly that of a male (78.7% men versus 21.3% women). Only in the case of tobacco the percentage of women (45.3%) admitted to treatment is close to that of men (54.7%).

The **average age** of the people who were admitted to treatment varies depending on the type of drug. It was 35 for heroin cases, 32 for cocaine, 26 for cannabis and 46 for tobacco. The average age in alcohol cases was 43, and 37 for other drugs.

In terms of **educational background**, the largest group of patients admitted for treatment for heroin (35%) and alcohol (32%) addiction had only primary-level education; this was also the case for

tobacco addiction (26%). On the other hand, secondary-level education still prevailed among those admitted for cocaine (32%) and cannabis (33%) addiction.

The most common **employment status** among heroin cases (36%) is being unemployed, whereas being employed (permanently, temporarily or self-employed) is the most common status among people admitted to treatment for tobacco (59%), cocaine (56%), alcohol (49%) and cannabis (47%).

With regard to **patient source**, in cases of heroin addiction the most common situations correspond to the patient's own initiative or that of relatives or friends (45%), as well as referrals from detoxification centres (22%). Seeking treatment on the patient's own initiative or that of relatives or friends (40%), and referrals from primary care centres (32%), are the most common situations in the case of cocaine. Referrals from primary care centres are the most common motivation in cases of cannabis (38%) and alcohol (41%). In the case of admissions for tobacco addiction, seeking treatment on the patient's own initiative or that of relatives or friends (42%) is the common situation. 44% of those admitted to treatment in 2007 had been in treatment previously.

In reference to the **place of residence** in the 30 days prior to admission to treatment, living together with parents is the most common situation in cases of cocaine (27%) and cannabis (37%), although an increase is observed when compared to 2006 in patients living on their own that are admitted to treatment for these drugs. Living on their own was the most common situation in the cases of heroin (22%) and alcohol (24%), involving a change from previous years, when the most common situation in admissions for heroin addiction was living together with the parents and, in admissions for alcohol addiction, living with a partner and children. Living with a partner and children is still the most common situation in the case of tobacco (38%).

With regard to the **type of residence** in the 30 days prior to admission to treatment, residing in

houses, flats or apartments is still the most frequent situation in the case of all drugs in 2007.

Regarding the **frequency of consumption** of the primary drug, the most common pattern is daily consumption, except for cocaine, where the most common pattern is two to three days a week (20%).

Profile of users admitted to treatment

The patient admitted to treatment for **heroin** is typically a male aged 30 to 39 who has also used cocaine and cannabis. He has a primary-level education, is currently unemployed—although he has worked before—, and lives with his parents or on his own. He sought treatment on his own initiative or that of relatives after having been in treatment previously, uses injection as the route of administration, last injected psychoactive substances less than 1 week before being admitted, and consumes the drug on a daily basis.

The patient admitted to treatment for **cocaine** is typically a male aged 25 to 34 who has also consumed alcohol and tobacco, has completed primary or secondary education, is currently employed and living with his parents. He is being admitted to treatment for the first time, either on his own initiative or that of relatives, administers the drug intranasally, has never injected psychoactive substances, and consumes the drug two to three days a week or else on a daily basis.

The typical **cannabis** consumer is a male aged 15 to 24 who has also consumed tobacco and/or alcohol, has a primary or secondary level education, is currently employed and living with his parents. He is being admitted to treatment for the first time, either on his own initiative or that of relatives, or else through a referral from a primary care centre, uses the pulmonary route of administration, has never injected psychoactive substances, and consumes the drug on a daily basis.

In the case of **tobacco**, the profile is that of a man or woman aged 35 to 49 who has also consumed

alcohol, has completed primary or secondary education, is currently employed and lives with his/her partner and children. The patient is being admitted to treatment either on his/her own initiative or that of relatives.

The person admitted to treatment for **alcohol** addiction is typically a male aged 35 to 49 who has also consumed tobacco, with primary education, currently employed and living with his partner and children or on his own. He is being admitted to treatment either on his own initiative or that of relatives, or else through a referral from a primary care centre, administers the drug orally, has never injected psychoactive substances, and consumes the drug on a daily basis.

Geographical distribution of admissions to treatment

As for the admissions to treatment reported by **health region of residence**, the Barcelona Metropolitan Area (74%) is still the region reporting the highest number of admissions to treatment per year, followed by Girona (10%), Tarragona (7%) and the Central area (5%).

The Barcelonès **county** leads the classification of admission reports by regions with 38%, followed by Vallès Occidental (11%), Baix Llobregat (10%), Vallès Oriental (6%) and Maresme region (6%).

As for the **country of birth**, 10% of the patients admitted to treatment were not born in Spain. The most frequent countries are Morocco (1.2%), Colombia (0.5%) and Ecuador (0.4%).

XAD ACTIVITY

The **activity** reported by the XAD's care and follow-up centres for the year 2007 involved 534,894 **individual visits**, 73,043 **patients participating in group sessions**, 10,082 **relatives of patients attending group sessions**, 6,799 **detoxifications**, and 196,950 **analyses of drug levels in urine**.

METHADONE MAINTENANCE PROGRAMME (MMP)

Inclusions in MMP

In 2007, 5,546 cases were **included in MMP**, 85% of which were men and 15% women, the majority (66%) falling within the 30 to 44 age interval. The main reason for treatment was referral (48%).

The number of cases **attending MMP** on 31 December, 2007 was 8,050, i.e. 3.6% more than those reported in 2006. Regarding the **time spent in the programme** by MMP users, the average time was 30 months. The number of **discharges reported** during 2007 was 5,759, the main reason being referral to other centres (47%).

Other than that, the **average methadone dose** was 60.8 mg during the last month of treatment.

HDU AND TC ACTIVITY

The drug addiction care and outpatients treatment centres reported 765 **applications for admission to an HDU** (Hospital-based Detoxification Unit). The main reasons were repeated failure of outpatient detoxification (57%) and the lack of family support (27%).

The most common reason leading to the 493 **applications for admission to a TC** (Therapeutic Community) was the failure of outpatient detoxification (55%), the lack of family support (21%), and social dysfunction (19%). The most frequently reported place of residence associated with these applications was the Barcelona Metropolitan Area (67%), followed by Tarragona (10%).

A total of 1,183 **discharges from HDU** were reported, the main reason for discharge being detoxification (87%). The **average length of stay** in these centres was 10 days.

SPECIFIC PROGRAMMES

Needle Exchange Programme

Between 1993 and 2007, a total of 12,119,842 syringes and kits were distributed in Catalonia by

the **Needle Exchange Programme**. 701,220 syringes and kits were distributed in 2007 alone, representing a decrease from the previous year. The most active **distribution agents** were fitted centres (221,560, 32%), pharmacies (191,745, 27%) and safe injection rooms (87,841, 13%).

As for the activity of social and healthcare emergency resources, in 2007, the centres distributing more syringes were: the Centre Baluard (139,851) and SAPS (54,270), in Barcelona, and the Mobile Unit Àmbit Prevenció (45,387), located in Gavà.

Green Line

In 2007, the Green Line service fielded 3,755 telephone calls and held 171 personal interviews. Of these calls and interviews, 55% were made by family members, the partner or friends. It must be said that, from 2004, there has been an ongoing downtrend from the previous year regarding these calls. The drug prompting the highest number of telephone calls and interviews was cocaine (28 and 24% respectively).

AIDS and drug addiction

15,623 **cases of AIDS** had been reported among residents in Catalonia up to 31 December 2007. Of these, 12,639 were men (81%) and 2,984 women (19%). The largest transmission group is formed by heterosexual IVDU (intravenous drug users), with 56%. The 8,712 cases included fall mainly in the 25-to-39 age group.

Consumption of psychoactive drugs

If we compare the invoicing data of these psychotropic drugs at the Catalan Public Healthcare Service for this year with the previous year, we observe a 1.36% increase in consumption, which means 1.65 points less than in the previous period (in 2006 the increase was 3.01% when compared to 2005).

We observe that only 3 of the psychotropic drugs increased their consumption when compared to 2006. These drugs were methylphenidate (16.27%),

buprenorphine, CIH (2.05%) and clomethiazole (2.02%). The biggest drop was posted by triazolam (-13.94%).

When compared to the previous year, we observe no significant differences between the development of the number of packages and consumption expressed in mg or doses per 1000 inhabitants per day (DID), with the exception of methylphenidate, with a 16.27% increase in the number of packages, a 45% increase in mg and a 43% increase in DID.

If we compare the consumption of all of these psychotropic drugs in 2007 over 2006, expressed in mg and DID, we observe a 2.73% increase in mg and a 0.93% increase in DID (please note that DID information has been updated with the RCA population database 2006 and 2007).

Surveys on drug consumption

This report includes the results of the school survey 2006-2007.

Generally speaking, the consumption of drugs among students aged 14 to 18 is still experimental or occasional.

Alcohol and tobacco are still the most frequently used drugs, followed by cannabis.

The data from 2006 show a positive trend, with a decrease in the consumption of some of the most widely spread drugs among students.

Such a decrease has been observed for tobacco (especially for those who state having smoked at some point in their life), cannabis and cocaine. In the case of these two drugs, the uptrend observed in the last few years was reversed.

With regard to alcoholic beverages, consumption has gradually increased since 2002, although during the 2004-2006 period this increase was lower than that of the 2002-2004 period.

In Catalonia, psychoactive substances, such as ecstasy or amphetamines, and hallucinogenic drugs, are not as widely spread as cocaine (the


rate of yearly users does not top 3.6% in any of the aforementioned drugs).

A relevant portion of students use several drugs, and a fairly close link is observed between the consumption of alcohol, tobacco, and cannabis, on the one hand, and between the use of stimulant agents (cocaine, ecstasy or amphetamines) and hallucinogenic drugs, on the other hand. Nevertheless, students who use stimulant or hallucinogenic drugs also feature a very high prevalence of tobacco, alcohol and cannabis consumption.

DATA COLLECTION

At the end of this report, we present, together with the information sources used, the forms used for compiling the data used to report admissions to treatment and inclusion in MMP, generate a monthly list of users in MMP, monitor the monthly activity of the attention and follow-up centres, process requests for admission to therapeutic communities and/or hospital detoxification units, and process discharges from hospital detoxification units and therapeutic communities.

Distribució dels inicis de tractament per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)



FONT	Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.
NOTA	La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per sexe i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

SEXE		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Homes	N	1.511	3.082	589	421	4.685	395	10.683
	%	81,4	82,2	83,4	54,7	79,1	69,1	78,7
Dones	N	345	669	117	349	1.240	177	2.897
	%	18,6	17,8	16,6	45,3	20,9	30,9	21,3
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT	Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.
NOTA	La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per grups d'edat i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

EDAT		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Menys de 15 anys	N	0	1	7	0	0	1	9
	%	0	0,0	1,0	0	0	0,2	0,1
De 15 a 19 anys	N	21	117	157	2	35	20	352
	%	1,1	3,1	22,2	0,3	0,6	3,5	2,6
De 20 a 24 anys	N	139	526	156	14	146	48	1.029
	%	7,5	14,0	22,1	1,8	2,5	8,4	7,6
De 25 a 29 anys	N	279	901	145	52	428	70	1.875
	%	15,0	24,0	20,5	6,8	7,2	12,2	13,8
De 30 a 34 anys	N	440	956	105	87	681	80	2.349
	%	23,7	25,5	14,9	11,3	11,5	14,0	17,3
De 35 a 39 anys	N	445	603	62	80	935	105	2.230
	%	24,0	16,1	8,8	10,4	15,8	18,4	16,4
De 40 a 44 anys	N	320	374	38	125	1.027	116	2.000
	%	17,2	10,0	5,4	16,2	17,3	20,3	14,7
De 45 a 49 anys	N	135	188	22	112	930	67	1.454
	%	7,3	5,0	3,1	14,5	15,7	11,7	10,7
De 50 a 54 anys	N	48	54	8	102	731	26	969
	%	2,6	1,4	1,1	13,2	12,3	4,5	7,1
De 55 a 59 anys	N	22	24	2	80	486	15	629
	%	1,2	0,6	0,3	10,4	8,2	2,6	4,6
60 anys o més	N	7	7	4	116	526	24	684
	%	0,4	0,2	0,6	15,1	8,9	4,2	5,0
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per nivell d'instrucció i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

NIVELL D'INSTRUCCIÓ		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
No sap llegir o escriure	N	29	18	2	2	57	7	115
	%	1,6	0,5	0,3	0,3	1,0	1,2	0,8
Estudis primaris incomplets, 5 primers cursos d'EGB o d'educació primària	N	277	302	64	61	840	59	1.603
	%	14,9	8,1	9,1	7,9	14,2	10,3	11,8
Estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària	N	640	1.100	197	203	1.922	149	4.211
	%	34,5	29,3	27,9	26,4	32,4	26,0	31,0
Batxillerat elemental, graduat escolar o ESO	N	487	1.205	233	149	1.329	142	3.545
	%	26,2	32,1	33,0	19,4	22,4	24,8	26,1
Batxillerat Superior, BUP, COU, batxillerat, FP de 1r o 2n grau, cicles formatius de grau mitjà o equivalents	N	266	780	143	159	1.100	93	2.541
	%	14,3	20,8	20,3	20,6	18,6	16,3	18,7
Altres titulacions per a les quals es requereix el graduat escolar, ESO o equivalents	N	16	86	16	63	149	13	343
	%	0,9	2,3	2,3	8,2	2,5	2,3	2,5
Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, cicles formatius de grau superior	N	52	117	26	64	241	27	527
	%	2,8	3,1	3,7	8,3	4,1	4,7	3,9
Títol universitari de grau superior	N	32	63	14	57	154	14	334
	%	1,7	1,7	2,0	7,4	2,6	2,4	2,5
Altres titulacions superiors per a les quals es requereix batxillerat Superior, BUP o batxillerat	N	4	17	2	3	14	1	41
	%	0,2	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3
Desconegut	N	53	63	9	9	119	67	320
	%	2,9	1,7	1,3	1,2	2,0	11,7	2,4
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per situació laboral i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

SITUACIÓ LABORAL		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Amb relació laboral, contracte indefinit o treballador per compte propi	N	301	1.467	214	397	2.088	104	4.571
	%	16,2	39,1	30,3	51,6	35,2	18,2	33,7
Amb contracte o relació laboral temporal	N	297	636	123	55	755	95	1.961
	%	16,0	17,0	17,4	7,1	12,7	16,6	14,4
Treball sense sou per a la família	N	13	14	7	21	27	2	84
	%	0,7	0,4	1,0	2,7	0,5	0,3	0,6
Parat, no havent treballat abans	N	123	103	26	4	103	19	378
	%	6,6	2,7	3,7	0,5	1,7	3,3	2,8
Parat, havent treballat abans	N	676	966	141	69	1.380	151	3.383
	%	36,4	25,8	20,0	9,0	23,3	26,4	24,9
Incapacitat permanent o pensionista	N	166	186	38	169	890	83	1.532
	%	8,9	5,0	5,4	21,9	15,0	14,5	11,3
Estudiant o opositant	N	6	33	102	7	22	12	182
	%	0,3	0,9	14,4	0,9	0,4	2,1	1,3
Realitzant exclusivament feines de la llar	N	9	25	0	18	132	7	191
	%	0,5	0,7	0	2,3	2,2	1,2	1,4
En una altra situació	N	217	273	44	23	438	33	1.028
	%	11,7	7,3	6,2	3,0	7,4	5,8	7,6
Desconeguda	N	48	48	11	7	90	66	270
	%	2,6	1,3	1,6	0,9	1,5	11,5	2,0
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcids diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per procedència del pacient i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

PROCEDÈNCIA	DROGA PRINCIPAL							
	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL	
Iniciativa pròpia, de familiars o d'amics	N	833	1.614	188	324	1.627	133	4.719
	%	44,9	43,0	26,6	42,1	27,5	23,3	34,7
Medicina general o atenció primària de salut	N	209	1.125	271	292	2.407	111	4.415
	%	11,3	30,0	38,4	37,9	40,6	19,4	32,5
Centres de tractament de les drogodependències	N	412	255	23	8	224	202	1.124
	%	22,2	6,8	3,3	1,0	3,8	35,3	8,3
Hospitals i altres serveis sanitaris	N	73	317	106	124	946	64	1.630
	%	3,9	8,5	15,0	16,1	16,0	11,2	12,0
Serveis socials	N	26	86	13	4	298	12	439
	%	1,4	2,3	1,8	0,5	5,0	2,1	3,2
Serveis legals o policials	N	200	205	65	2	175	24	671
	%	10,8	5,5	9,2	0,3	3,0	4,2	4,9
Altres	N	82	110	32	9	208	18	459
	%	4,4	2,9	4,5	1,2	3,5	3,1	3,4
Desconeguda	N	21	39	8	7	40	8	123
	%	1,1	1,0	1,1	0,9	0,7	1,4	0,9
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per convivència en els 30 dies anteriors i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

CONVIVÈNCIA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Sol	N	401	736	138	93	1.392	152	2.912
	%	21,6	19,6	19,5	12,1	23,5	26,6	21,4
Sol amb els seus fills	N	54	73	10	27	197	14	375
	%	2,9	1,9	1,4	3,5	3,3	2,4	2,8
Amb els pares	N	351	1.001	258	78	863	96	2.647
	%	18,9	26,7	36,5	10,1	14,6	16,8	19,5
Només amb la parella	N	173	426	61	150	751	50	1.611
	%	9,3	11,4	8,6	19,5	12,7	8,7	11,9
Amb la parella i els seus fills	N	165	518	66	289	1.226	50	2.314
	%	8,9	13,8	9,3	37,5	20,7	8,7	17,0
Amb amics	N	191	188	38	4	234	50	705
	%	10,3	5,0	5,4	0,5	3,9	8,7	5,2
Altres	N	334	346	49	22	513	51	1.315
	%	18,0	9,2	6,9	2,9	8,7	8,9	9,7
Desconeguda	N	187	463	86	107	749	109	1.701
	%	10,1	12,3	12,2	13,9	12,6	19,1	12,5
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcics diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per residència en els 30 dies previs a l'inici de tractament i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

RESIDÈNCIA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Cases, pisos, apartaments	N	964	2.529	485	524	3.998	266	8.766
	%	51,9	67,4	68,7	68,1	67,5	46,5	64,6
Presó, centre de menors	N	112	70	10	0	55	13	260
	%	6,0	1,9	1,4	0	0,9	2,3	1,9
Altres institucions	N	105	183	48	3	166	38	543
	%	5,7	4,9	6,8	0,4	2,8	6,6	4,0
Pensions, hotels, hostals	N	54	86	12	2	156	29	339
	%	2,9	2,3	1,7	0,3	2,6	5,1	2,5
Allotjament inestable	N	128	97	14	4	287	30	560
	%	6,9	2,6	2,0	0,5	4,8	5,2	4,1
Altres	N	111	124	16	2	229	39	521
	%	6,0	3,3	2,3	0,3	3,9	6,8	3,8
Desconeguda	N	382	662	121	235	1.034	157	2.591
	%	20,6	17,6	17,1	30,5	17,5	27,4	19,1
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT	Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.
NOTA	La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per freqüència de consum de la droga principal i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

FREQUÈNCIA DE CONSUM		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
Tots els dies	N	681	675	368	685	2.932	207	5.548
	%	36,7	18,0	52,1	89,0	49,5	36,2	40,9
Quatre a sis dies a la setmana	N	44	319	17	0	217	7	604
	%	2,4	8,5	2,4	0	3,7	1,2	4,4
Dos o tres dies a la setmana	N	40	736	51	1	397	18	1.243
	%	2,2	19,6	7,2	0,1	6,7	3,1	9,2
Un dia a la setmana	N	29	372	19	0	175	17	612
	%	1,6	9,9	2,7	0	3,0	3,0	4,5
Menys d'un dia a la setmana	N	103	359	37	0	207	83	789
	%	5,5	9,6	5,2	0	3,5	14,5	5,8
No en consumeix	N	476	590	106	11	1.048	82	2.313
	%	25,6	15,7	15,0	1,4	17,7	14,3	17,0
Desconegut	N	483	700	108	73	949	158	2.471
	%	26,0	18,7	15,3	9,5	16,0	27,6	18,2
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per país de naixement i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

PAÍS DE NAIXEMENT	DROGA PRINCIPAL							
	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL	
Espanya	N	1.558	3.427	638	744	5.290	509	12.166
	%	83,9	91,4	90,4	96,6	89,3	89,0	89,6
Altres països de la UE	N	63	37	6	4	97	4	211
	%	3,4	1,0	0,8	0,5	1,6	0,7	1,6
Resta Europa	N	51	10	1	2	48	2	114
	%	2,7	0,3	0,1	0,3	0,8	0,3	0,8
Amèrica del N	N	0	0	0	0	8	0	8
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Resta Amèriques	N	16	91	17	12	219	11	366
	%	0,9	2,4	2,4	1,6	3,7	1,9	2,7
Àfrica	N	29	65	19	6	83	8	210
	%	1,6	1,7	2,7	0,8	1,4	1,4	1,5
Àsia	N	9	5	1	0	15	4	34
	%	0,5	0,1	0,1	0,0	0,3	0,7	0,3
Oceania	N	0	1	0	0	0	0	1
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desconegut	N	130	115	24	2	165	34	470
	%	7,0	3,1	3,4	0,3	2,8	5,9	3,5
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	100	100	100	100	100	100	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament segons els països més freqüents* de naixement per droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

PAÍS DE NAIXEMENT	DROGA PRINCIPAL							TOTAL
	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta		
Espanya	N	1.554	3.427	607	744	5.290	544	12.166
	%	93,2	95,2	94,5	98,0	93,6	94,1	94,3
Marroc	N	24	48	15	4	62	7	160
	%	1,4	1,3	2,3	0,5	1,1	1,2	1,2
Colòmbia	N	5	14	6	2	31	2	60
	%	0,3	0,4	0,9	0,3	0,5	0,3	0,5
Equador	N	1	7	3	2	43	1	57
	%	0,1	0,2	0,5	0,3	0,8	0,2	0,4
França	N	6	10	0	0	24	0	40
	%	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3
Itàlia	N	19	6	3	0	9	0	37
	%	1,1	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,3
Argentina	N	1	12	1	3	16	2	35
	%	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
Xile	N	2	9	3	0	17	1	32
	%	0,1	0,2	0,5	0,0	0,3	0,2	0,2
Portugal	N	14	5	0	0	9	2	30
	%	0,8	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2
Rep. Dominicana,	N	0	14	2	1	11	2	30
	%	0,0	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2
Alemanya	N	7	6	0	1	12	3	29
	%	0,4	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,2
Perú	N	0	5	0	0	22	1	28
	%	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2
Brasil	N	3	13	0	0	11	0	27
	%	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Romania	N	5	2	0	0	18	0	25
	%	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2
Geòrgia	N	14	1	0	0	2	8	25
	%	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2
Rússia	N	8	2	0	0	13	2	25
	%	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2
Algèria	N	2	7	1	0	9	1	20
	%	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Bolívia	N	0	1	1	0	18	0	20
	%	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2
Uruguay	N	0	7	0	1	10	1	19
	%	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1
Veneçuela	N	2	4	0	1	8	1	16
	%	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
Polònia	N	1	1	0	0	14	0	16
	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA * S'inclouen només aquells països que aporten almenys 15 casos.
La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per droga principal i altres drogues consumides (gener - desembre 2007)

ALTRES DROGUES CONSUMIDES		DROGA PRINCIPAL						TOTAL (1)
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Heroïna	N	-	93	8	2	48	29	180
	%	-	2,5	1,1	0,3	0,8	5,1	1,3
Cocaïna	N	645	-	137	8	952	78	1.820
	%	34,8	-	19,4	1,0	16,1	13,6	13,4
Cànnabis	N	532	1.167	-	19	729	106	2.553
	%	28,7	31,1	-	2,5	12,3	18,5	18,8
Tabac	N	398	1.188	198	-	1.967	108	3.859
	%	21,4	31,7	28,0	-	33,2	18,9	28,4
Alcohol	N	366	1.966	261	77	-	104	2.774
	%	19,7	52,4	37,0	10,0	-	18,2	20,4
Resta	N	472	737	154	22	1.131	131	2.647
	%	25,4	19,6	21,8	2,9	19,1	22,9	19,5
No consumeix cap altra droga	N	548	860	248	658	2.336	252	4.902
	%	29,5	22,9	35,1	85,5	39,4	44,1	36,1
TOTAL (2)	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA A les files s'indica el nombre de casos que consumeixen altres drogues a més de la droga principal que motiva el tractament (DROGA PRINCIPAL). La suma dels percentatges de les files i de les columnes només ha de sumar cent a la fila del **TOTAL (2)**, i la suma de casos només ha de coincidir en el **TOTAL (1)** de les files.

La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcids diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per la via d'administració més freqüent de la droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

VIA D'ADMINISTRACIÓ		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Oral	N	0	0	0	0	5.925	432	6.357
	%	0	0	0	0	100,0	75,5	46,8
Pulmonar	N	616	390	706	770	0	37	2.519
	%	33,2	10,4	100,0	100,0	0	6,5	18,5
Injectada	N	695	146	0	0	0	28	869
	%	37,4	3,9	0	0	0	4,9	6,4
Intranassal	N	407	3.071	0	0	0	36	3.514
	%	21,9	81,9	0	0	0	6,3	25,9
Altres	N	47	54	0	0	0	3	104
	%	2,5	1,4	0	0	0	0,5	0,8
Desconeguda	N	91	90	0	0	0	36	217
	%	4,9	2,4	0	0	0	6,3	1,6
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcics diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Notificacions d'inici de tractament segons que l'usuari hagi seguit o no tractaments anteriors i la droga principal que els motiva (gener - desembre 2007)

DROGA	Amb tractament anterior		Sense tractament anterior		Desconegut		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Heroïna	1.317	71,0	478	25,8	61	3,3	1.856	13,7
Cocaïna	1.425	38,0	2.201	58,7	125	3,3	3.751	27,6
Cànnabis	129	18,3	557	78,9	20	2,8	706	5,2
Tabac	222	28,8	531	69,0	17	2,2	770	5,7
Alcohol	2.544	42,9	3.166	53,4	215	3,6	5.925	43,6
Resta	332	58,0	204	35,7	36	6,3	572	4,2
TOTAL	5.969	44,0	7.137	52,6	474	3,5	13.580	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiàcics diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per temps transcorregut des que es va injectar per última vegada qualsevol substància psicoactiva (gener - desembre 2007)

TEMPS ÚLTIMA INJECCIÓ		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
Menys d'una setmana	N	365	69	1	0	40	23	498
	%	19,7	1,8	0,1	0	0,7	4,0	3,7
Menys d'un mes	N	93	22	1	1	18	13	148
	%	5,0	0,6	0,1	0,1	0,3	2,3	1,1
Menys de sis mesos	N	66	22	1	0	9	17	115
	%	3,6	0,6	0,1	0	0,2	3,0	0,8
Menys d'un any	N	45	12	0	0	8	8	73
	%	2,4	0,3	0	0	0,1	1,4	0,5
D'un a dos anys	N	103	16	3	2	18	12	154
	%	5,5	0,4	0,4	0,3	0,3	2,1	1,1
De tres a quatre anys	N	92	22	3	3	20	19	159
	%	5,0	0,6	0,4	0,4	0,3	3,3	1,2
De cinc a nou anys	N	119	27	5	3	31	30	215
	%	6,4	0,7	0,7	0,4	0,5	5,2	1,6
Deu o més anys	N	102	75	24	8	123	26	358
	%	5,5	2,0	3,4	1,0	2,1	4,5	2,6
Mai no s'ha injectat	N	608	3.167	621	726	5.309	362	10.793
	%	32,8	84,4	88,0	94,3	89,6	63,3	79,5
Desconegut	N	263	319	47	27	349	62	1.067
	%	14,2	8,5	6,7	3,5	5,9	10,8	7,9
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució dels inicis de tractament per estat serològic i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

ESTAT SEROLÒGIC		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Positiu	N	316	95	13	8	76	64	572
	%	17,0	2,5	1,8	1,0	1,3	11,2	4,2
Negatiu amb anàlisi en els últims 6 mesos	N	329	613	89	73	748	82	1.934
	%	17,7	16,3	12,6	9,5	12,6	14,3	14,2
Negatiu sense anàlisi en els últims 6 mesos	N	309	524	71	47	593	68	1.612
	%	16,6	14,0	10,1	6,1	10,0	11,9	11,9
Negatiu sense saber la data de les anàlisis	N	135	173	30	53	210	37	638
	%	7,3	4,6	4,2	6,9	3,5	6,5	4,7
Amb anàlisi feta però pendent de resultat	N	30	159	21	5	250	14	479
	%	1,6	4,2	3,0	0,6	4,2	2,4	3,5
No s'ha realitzat anàlisi	N	232	1.021	249	343	1.919	102	3.866
	%	12,5	27,2	35,3	44,5	32,4	17,8	28,5
Desconegut	N	505	1.166	233	241	2.129	205	4.479
	%	27,2	31,1	33,0	31,3	35,9	35,8	33,0
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Distribució de les drogues que causen l'inici de tractament (gener - desembre 2007)


36

DROGA PRINCIPAL		N	%	
Tabac		770	5,67	
Opiacis	Opiacis sense especificar	52	0,38	
	Heroïna	1.841	13,56	
	Heroïna + cocaïna sense especificar	15	0,11	
	Opi i morfina	Morfina	4	0,03
		Opi	2	0,01
	Codeïna	Codeïna o derivats de codeïna sense especificar	45	0,33
	Opiacis sintètics	Petidina o meperidina i anàlegs	1	0,01
		Levo-alfa-acetil-metadol		0,00
		Dextropropoxifè	3	0,02
		Fentanil	1	0,01
		Metadona	215	1,58
Tramadol		4	0,03	
Opiacis agonistes-antagonistes o agonistes parcials	Buprenorfina	1	0,01	
Estimulants	Estimulants sense especificar	1	0,01	
	Cocaïna	Cocaïna sense especificar	3.748	27,60
		Cocaïna (Clorhidrat)	1	0,01
		Base lliure Cocaïna	2	0,01
	Amfetamines	Amfetamines sense especificar	19	0,14
		Metilamfetamina	2	0,01
		Sulfat d'amfetamina	6	0,04
	MDMA	Derivats de la feniletilamina (drogues de disseny) sense especificar	7	0,05
		MDMA	18	0,13
	Anoxigens d'acció central sense especificar		1	0,01
	Estimulants del sistema nervios central	Metilfenidat	3	0,02
Cafeïna, Durvitan, Prolert, Lipograsil		2	0,01	
Hipnòtics i Sedants	Hipnòtics i sedants sense especificar	3	0,02	
	Altres hipnòtics no barbitúrics	Clometiazol	4	0,03
		Benzodiazepines sense especificar	110	0,81
		Alprazolam	13	0,10
		Cloracepat dipotàsic	1	0,01
		Diazepam	1	0,01
		Flunitrazepam	1	0,01
		Lorazepam	5	0,04
		Lormetazepam	1	0,01
		Zopiclona	1	0,01
		Altres benzodiazepines especificades	1	0,01
Altres ansiolítics o tranquil·litzants menors no barbitúrics ni benzodiazepines	GHB	2	0,01	
Al·lucinògens	Al·lucinògens sense especificar	1	0,01	
	Droques al·lucinògenes sintètiques	Droques al·lucinògenes sintètiques sense especificar	1	0,01
		LSD	3	0,02
	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens	Fàrmacs amb efectes al·lucinògens sense especificar	1	0,01
	Ketamina	11	0,08	
Inhalants	Inhalants sense especificar	6	0,04	
	Nitrits vasodilatadors	1	0,01	
	Pintures i diluents de pintures	1	0,01	
Cànnabis	Cànnabis sense especificar	473	3,49	
	Tetrahidrocannabinol	34	0,25	
	Planta	135	0,99	
	Resina	63	0,46	
	Altres formes de cànnabis	1	0,01	
Alcohol		5.925	43,63	
Altres substàncies psicoactives		17	0,13	
TOTAL		13.580	100	

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per sexe en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)




FONT


Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)

Nivell d'instrucció




Situació Laboral




FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per procedència del pacient i any de primer ús en casos de dependència de l'heroïna (gener - desembre 2007)

Procedència del pacient




Any de primer ús



FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


NOTA L'any de primer ús és desconegut en 64 casos de dependència de l'heroïna

**Distribució per sexe en casos de dependència de l'alcohol
(gener - desembre 2007)**



FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


**Distribució per edat i sexe en casos de dependència de l'alcohol
(gener - desembre 2007)**




FONT Subdirecció General de Drogodependències . Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2007)

Nivell d'instrucció



Situació Laboral




FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de l'alcohol (gener - desembre 2007)


Procedència del pacient



FONT


Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)



FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per edat i sexe en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)




FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)

Nivell d'instrucció



Situació Laboral




FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per procedència del pacient en casos de dependència del tabac (gener - desembre 2007)


Procedència del pacient



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Distribució per sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per edat i sexe en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)




FONT


Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per nivell d'instrucció i situació laboral en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)

Nivell d'instrucció



Situació Laboral




FONT


Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Distribució per procedència del pacient en casos de dependència de la cocaïna (gener - desembre 2007)

Procedència del pacient



Any de primer ús



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA

L'any de primer ús és desconegut en 121 casos de dependència de cocaïna.

Inicis de tractament per regions sanitàries de residència i droga principal (gener - desembre 2007)

REGIÓ SANITÀRIA		DROGA PRINCIPAL						TOTAL
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	
Lleida	N	56	64	18	0	91	10	239
	%	3,0	1,7	2,5	0	1,5	1,7	1,8
Tarragona	N	150	242	41	107	357	35	932
	%	8,1	6,5	5,8	13,9	6,0	6,1	6,9
Terres de l'Ebre	N	35	121	15	5	125	5	306
	%	1,9	3,2	2,1	0,6	2,1	0,9	2,3
Girona	N	211	341	73	67	487	139	1.318
	%	11,4	9,1	10,3	8,7	8,2	24,3	9,7
Central	N	30	175	30	42	288	44	609
	%	1,6	4,7	4,2	5,5	4,9	7,7	4,5
Metropolitana	N	1.346	2.753	523	548	4.527	335	10.032
	%	72,5	73,4	74,1	71,2	76,4	58,6	73,9
Alt Pirineu Vall D'Aran	N	10	21	3	1	27	1	63
	%	0,5	0,6	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5
Fora Catalunya	N	18	34	3	0	23	3	81
	%	1,0	0,9	0,4	0	0,4	0,5	0,6
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	13,7	27,6	5,2	5,7	43,6	4,2	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" de drogues agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per regions sanitàries de residència
(gener - desembre 2007)**

REGIÓ SANITÀRIA	UHD		CT	
	N	%	N	%
Lleida	17	2,2	4	0,8
Tarragona	92	12,0	50	10,1
Terres de l'Ebre	13	1,7	33	6,7
Girona	86	11,2	29	5,9
Central	47	6,1	43	8,7
Metropolitana	508	66,4	332	67,2
Alt Pirineu Vall D'Aran	2	0,3	0	0
Fora de Catalunya	0	0	3	0,6
TOTAL	765	100	494	100

FONT	<i>Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.</i>
NOTA	<i>UHD=Unitat Hospitalària de desintoxicació; CT=Comunitat Terapèutica.</i>

**Inclusions en PMM per regions sanitàries de residència
(gener - desembre 2007)**

REGIÓ SANITÀRIA	TOTAL	
	N	%
Lleida	114	2,1
Tarragona	510	9,2
Terres de l'Ebre	93	1,7
Girona	617	11,1
Central	170	3,1
Metropolitana	3.983	71,8
Alt Pirineu Vall D'Aran	10	0,2
Fora de Catalunya	49	0,9
TOTAL	5.546	100

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d'inclusió del Programa de Manteniment amb Metadona efectuades per regions sanitàries de residència.

Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

48

COMARCA	DROGA PRINCIPAL							TOTAL
	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta		
Baix Llobregat	N	181	399	62	36	655	32	1.365
	%	9,8	10,6	8,8	4,7	11,1	5,6	10,1
Barcelonès	N	798	1.281	218	336	2.336	195	5.164
	%	43,0	34,2	30,9	43,6	39,4	34,1	38,0
Maresme	N	61	220	61	35	354	26	757
	%	3,3	5,9	8,6	4,5	6,0	4,5	5,6
Vallès Occidental	N	200	447	98	19	642	47	1.453
	%	10,8	11,9	13,9	2,5	10,8	8,2	10,7
Vallès Oriental	N	73	230	52	120	341	23	839
	%	3,9	6,1	7,4	15,6	5,8	4,0	6,2
Alt Empordà	N	59	51	7	4	75	19	215
	%	3,2	1,4	1,0	0,5	1,3	3,3	1,6
Baix Empordà	N	52	76	9	1	94	27	259
	%	2,8	2,0	1,3	0,1	1,6	4,7	1,9
Garrotxa	N	5	23	10	58	46	5	147
	%	0,3	0,6	1,4	7,5	0,8	0,9	1,1
Gironès	N	64	88	26	1	155	40	374
	%	3,4	2,3	3,7	0,1	2,6	7,0	2,8
Selva	N	31	80	16	0	91	39	257
	%	1,7	2,1	2,3	0	1,5	6,8	1,9
Alt Camp	N	17	14	6	1	22	0	60
	%	0,9	0,4	0,8	0,1	0,4	0	0,4
Alt Penedès	N	19	63	11	2	79	3	177
	%	1,0	1,7	1,6	0,3	1,3	0,5	1,3
Baix Penedès	N	16	39	4	0	48	0	107
	%	0,9	1,0	0,6	0	0,8	0	0,8
Garraf	N	12	99	20	0	104	8	243
	%	0,6	2,6	2,8	0	1,8	1,4	1,8
Tarragonès	N	61	106	20	14	139	9	349
	%	3,3	2,8	2,8	1,8	2,3	1,6	2,6
Baix Camp	N	51	89	9	90	138	25	402
	%	2,7	2,4	1,3	11,7	2,3	4,4	3,0
Conca de Barberà	N	3	5	1	1	16	0	26
	%	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0	0,2

Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

49

COMARCA	DROGA PRINCIPAL							TOTAL
	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta		
Priorat	N	2	1	1	1	5	1	11
	%	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Ribera d'Ebre	N	5	8	1	3	15	3	35
	%	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,5	0,3
Baix Ebre	N	22	53	12	0	63	1	151
	%	1,2	1,4	1,7	0	1,1	0,2	1,1
Montsià	N	7	53	1	1	38	0	100
	%	0,4	1,4	0,1	0,1	0,6	0	0,7
Terra Alta	N	1	7	1	1	9	1	20
	%	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
Cerdanya	N	0	9	0	0	1	0	10
	%	0	0,2	0	0	0,0	0	0,1
Osona	N	7	27	6	1	45	0	86
	%	0,4	0,7	0,8	0,1	0,8	0	0,6
Ripollès	N	2	9	1	1	4	1	18
	%	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Anoia	N	20	54	18	2	102	22	218
	%	1,1	1,4	2,5	0,3	1,7	3,8	1,6
Bages	N	3	78	7	34	118	21	261
	%	0,2	2,1	1,0	4,4	2,0	3,7	1,9
Berguedà	N	0	9	0	2	15	0	26
	%	0	0,2	0	0,3	0,3	0	0,2
Solsonès	N	0	6	1	3	13	1	24
	%	0	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2
Garrigues	N	2	8	2	0	9	1	22
	%	0,1	0,2	0,3	0	0,2	0,2	0,2
Noguera	N	10	17	6	0	18	1	52
	%	0,5	0,5	0,8	0	0,3	0,2	0,4
Segarra	N	2	5	0	0	2	2	11
	%	0,1	0,1	0	0	0,0	0,3	0,1
Segrià	N	40	26	9	0	46	6	127
	%	2,2	0,7	1,3	0	0,8	1,0	0,9
Urgell	N	1	4	0	0	10	2	17
	%	0,1	0,1	0	0	0,2	0,3	0,1

Inicis de tractament notificats per comarques de residència i droga principal que motiva el tractament (gener - desembre 2007)

COMARCA	DROGA PRINCIPAL							TOTAL
	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta		
Alt Urgell	N	4	7	2	1	14	0	28
	%	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0	0,2
Pallars Jussà	N	2	4	0	0	11	0	17
	%	0,1	0,1	0	0	0,2	0	0,1
Pallars Sobirà	N	3	0	0	0	1	0	4
	%	0,2	0	0	0	0,0	0	0,0
Vall d'Aran	N	1	0	0	0	0	0	1
	%	0,1	0	0	0	0	0	0,0
Alta Ribagorça	N	0	1	0	0	0	0	1
	%	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Pla de l'Estany	N	0	16	4	2	22	8	52
	%	0	0,4	0,6	0,3	0,4	1,4	0,4
Pla d'Urgell	N	1	5	1	0	6	0	13
	%	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1
Fora de Catalunya	N	18	34	3	0	23	3	81
	%	1,0	0,9	0,4	0	0,4	0,5	0,6
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	100	100	100	100	100	100	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

**Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2007)**

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
U. Drogo. Generalitat Barcelona	N	37	36	4	0	336	3	416
	%	2,0	1,0	0,6	0	5,7	0,5	3,1
CAS Sants Barcelona	N	54	130	22	0	171	16	393
	%	2,9	3,5	3,1	0	2,9	2,8	2,9
CAS Garbívent Barcelona	N	111	163	46	0	285	11	616
	%	6,0	4,3	6,5	0	4,8	1,9	4,5
CAS Sarrià Barcelona	N	63	91	18	0	125	13	310
	%	3,4	2,4	2,5	0	2,1	2,3	2,3
CAS Barceloneta Barcelona	N	50	64	9	0	97	3	223
	%	2,7	1,7	1,3	0	1,6	0,5	1,6
SPOTT Barcelona	N	83	181	25	1	98	27	415
	%	4,5	4,8	3,5	0,1	1,7	4,7	3,1
DELTA Badalona	N	52	149	18	2	309	6	536
	%	2,8	4,0	2,5	0,3	5,2	1,0	3,9
SAD L'Hospitalet Llobregat	N	57	85	9	0	145	7	303
	%	3,1	2,3	1,3	0	2,4	1,2	2,2
CAS Sant Feliu Llobregat	N	21	48	9	3	89	10	180
	%	1,1	1,3	1,3	0,4	1,5	1,7	1,3
CAS Sabadell	N	103	170	26	14	261	10	584
	%	5,5	4,5	3,7	1,8	4,4	1,7	4,3
CAS Granollers	N	44	171	41	0	262	17	535
	%	2,4	4,6	5,8	0	4,4	3,0	3,9
CAS Mataró	N	22	71	35	28	174	8	338
	%	1,2	1,9	5,0	3,6	2,9	1,4	2,5
CADO Vic	N	8	34	6	1	32	0	81
	%	0,4	0,9	0,8	0,1	0,5	0	0,6
Hospital General Manresa	N	3	80	7	34	134	20	278
	%	0,2	2,1	1,0	4,4	2,3	3,5	2,0
CAS Joan XXIII Tarragona	N	94	156	32	11	186	9	488
	%	5,1	4,2	4,5	1,4	3,1	1,6	3,6
Hospital Sant Joan Reus	N	58	94	9	102	169	28	460
	%	3,1	2,5	1,3	13,2	2,9	4,9	3,4
CAS Tortosa H. Santa Creu	N	30	108	13	0	108	2	261
	%	1,6	2,9	1,8	0	1,8	0,3	1,9

**Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2007)**

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
Hospital Provincial Lleida	N	62	51	13	0	97	10	233
	%	3,3	1,4	1,8	0	1,6	1,7	1,7
CAS Girona	N	72	123	35	0	194	66	490
	%	3,9	3,3	5,0	0	3,3	11,5	3,6
CAS Garrotxa Olot	N	4	28	10	67	52	9	170
	%	0,2	0,7	1,4	8,7	0,9	1,6	1,3
CAS Font Santa	N	17	84	18	30	134	3	286
	%	0,9	2,2	2,5	3,9	2,3	0,5	2,1
CAS Seu d'Urgell	N	2	2	0	0	4	0	8
	%	0,1	0,1	0	0	0,1	0	0,1
CAS Nou Barris	N	21	27	3	0	40	3	94
	%	1,1	0,7	0,4	0	0,7	0,5	0,7
CAS Mollet	N	30	40	11	0	64	6	151
	%	1,6	1,1	1,6	0	1,1	1,0	1,1
CAS Prat de Llobregat	N	33	37	4	0	56	0	130
	%	1,8	1,0	0,6	0	0,9	0	1,0
CAS Pallars - Hospital del Pallars	N	0	0	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0	0	0
CAS Borges Blanques	N	2	4	2	0	4	0	12
	%	0,1	0,1	0,3	0	0,1	0	0,1
CAS Balaguer	N	3	10	4	0	10	1	28
	%	0,2	0,3	0,6	0	0,2	0,2	0,2
CAS Tàrraga	N	1	5	0	0	2	0	8
	%	0,1	0,1	0	0	0,0	0	0,1
Hospital Vielha	N	0	0	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0	0	0
Casa Bloc Generalitat Barcelona	N	7	72	18	0	22	5	124
	%	0,4	1,9	2,5	0	0,4	0,9	0,9
Creu Roja Barcelona	N	116	39	3	0	26	2	186
	%	6,3	1,0	0,4	0	0,4	0,3	1,4
Sant Pau Barcelona	N	31	106	5	65	154	62	423
	%	1,7	2,8	0,7	8,4	2,6	10,8	3,1
Unitat Tabaquisme Hospital Clínic	N	0	0	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0	0	0

**Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2007)**

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT		DROGA PRINCIPAL						
		Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta	TOTAL
Unitat Alcohologia H. Clínic	N	1	2	1	0	200	2	206
	%	0,1	0,1	0,1	0	3,4	0,3	1,5
Fundació Mensalus	N	49	85	6	0	61	6	207
	%	2,6	2,3	0,8	0	1,0	1,0	1,5
Sta. Rosa Sta. Coloma Gramenet	N	0	1	0	6	71	0	78
	%	0	0,0	0	0,8	1,2	0	0,6
CAS Olesa Montserrat	N	5	24	7	0	45	3	84
	%	0,3	0,6	1,0	0	0,8	0,5	0,6
Ferran Salsas Rubí	N	10	51	15	0	84	8	168
	%	0,5	1,4	2,1	0	1,4	1,4	1,2
CAP Badia Barberà V.	N	1	6	9	1	19	1	37
	%	0,1	0,2	1,3	0,1	0,3	0,2	0,3
UAT Calella	N	31	73	9	0	102	14	229
	%	1,7	1,9	1,3	0	1,7	2,4	1,7
CAS Igualada	N	19	46	15	2	91	23	196
	%	1,0	1,2	2,1	0,3	1,5	4,0	1,4
CAS Figueres	N	60	44	6	0	71	17	198
	%	3,2	1,2	0,8	0	1,2	3,0	1,5
CAS Palafrugell	N	45	64	9	0	86	22	226
	%	2,4	1,7	1,3	0	1,5	3,8	1,7
CAS Blanes	N	26	76	12	0	77	31	222
	%	1,4	2,0	1,7	0	1,3	5,4	1,6
CAS Ripoll	N	0	0	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0	0	0
Dispensari Alcoholisme Puigcerdà	N	0	9	0	0	0	0	9
	%	0	0,2	0	0	0	0	0,1
CAS Mútua Terrassa	N	45	115	25	0	153	13	351
	%	2,4	3,1	3,5	0	2,6	2,3	2,6
CAS Premià de Mar	N	0	29	2	0	21	1	53
	%	0	0,8	0,3	0	0,4	0,2	0,4
CECAS	N	21	67	4	1	48	6	147
	%	1,1	1,8	0,6	0,1	0,8	1,0	1,1
Cáritas Solsona	N	0	5	0	5	9	0	19
	%	0	0,1	0	0,6	0,2	0	0,1

**Inicis de tractament notificats per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2007)**

54


CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	DROGA PRINCIPAL							TOTAL
	Heroïna	Cocaïna	Cànnabis	Tabac	Alcohol	Resta		
CAS La Mina Sant Adrià del Besòs	N	25	12	1	0	15	3	56
	%	1,3	0,3	0,1	0	0,3	0,5	0,4
CAS Horta - Guinardó	N	2	81	31	275	259	23	671
	%	0,1	2,2	4,4	35,7	4,4	4,0	4,9
CAS Cerdanyola - Ripollet	N	8	14	7	0	31	0	60
	%	0,4	0,4	1,0	0	0,5	0	0,4
CAS Vilanova i la Geltrú	N	12	91	20	0	110	4	237
	%	0,6	2,4	2,8	0	1,9	0,7	1,7
CAS Vilafranca del Penedès	N	16	60	10	0	68	2	156
	%	0,9	1,6	1,4	0	1,1	0,3	1,1
CAS Mollerussa	N	1	3	1	0	4	0	9
	%	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0	0,1
CAS Esplugues	N	0	0	0	0	35	0	35
	%	0	0	0	0	0,6	0	0,3
Unitat Tabaquisme Mollet	N	0	0	1	122	0	0	123
	%	0	0	0,1	15,8	0	0	0,9
CAS Vall d'Hebron	N	89	100	20	0	84	23	316
	%	4,8	2,7	2,8	0	1,4	4,0	2,3
CAS Cerdanyola - Canaletes	N	8	36	5	0	45	2	96
	%	0,4	1,0	0,7	0	0,8	0,3	0,7
CAS Sant Boi	N	56	123	10	0	178	3	370
	%	3,0	3,3	1,4	0	3,0	0,5	2,7
CAS Sant Cugat	N	12	34	16	0	47	4	113
	%	0,6	0,9	2,3	0	0,8	0,7	0,8
CAS Martorell	N	23	41	9	0	71	4	148
	%	1,2	1,1	1,3	0	1,2	0,7	1,1
TOTAL	N	1.856	3.751	706	770	5.925	572	13.580
	%	100	100	100	100	100	100	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA La classe "Resta de drogues" agrupa les següents: opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.

Evolució anual dels inicis de tractament (anys 1988 - 2007)


55



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Evolució anual dels inicis de tractament per tipus de droga (anys 1991 - 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2007)**

56

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	UHD		CT	
	N	%	N	%
U. Drog. Generalitat Barcelona	55	7,2	3	0,6
CAS Sants Barcelona	9	1,2	6	1,2
CAS Garbivent Barcelona	4	0,5	18	3,6
CAS Sarrià Barcelona	35	4,6	37	7,5
CAS Barceloneta Barcelona	37	4,8	2	0,4
SPOTT Barcelona	2	0,3	2	0,4
DELTA Badalona	10	1,3	0	0
SAD L'Hospitalet Llobregat	60	7,8	26	5,3
CAS Sant Feliu Llobregat	17	2,2	13	2,6
CAS Sabadell	117	15,3	53	10,7
CAS Granollers	58	7,6	29	5,9
CAS Mataró	4	0,5	0	0
CADO Vic	0	0	2	0,4
CAS Bages	3	0,4	3	0,6
CAS Joan XXIII Tarragona	74	9,7	28	5,7
Hospital Sant Joan Reus	19	2,5	7	1,4
CAS Tortosa Hospital Santa Creu	10	1,3	30	6,1
Hospital de Santa Maria Lleida	14	1,8	0	0
CAS Girona	63	8,2	3	0,6
CAS Garrotxa Olot	0	0	0	0

ACTIVITAT DELS CENTRES D'ATENCIÓ I SEGUIMENT

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2007)**

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	UHD		CT	
	N	%	N	%
CAS Fontsanta	15	2,0	10	2,0
CAS Seu d'Urgell	1	0,1	0	0
CAS Nou Barris	19	2,5	17	3,4
CAS Mollet	27	3,5	13	2,6
CAS Prat de Llobregat	1	0,1	1	0,2
CAS Pallars - Hospital del Pallars	0	0	0	0
CAS Borges Blanques	0	0	0	0
CAS Balaguer	1	0,1	0	0
CAS Tàrraga	2	0,3	0	0
Hospital Vielha	0	0	0	0
Casa Bloc Generalitat Barcelona	13	1,7	7	1,4
Creu Roja Barcelona	14	1,8	3	0,6
Sant Pau Barcelona	0	0	7	1,4
Unitat Alcohologia H.Clinic	0	0	0	0
Fundació Mensalus	0	0	0	0
Sta. Rosa Sta.Coloma Gramanet	0	0	0	0
CAS Olesa Montserrat	0	0	1	0,2
Ferran Salsas Rubí	1	0,1	5	1,0
CAP Badia Barberà Vallès	0	0	0	0
UAT Calella	0	0	1	0,2

**Sol·licituds d'ingrés a UHD i a CT per cada centre d'atenció i seguiment
(gener - desembre 2007)**

58

CENTRE D'ATENCIÓ I SEGUIMENT	UHD		CT	
	N	%	N	%
CAS Igualada	12	1,6	16	3,2
CAS Figueres	22	2,9	22	4,5
CAS Palafrugell	0	0	0	0
CAS Blanes	1	0,1	0	0
CAS Ripoll	0	0	0	0
Disp. Alcoholisme Puigcerdà	0	0	0	0
CAS Mútua Terrassa	0	0	4	0,8
CAS Premià de Mar	1	0,1	0	0
CECAS	0	0	90	18,2
Càritas Solsona	0	0	0	0
Font Picant	0	0	0	0
CAS La Mina Sant Adrià del Besòs	3	0,4	0	0
CAS Horta - Guinardó	0	0	0	0
CAS Cerdanyola	14	1,8	3	0,6
CAS Vilanova i la Geltrú	10	1,3	14	2,8
CAS Vilafranca del Penedès	1	0,1	0	0
CAS Mollerussa	0	0	0	0
CAS Esplugues	0	0	0	0
Unitat de Tabaquisme Mollet	0	0	0	0
CAS Cerdanyola - Canaletes	16	2,1	15	3,0
CAS Martorell	0	0	1	0,2
CAS Sant Boi	0	0	2	0,4
TOTAL	765	100	494	100

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions individualitzades trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

NOTA UHD= Unitat Hospitalària de Desintoxicació i CT= Comunitat Terapèutica.

Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2007)

59

CENTRE D'ATENCIÓ SEGUIMENT	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
U.Drog. Generalitat Barcelona	527,3	1,2	355,7	5,8	107,0	12,7	24,1	4,3	32,2	0,2
CAS Sants Barcelona	2.537,6	5,7	1.558,3	25,6	12,7	1,5	24,7	4,4	94,1	0,6
CAS Garbivent Barcelona	3.817,3	8,6	71,7	1,2	0	0	23,7	4,2	413,5	2,5
CAS Sarrià Barcelona	1.670,3	3,7	337,4	5,5	5,0	0,6	4,2	0,7	62,2	0,4
CAS Barceloneta Barcelona	405,3	0,9	0,3	0,0	0	0	25,9	4,6	264,4	1,6
SPOTT Barcelona	9.316,3	20,9	107,8	1,8	59,6	7,1	75,0	13,2	1.719,7	10,5
DELTA Badalona	925,2	2,1	0	0	0,4	0,0	10,3	1,8	144,8	0,9
SAD L'Hospitalet Llobregat	1.242,3	2,8	70,4	1,2	15,0	1,8	5,3	0,9	37,0	0,2
CAS Sant Feliu Llobregat	978,6	2,2	5,9	0,1	51,3	6,1	3,5	0,6	346,8	2,1
CAS Sabadell	952,3	2,1	95,7	1,6	0	0	12,6	2,2	677,0	4,1
CAS Granollers	583,6	1,3	170,3	2,8	9,2	1,1	41,4	7,3	1,2	0,0
CAS Mataró	534,7	1,2	29,6	0,5	0	0	29,3	5,2	401,4	2,4
CADO Vic	410,8	0,9	0	0	0	0	1,7	0,3	1.573,7	9,6
CAS Bages	486,6	1,1	100,1	1,6	19,3	2,3	20,6	3,6	1.954,3	11,9
CAS Joan XXIII Tarragona	804,1	1,8	61,1	1,0	0	0	3,9	0,7	188,7	1,1
Hospital Sant Joan Reus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAS Tortosa H. Santa Creu	333,2	0,7	67,8	1,1	20,5	2,4	2,7	0,5	321,4	2,0
Hospital de Santa Maria Lleida	440,8	1,0	101,6	1,7	39,2	4,7	5,8	1,0	331,5	2,0
CAS Girona	2.308,4	5,2	335,0	5,5	0	0	0	0	1.253,4	7,6
CAS Garrotxa Olot	235,2	0,5	12,2	0,2	0	0	16,8	3,0	86,7	0,5
CAS Font Santa	550,6	1,2	28,8	0,5	29,5	3,5	4,3	0,8	659,3	4,0

Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2007)

60

CENTRE D'ATENCIÓ SEGUIMENT	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
CAS Seu d'Urgell	30,3	0,1	0	0	0	0	0	0	29,6	0,2
CAS Nou Barris	2.152,2	4,8	1.177,3	19,3	89,5	10,7	28,8	5,1	58,9	0,4
CAS Mollet	455,6	1,0	0	0	0	0	0	0	93,2	0,6
CAS Prat de Llobregat	314,3	0,7	0	0	0	0	0	0	202,4	1,2
CAS Pallars - H. del Pallars	10,1	0,0	0	0	1,2	0,1	5,1	0,9	24,0	0,1
CAS Borges Blanques	25,7	0,1	0	0	0	0	2,1	0,4	4,6	0,0
CAS Balaguer	37,5	0,1	0	0	0	0	3,3	0,6	78,2	0,5
CAS Tàrraga	41,8	0,1	0	0	0	0	3,5	0,6	83,6	0,5
Hospital Vielha	3,3	0,0	0	0	0	0	2,3	0,4	1,2	0,0
Casa Bloc Generalitat	242,2	0,5	309,1	5,1	44,9	5,3	1,3	0,2	1.032,9	6,3
Creu Roja Barcelona	942,8	2,1	0	0	0	0	0	0	146,8	0,9
Sant Pau Barcelona	362,9	0,8	54,4	0,9	11,6	1,4	0	0	1.070,6	6,5
Unitat Alcoholologia H.Clínica	399,3	0,9	127,1	2,1	0	0	0	0	0	0
Fundació Mensalus	184,8	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Sta. Rosa Sta.Coloma	111,8	0,3	110,5	1,8	17,9	2,1	4,7	0,8	0	0
CAS Olesa Montserrat	135,9	0,3	0	0	0	0	22,9	4,0	7,7	0,0
Ferran Salsas Rubí	470,6	1,1	0	0	0	0	0,1	0,0	81,8	0,5
CAP Badia Barberà Vallès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UAT Calella	1.055,3	2,4	21,6	0,4	0	0	0	0	25,9	0,2
CAS Igualada	139,5	0,3	17,3	0,3	6,2	0,7	7,5	1,3	84,3	0,5

Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2007)

61

CENTRE D'ATENCIÓ SEGUIMENT	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
CAS Figueres	542,9	1,2	42,5	0,7	2,0	0,2	0	0	405,2	2,5
CAS Palafrugell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAS Blanes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAS Ripoll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disp. Alcoholisme Puigcerdà	39,3	0,1	0	0	0	0	0	0	57,7	0,4
CAS Mútua Terrassa	398,0	0,9	69,7	1,1	11,0	1,3	0	0	466,3	2,8
CAS Premià de Mar	124,0	0,3	1,3	0,0	0	0	0,6	0,1	59,3	0,4
CECAS	677,8	1,5	628,6	10,3	125,4	14,9	21,5	3,8	609,2	3,7
Càritas Solsona	55,7	0,1	0,7	0,0	8,5	1,0	2,1	0,4	80,6	0,5
CAS La Mina S. Adrià del B.	213,5	0,5	1,8	0,0	0	0	0	0	56,7	0,3
CAS Horta - Guinardó	2.783,5	6,2	0	0	0	0	34,0	6,0	146,3	0,9
CAS Cerdanyola - Ripollet	197,5	0,4	0	0	0	0	1,3	0,2	40,2	0,2
CAS Vilanova i la Geltrú	234,8	0,5	0	0	78,7	9,4	5,3	0,9	231,4	1,4
CAS Vilafranca del Penedès	183,7	0,4	0	0	50,8	6,0	8,2	1,4	103,2	0,6
CAS Mollerussa	26,2	0,1	0	0	0	0	2,0	0,4	2,7	0,0
CAS Esplugues	61,3	0,1	71,2	1,2	45,9	5,5	2,7	0,5	0	0
Unitat de Tabaquisme Mollet	64,5	0,1	25,2	0,4	0,6	0,1	10,9	1,9	50,5	0,3
CAS Vall d'Hebron	1.850,2	4,2	0	0	0	0	1,4	0,2	156,5	1,0
CAS Cerdanyola-Canaletes	290,7	0,7	0	0	0	0	2,9	0,5	261,9	1,6
CAS Sant Boi	331,2	0,7	18,1	0,3	0	0	2,8	0,5	249,5	1,5

Activitat notificada per cada centre d'atenció i seguiment (gener - desembre 2007)

62

CENTRE D'ATENCIÓ SEGUIMENT	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
CAS Sant Cugat	137,0	0,3	0,4	0,0	0	0	0	0	36,5	0,2
CAS Martorell	251,2	0,6	12,1	0,2	0	0	41,1	7,3	14,3	0,1
TOTAL	534.894	100	73.043	100	10.082	100	6.799	100	196.950	100

FONT	<i>Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.</i>
NOTA	<i>Els totals representen el nombre total de visites o altres activitats realitzades durant 2007.</i>

Activitat mensual mitjana dels centres de la regió (gener - desembre 2007)

63

REGIÓ SANITÀRIA	ACTIVITAT MENSUAL MITJANA									
	Visites Individuals		Pacients en Grups		Familiars en Grups		Desintoxicacions		Det. droga en orina	
	m	%	m	%	m	%	m	%	m	%
Lleida	108,9	0,2	18,9	0,3	7,3	0,9	3,3	0,6	96,2	0,6
Tarragona	804,1	1,8	61,1	1,0	0	0	3,9	0,7	188,7	1,1
Terres de Ebre	333,2	0,7	67,8	1,1	20,5	2,4	2,7	0,5	321,4	2,0
Girona	1.028,8	2,3	129,9	2,1	0,7	0,1	5,6	1,0	581,8	3,5
Central	251,1	0,6	24,5	0,4	6,9	0,8	6,6	1,2	769,6	4,7
Metropolitana	987,1	2,2	137,4	2,3	19,2	2,3	12,5	2,2	252,4	1,5
Alt Pirineu Vall Aran	20,8	0,0	0	0	0,3	0,0	1,8	0,3	28,1	0,2
TOTAL	534.894	100	73.043	100	10.082	100	6.799	100	196.950	100

FONT	Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.
NOTA	Els totals representen el nombre total de visites o altres activitats realitzades durant 2007.

Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2007)

64

CENTRE PRESCRIPTOR	TOTAL	
	N	%
CAS Sants Barcelona	195	3,5
CAS Garbivent Barcelona	227	4,1
CAS Sarrià Barcelona	143	2,6
CAS Barceloneta Barcelona	51	0,9
SPOTT Barcelona	14	0,3
DELTA Badalona	163	2,9
SAD L'Hospitalet Llobregat	68	1,2
CAS Sant Feliu Llobregat	34	0,6
CAS Sabadell	149	2,7
CAS Granollers	38	0,7
CAS Mataró	65	1,2
CADO Vic	28	0,5
CAS Bages	31	0,6
CAS Joan XXIII Tarragona	152	2,7
Hospital Sant Joan Reus	240	4,3
CAS Tortosa Hospital Santa Creu	72	1,3
Hospital de Santa Maria Lleida	104	1,9
CAS Girona	246	4,4
CAS Garrotxa Olot	6	0,1
CAS Fontsa	32	0,6
CAS Seu d'Urgell	1	0,0
CAS Nou Barris Barcelona	132	2,4

Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2007)

CENTRE PRESCRIPTOR	TOTAL	
	N	%
CAS Prat de Llobregat	129	2,3
CAS Pallars - Hospital del Pallars	1	0,0
CAS Borges Blanques	2	0,0
CAS Balaguer	9	0,2
CAS Tàrraga	0	0
Hospital Vielha	0	0
Casa Bloc Barcelona	1	0,0
Creu Roja Barcelona	492	8,9
St. Pau Barcelona	71	1,3
CAS Olesa Montserrat	5	0,1
Ferran Salsas Rubí	126	2,3
UAT Calella	50	0,9
CAS Igualada	35	0,6
CAS Figueres	196	3,5
CAS Palafrugell	0	0
CAS Blanes	52	0,9
Dispensador d'Alcoholisme Puigcerdà	0	0
CAS Mútua Terrassa	105	1,9
CAS Premià de Mar	2	0,0
Cáritas Solsona	1	0,0
Font Picant	0	0
CAS La Mina Sant Adrià del Besòs	80	1,4

Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2007)

66

CENTRE PRESCRIPTOR	TOTAL	
	N	%
CAS Cerdanyola - Ripollet	16	0,3
CAS Vilanova i la Geltrú	32	0,6
CAS Vilafranca del Penedès	34	0,6
CAS Mollerussa	2	0,0
CAS Mollet	152	2,7
CAS Cerdanyola - Canaletes	11	0,2
Hospital Comarcal Sant Bernabé-Bergà	0	0
CAS Vall d'Hebron	162	2,9
CAS Sant Boi	62	1,1
CAS Sant Cugat	10	0,2
CAS Martorell	21	0,4
CAS Brians	90	1,6
CAP Roses	0	0,0
CECAS	0	0,0
DAE Quatre Camins	2	0,0
CP Dones Barcelona	26	0,5
CP Figueres	31	0,6
CP Girona	94	1,7
CP Homes Barcelona	886	16,0
CP Joves Barcelona	3	0,1

Inclusions en PMM per centre prescriptor (gener - desembre 2007)

67

CENTRE PRESCRIPTOR	TOTAL	
	N	%
CP Ponent	76	1,4
CP Quatre Camins	169	3,0
CP Tarragona	36	0,6
Centre Pilot Dispensació Externa a Presons	44	0,8
Fora Catalunya Justícia	2	0,0
Fora Catalunya PMM	37	0,7
TOTAL	5.546	100

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d' inclusió del PMM trameses pels Centres Dispensadors.

Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2007)

EDAT	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
15 - 19 anys	21	0,4	9	1,1	30	0,5
20 - 24 anys	253	5,4	75	8,9	328	5,9
25 - 29 anys	733	15,6	150	17,9	883	15,9
30 - 34 anys	1092	23,2	164	19,5	1256	22,6
35 - 39 anys	1175	25,0	180	21,4	1355	24,4
40 - 44 anys	891	18,9	163	19,4	1054	19,0
45 - 49 anys	338	7,2	79	9,4	417	7,5
50 - 54 anys	136	2,9	13	1,5	149	2,7
55 anys o més	67	1,4	7	0,8	74	1,3
TOTAL	4.706	84,9	840	15,1	5.546	100


FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d' inclusió del PMM trameses pels Centres Dispensadors.

Inclusions en PMM per grups d'edat i sexe (gener - desembre 2007)

Edat

55 anys o més
50-54 anys
45-49 anys
40-44 anys
35-39 anys
30-34 anys
25-29 anys
20-24 anys
15-19 anys



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d' inclusió del PMM trameses pels Centres Dispensadors.

Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2007)

CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius 2006 (b ₁)	Casos Actius 2007 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Centre Dispensador Metadona Generalitat Barcelona	40	133	118	53	39,80	85,03
CAS Sants Barcelona	126	319	302	140	52,90	64,83
CAS Garbivent Barcelona	161	305	300	126	36,23	63,91
CAS Sarrià Barcelona	84	242	225	101	52,10	52,90
CAS Barceloneta Barcelona	49	159	143	38	46,88	78,08
SPOTT Barcelona	22	143	122	54	42,37	87,13
DELTA Badalona	134	164	187	127	32,36	53,25
SAD L'Hospitalet - Barcelona	22	97	97	28	43,05	76,01
CAS Sant Feliu de Llobregat	29	80	65	50	31,74	59,37
CAS Sabadell	73	83	90	65	49,23	61,97
CAS Granollers	35	115	111	22	38,06	69,33
CAS Mataró	58	112	110	77	37,20	63,84
CADO Vic	28	99	82	43	35,12	54,33
CAS Bages	31	84	84	26	40,76	62,18
Hospital Joan XXIII Tarragona	182	278	306	210	23,66	48,42
Hospital Sant Joan Reus	179	198	194	154	22,08	51,55
CAS Tortosa Hospital Santa Creu	68	216	218	67	36,25	58,44
Hospital de Santa Maria Lleida	76	285	291	136	31,64	47,96
CAS Girona	163	0	286	176	20,16	54,91
CAS Font Santa	22	38	41	29	29,94	49,34
CAS Seu d'Urgell	0	32	24	7	23,94	38,71
CAS Nou Barris Barcelona	115	0	0	0	43,93	0,00
CAS Prat de Llobregat	128	101	99	125	29,40	57,63
CAS Pallars - Hospital del Pallars	0	22	0	0	30,47	0,00
CAS Balaguer	1	28	27	19	16,58	45,33
CAS Tàrrrega	0	34	28	10	14,18	47,96
Hospital Vielha	0	0	0	0	00,00	0,00

Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2007)

CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius 2006 (b ₁)	Casos Actius 2007 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Creu Roja Barcelona	346	162	169	318	23,36	63,89
Sant Pau Barcelona	76	129	130	69	42,34	65,24
CAS Olesa de Montserrat	4	20	20	7	31,79	58,90
Ferran Salsas Rubí	126	40	47	148	10,35	52,53
UAT Calella	50	160	155	58	45,36	59,86
CAS Igualada	27	43	59	27	26,18	67,97
Dispensari Alcoholisme Puigcerdà	0	9	8	3	32,34	33,63
CAS Mútua Terrassa	82	149	157	88	35,61	62,08
CAS Premià de Mar	2	11	10	4	18,79	70,50
Font Picant	0	0	0	0	14,75	0,00
CAS La Mina Sant Adrià del Besòs	62	160	151	76	49,67	52,07
CAS Vilanova i la Geltrú	32	101	98	30	17,16	92,09
CAS Vilafranca del Penedès	34	85	75	45	42,64	78,05
CAS Cerdanyola - Canaletes	11	26	27	10	19,02	46,22
Fundació Salut Empordà	196	123	110	196	31,78	52,95
CAS Selva Marítima	41	68	92	75	26,26	64,09
Hospital de Palamós	75	94	110	99	33,38	71,39
Unitat Mòbil de dispensació Barcelona	104	239	236	89	68,43	66,78
Hospital St. Jaume Olot	1	27	21	23	49,72	76,14
Hospital Sta. Caterina Girona	0	257	262	107	18,01	54,74
Hospital de Campdevàrol	0	10	9	10	33,83	34,78
Unitat Mòbil de dispensació Badalona	2	227	179	47	51,13	69,22
U. Metadona Hospital Parc Taulí	82	214	221	88	34,43	66,67
Hospital Prínceps d'Espanya U. D. Metadona	39	176	172	44	52,94	79,80
CAP Vila-roja	0	0	0	0	0,00	0,00
CAS Palafrugell	0	0	0	0	0,00	0,00

Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2007)

CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius 2006 (b ₁)	Casos Actius 2007 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Hospital Comarcal Sant Bernabé - Berga	0	11	10	6	47,97	68,50
Hospital Comarcal Mora Ebre	0	0	0	0	0,00	0,00
CAP Montcada	0	12	0	5	24,80	0,00
Centre Güell	0	0	0	0	11,00	0,00
CAS Mollet	151	68	74	182	3,58	69,35
Centre Sanitari Solsonès	1	11	13	5	29,50	71,92
CAP Arbúcies	0	0	0	0	0,00	0,00
CAS Vall d'Hebron	121	60	88	82	8,88	52,64
CAS Sant Boi	62	22	61	26	7,62	65,07
CAS Sant Cugat	10	11	15	9	9,23	56,13
CAS Martorell	18	54	62	31	36,86	60,15
CECAS	0	0	0	0	0,00	0,00
CAP La Selva	0	0	0	0	0,00	0,00
ABS Canet de Mar	0	0	0	0	0,00	0,00
CAP Banyoles	0	0	0	0	0,00	0,00
CAP Breda	0	0	0	0	0,00	0,00
CAP Cassà	0	0	0	0	0,00	0,00
Comunitat Terapèutica Rural Can Serra	0	0	0	0	0,00	0,00
CAS Brians	151	256	99	198	13,62	0,00
DAE Quatre Camins	23	0	0	1	0,00	0,00
CP Dones Barcelona	35	15	17	77	19,59	60,12
CP Figueres	27	5	9	10	16,86	55,78

Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada centre dispensador (gener - desembre 2007)

CENTRE DISPENSADOR	Inclusions (a)	Casos Actius 2006 (b ₁)	Casos Actius 2007 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
CP Girona	61	9	4	70	7,74	55,00
CP Homes Barcelona	927	228	195	757	10,94	57,11
CO Homes Barcelona	0	0	0	0	0,00	0,00
CP Joves Barcelona	4	1	2	8	35,14	27,50
CP Ponent	171	142	137	162	12,79	45,04
CP Quatre Camins	296	0	246	296	7,75	43,28
CP Tarragona	2	24	0	71	11,18	0,00
Centre Pilot Dispensació Externa a Presons	45	2	6	39	11,03	36,67
Oficines de Farmàcia Barcelona	114	570	588	106	30,26	59,03
Oficines de Farmàcia Tarragona	87	241	250	49	21,34	51,16
Oficines de Farmàcia LLeida	6	68	54	11	25,12	166,09
Oficines de Farmàcia Girona	11	57	52	14	17,76	47,37
Fora Catalunya Justícia	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL	5.546	7.768	8.050	5.759	30,17	60,82

FONT	Notificacions d'inclusions en PMM i notificacions d'activitat mensual del PMM trameses pels Centres Dispensadors.
NOTA	(a) Nombre d'inclusions en PMM de 2007. (b ₁) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2006. (b ₂) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2007. (c) Nombre d'altes de PMM de 2007. (d) Temps (en mesos) transcorregut entre l'última inclusió i l'última alta dels usuaris, o, en absència d'alta -pacients actius-, l'últim dia del període analitzat (enguany el 31-12-2007). Les interrupcions de tractament de menys de 2 mesos no es consideren, i per tant el temps en programa en aquests casos és la suma de dos episodis "inclusió-alta". El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996-2007.


Nombre d'inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM per Regió Sanitària del centre (gener - desembre 2007)

REGIÓ SANITÀRIA	Inclusions (a)	Casos Actius 2006 (b ₁)	Casos Actius 2007 (b ₂)	Altes (c)	Temps en Programa (d)	Dosi Mitjana
Lleida	114	548	535	337	28,14	58,91
Tarragona	510	622	725	479	36,68	50,15
Terres de Ebre	93	201	243	72	53,11	57,57
Girona	617	679	955	780	42,42	57,3
Central	170	269	302	123	55,46	63,41
Metropolitana	3.983	5.952	5.256	3.957	48,83	63,26
Alt Pirineu Vall Aran	10	63	34	11	29,62	39,44
TOTAL	5.546	8.334	8.050	5.759	46,66	60,82

FONT	Notificacions d'inclusions en PMM i notificacions d'activitat mensual del PMM trameses pels Centres Dispensadors.
NOTA	<p>(a) Nombre d'inclusions en PMM de 2007.</p> <p>(b₁) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2006. (b₂) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2007.</p> <p>(c) Nombre d'altes de PMM de 2007.</p> <p>(d) Temps (en mesos) transcorregut entre l'última inclusió i l'última alta dels usuaris, o, en absència d'alta -pacients actius-, l'últim dia del període analitzat (enguany el 31-12-2007). Les interrupcions de tractament de menys de 2 mesos no es consideren, i per tant el temps en programa en aquests casos és la suma de dos episodis "inclusió-alta". El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996-2007.</p>

Temps en programa dels usuaris en PMM (anys 1996 - 2007)

74



FONT	Notificacions d'activitat mensual del PMM trameses pels Centres Dispensadors.
NOTA	El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996 - 2007.

Nombre d'Inclusions, casos actius, altes, retenció i dosi mitjana dels usuaris en PMM de cada tipologia de centre (gener - desembre 2007)

		Inclusions (a)	Actius (b)	Altes (c)	Temps en programa (d)	Dosi (e)
Centres d'Atenció i Seguiment	N	3.131	4.838	3.207	51,69	60,21
	%	56,5	60,1	55,7		
Centres Dispensadors de Metadona	N	581	1.553	848	62,19	67,03
	%	10,5	19,3	14,7		
Unitat de Tractament Penitenciari	N	1.616	715	1.524	16,31	49,35
	%	29,1	8,9	26,5		
Oficines de Farmàcia	N	218	944	180	42,37	62,42
	%	3,9	11,7	3,1		
TOTAL	N	5.546	8.050	5.759	46,66	60,82
	%	100	100	100		

FONT	Notificacions d'inclusions en PMM i notificacions d'activitat mensual del PMM trameses pels Centres Dispensadors.
NOTA	(a) Nombre d'inclusions en PMM de 2007. (b) Nombre de casos actius en PMM a 31 de desembre 2007. (c) Nombre d'altes de PMM de 2007. (d) Temps (en mesos) transcorregut entre l'última inclusió i l'última alta dels usuaris, o, en absència d'alta -pacients actius-, l'últim dia del període analitzat (enguany el 31-12-2007). Les interrupcions de tractament de menys de 2 mesos no es consideren, i per tant el temps en programa en aquests casos és la suma de dos episodis "inclusió-alta". El temps en programa s'ha calculat amb aquells usuaris que començaren a prendre metadona els anys 1996-2007. (e) Mitjana de l'última dosi de metadona en mg dels casos actius en PMM a 31 de desembre de 2007.

Motiu principal que ocasiona les inclusions en PMM als centres de la XAD (gener - desembre 2007)

MOTIU	N	%	% sense considerar els trasllats
Petició pròpia	1.562	28,2	54,1
Gestació	4	0,1	0,1
Recaiguda	562	10,1	19,5
HIV negatiu	23	0,4	0,8
Destintoxicació	261	4,7	9,0
Pendent destintoxicació	3	0,1	0,1
Patologia psiquiàtrica	6	0,1	0,2
Fracàs altres tractaments	109	2,0	3,8
SIDA	3	0,1	0,1
Tuberculosi	4	0,1	0,1
Altres patologies orgàniques	8	0,1	0,3
Altres motius	341	6,1	11,8
Trasllat	2.660	48,0	
TOTAL	5.546		

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual del PMM trameses pels Centres Dispensadors.

**Motius que ocasionen les altes de PMM als centres de la XAD
(gener - desembre 2007)**

MOTIU	N	%	% sense considerar els trasllats
Desintoxicació	330	5,7	10,9
Hospitalització	134	2,3	4,4
Presó	293	5,1	9,7
Abandonament	1.495	26,0	49,3
Éxitus	113	2,0	3,7
Alta programada	391	6,8	12,9
A petició pròpia	152	2,6	5,0
Expulsió	52	0,9	1,7
Altres	121	2,1	4,0
Trasllat	2.678	46,5	
Total	5.759		

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d'activitat mensual del PMM trameses pels Centres Dispensadors.


Sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació per trimestre i unitat sol·licitada (gener - desembre 2007)

UHD	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospital St. Pau Barcelona	5	2,1	5	2,4	3	2,1	6	3,6	19	2,5
Hospital del Mar Barcelona	50	20,7	64	30,3	34	23,3	30	18,0	178	23,3
Prínc. d'Espanya L'Hospitalet. Ll.	27	11,2	12	5,7	12	8,2	11	6,6	62	8,1
Germans Trias Badalona	3	1,2	1	0,5	5	3,4	6	3,6	15	2,0
Hospital Mútua Terrassa	33	13,7	38	18,0	10	6,8	26	15,6	107	14,0
Hospital Sabadell	35	14,5	38	18,0	31	21,2	36	21,6	140	18,3
Hospital Joan XXIII Tarragona	23	9,5	22	10,4	16	11,0	17	10,2	78	10,2
Hospital Santa Maria Lleida	12	5,0	4	1,9	1	0,7	2	1,2	19	2,5
Hospital Sta. Caterina Girona	37	15,4	18	8,5	19	13,0	13	7,8	87	11,4
Hospital Vall d'Hebrón Barcelona	9	3,7	2	0,9	10	6,8	8	4,8	29	3,8
Hospital Clínic Barcelona	7	2,9	7	3,3	5	3,4	12	7,2	31	4,1
TOTAL	241	31,5	211	27,6	146	19,1	167	21,8	765	100

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.

Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2007)

**FONT**

Subdirecció General de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Unitats Hospitalàries de Desintoxicació trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Estades mitjanes i altes a les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2007)

UHD	ESTADA MITJANA (Dies)	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^t TRIM.		TOTAL	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospital St. Pau Barcelona	12,76	59	18,6	69	19,4	37	16,2	54	19,2	219	18,5
Hospital del Mar Barcelona	13,24	30	9,5	37	10,4	34	14,8	34	12,1	135	11,4
Prínc. d'Espanya L'Hospitalet. LL.	9,45	26	8,2	29	8,1	21	9,2	34	12,1	110	9,3
Germans Trias Badalona	9,24	18	5,7	17	4,8	0	0	14	5,0	49	4,1
Hospital Mútua Terrassa	6,05	63	19,9	67	18,8	34	14,8	51	18,1	215	18,2
Hospital Sabadell	12,75	22	6,9	25	7,0	23	10,0	1	0,4	71	6,0
Hospital Santa Maria Lleida	6,93	5	1,6	4	1,1	4	1,7	1	0,4	14	1,2
Hospital Sta. Caterina Girona	11,43	27	8,5	27	7,6	15	6,6	27	9,6	96	8,1
Hospital Vall d'Hebrón Barcelona	10,36	23	7,3	28	7,9	24	10,5	24	8,5	99	8,4
Hospital Clínic Barcelona	7,54	44	13,9	53	14,9	37	16,2	41	14,6	175	14,8
TOTAL	9,99	317	26,8	356	30,1	229	19,4	281	23,8	1.183	100

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Estada mitjana i notificacions d'alta trameses per les UHD.

Motius que ocasionen les altes de les unitats hospitalàries de desintoxicació (gener - desembre 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d'alta trameses per les UHD.

Altes a les UHD per droga principal (gener - desembre 2007)

79

DROGA PRINCIPAL		N	%
Opiacis	Opiacis sense especificar	9	0,8
	Metadona, Metasedin, Sedo Rapide	84	7,1
	Heroïna	119	10,1
	Codeïna	4	0,3
	Opiacis sintètics	2	0,2
Estimulants	Estimulants sense especificar	2	0,2
	Cocaïna	309	26,1
	Amfetamines	1	0,1
	Estimulants del sistema nerviós central no classificats	3	0,3
Hipnòtics i sedants	Hipnòtics i sedants sense especificar	7	0,6
	Benzodiazepines	32	2,7
	Altres ansiolítics o tranquilitzants menors no barbitúrics ni benzodiazepines	1	0,1
Inhalants volàtils	Inhalants volàtils sense especificar	2	0,2
Cànnabis		14	1,2
Alcohol		593	50,1
Altres substàncies psicoactives		1	0,1
TOTAL		1.183	100,0

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions d'altres trameses per les UHD i les CT.


Sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques per trimestre i comunitat sol·licitada (gener - desembre 2007)

COMUNITAT TERAPÈUTICA	1 ^{er} TRIM.		2 ^{on} TRIM.		3 ^{er} TRIM.		4 ^{rt} TRIM.		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Associació ATRHA	15	9,4	16	11,8	10	12,0	8	7,0	49	9,9
Assoc. Ajuda als Toxicomans	2	1,3	0	0	2	2,4	2	1,8	6	1,2
OBINSO	0	0	3	2,2	2	2,4	5	4,4	10	2,0
Fundació MERCÈ FONTANILLES	1	0,6	2	1,5	3	3,6	3	2,6	9	1,8
CAN SERRA	15	9,4	17	12,5	2	2,4	7	6,1	41	8,3
Associació EGUEIRO	18	11,3	13	9,6	12	14,5	15	13,2	58	11,8
Associació ALDEBARAN	20	12,5	13	9,6	12	14,5	14	12,3	59	12,0
U. Acollida i O. CAN PUIG	69	43,1	50	36,8	32	38,6	54	47,4	205	41,6
Can Solà de la Vall	11	6,9	11	8,1	1	1,2	2	1,8	25	5,1
Fundació FONT PICANT	9	5,6	11	8,1	7	8,4	4	3,5	31	6,3
TOTAL	160	32,5	136	27,6	83	16,8	114	23,1	493	100

FONT


Subdirecció General de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment. ICASS. Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Motius que ocasionen les sol·licituds d'ingrés a les comunitats terapèutiques (gener - desembre 2007)

**FONT**

Subdirecció General de Drogodependències. Sol·licituds d'ingrés a Comunitats Terapèutiques trameses pels Centres d'Atenció i Seguiment.


Percentatge de les xeringues distribuïdes segons l'agent de distribució (gener - desembre 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències.

Evolució anual del total de xeringues distribuïdes (anys 1993 - 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències.

Activitat dels recursos socio sanitàris d'atenció urgent (any 2007)

RECURSOS SOCIO SANITÀRIS D'ATENCIÓ URGENT	Visites	Usuaris	Usuaris nous 2007	Xeringues distribuïdes	% xeringues retornades	Preservatius distribuïts
Centre Alba.Terrassa	3.544	761	63	-	-	680
Centre Obert. Lleida	2.645	458	64	2.534	57,77	2.024
Centre Arrels. Lleida	1.863	141	52	3.958	53,18	1.441
Centre Baluard. Barcelona	195.024	5.459	-	139.851	65,04	16.944
Centre Àmbit Prevenció. Barcelona	45.955	1.840	-	19.422	29,74	5.144
Centre SAPS. Barcelona	34.939	2.346	-	53.254	41,32	21.692
CAS Vall d'Hebron. Barcelona	3.709	196	-	3.587	50,12	609
Centre "El Local". Sant Adrià	8.456	941	455	26.069	30,05	1.278
Bus Creu Roja. Constantí	4.712	122	43	9.097	78,42	151
Bus Zona Franca. Barcelona	14.786	1.219	-	37.930	69,28	251
Unitat Mòbil Àmbit Prevenció. Gavà	3.329	538	242	45.387	69,76	-
Unitat Mòbil Àmbit Prevenció. El Prat de Llobregat	2.170	285	143	40.245	52,86	-
Equip de Carrer Asaupa'm. Badalona	2.488	112	12	19.287	36,63	954
Equip de Carrer AEC-Gris.L'Hospitalet de Llobregat	943	38	1	1.728	29,74	823
Equip de Carrer Asaupa'm. Santa Coloma	177	170	-	1.751	54,48	-

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions dels Recursos Socio sanitàris.


Vacunacions realitzades als centres socio sanitàris d'atenció urgent (any 2007)

VACUNACIONS (NOMBRE DE DOSIS ADMINISTRADES)	Antigripal	Hepatitis A+B	Tètan	Anti-neumocòcica
Centre Alba. Terrassa	-	1	-	-
Centre Curt. El Prat de Llobregat	-	-	-	-
Centre Obert. Lleida	60	91	93	33
Centre Arrels. Lleida	-	-	-	-
Centre Baluard. Barcelona	75	123	77	-
Centre Àmbit Prevenció. Barcelona	26	4	-	-
Centre SAPS. Barcelona	29	13	5	-
CAS Vall d'Hebron. Barcelona	165	35	17	-
Centre "El Local". Sant Adrià	-	-	-	-

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Notificacions dels Recursos Socio sanitàris.


Consultes telefòniques al servei Línia Verda (anys 1993 - 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. ICASS. Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Perfil de les persones que realitzen la consulta al servei Línia Verda (any 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències. ICASS. Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Droga principal que motiva la consulta al servei Línia Verda (any 2007)


84

	Informació telefónica	Entrevista personal
Heroïna	4,99%	2,20%
Alcohol	21,89%	17,03%
Cocaïna	27,87%	23,63%
Cànnabis	13,89%	31,32%
Tabac	0,60%	1,10%
Extasi líquid	0,14%	0,00%
Drogues de disseny	0,94%	2,20%
Amfetamines	0,74%	0,00%
Ketamina	0,20%	0,55%
Psicofàrmacs	1,42%	1,10%
Altres	2,30%	3,85%
Sense especificar	25,04%	17,03%

FONT

Subdirecció General de Drogodependències.

Derivacions a d'altres serveis del servei Línia Verda (any 2007)



FONT

Subdirecció General de Drogodependències.

Distribució dels casos per grup de transmissió i sexe en adults (>=13 anys) (01/01/1981 - 31/12/2007)

GRUP DE TRANSMISSIÓ	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
UDVP	6.793	53,7	1.705	57,1	8.498	54,4
UDVP Homo o bisexual	213	1,7	1	0,0	214	1,4
Homo o bisexual	3.052	24,1	0	0	3.052	19,5
Heterosexual	1.741	13,8	1.081	36,2	2.822	18,1
Post-transfusional	30	0,2	23	0,8	53	0,3
Productes sanguinis	92	0,7	4	0,1	96	0,6
Fills de mares a risc	0	0	3	0,1	3	0,0
Altres*	17	0,1	4	0,1	21	0,1
Risc no qualificat	701	5,5	163	5,5	864	5,5
TOTAL	12.639	80,9	2.984	19,1	15.623	100

FONT	CEESCAT (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament Salut).
NOTES	"UDVP": Usuaris de Drogues per la Via Parenteral. A la categoria "Altres" s'inclouen trasplantaments i plasmafèresi. * Transplantaments, plasmafèresi....

Distribució dels casos i defuncions de sida residents a Catalunya per sexe corresponents a usuaris de drogues per via parenteral (gener 1981 - desembre 2007)

SEXE	CASOS		DEFUNCIONS	
	N	%	N	%
Homes	7.006	80,4	4.673	66,7
Dones	1.706	19,6	1.091	64,0
TOTAL	8.712	100	5.764	66,2

FONT	CEESCAT (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut).
NOTES	Les defuncions inclouen qualsevol causa de mort. El % de defuncions està calculat respecte del nombre de casos registrats.


Distribució dels casos de sida residents a Catalunya per grups d'edat i sexe corresponents a usuaris de drogues per via parental (gener 1981 - desembre 2007)

EDAT	HOMES		DONES		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Menys de 15 anys	0	0	0	0	0	0
15 - 19 anys	33	0,5	6	0,4	39	0,4
20 - 24 anys	538	7,7	183	10,7	721	8,3
25 - 29 anys	1.912	27,3	511	30,0	2.423	27,8
30 - 34 anys	2.435	34,8	590	34,6	3.025	34,7
35 - 39 anys	1.370	19,6	278	16,3	1.648	18,9
40 - 44 anys	524	7,5	105	6,2	629	7,2
45 - 49 anys	151	2,2	29	1,7	180	2,1
50 - 54 anys	29	0,4	3	0,2	32	0,4
55 anys i més	14	0,2	1	0,1	15	0,2
TOTAL	7.006	80,4	1.706	19,6	8.712	100

FONT CEESCAT (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut).

Evolució anual per sexe dels casos diagnosticats de sida en usuaris de drogues per via parental (gener 1981 - desembre 2007)

Nre. casos



FONT Registre de Malalts de sida del Programa per a la Prevenció i el Control de la sida del Departament de Salut.

NOTES Dades actualitzades a 31 de desembre de 2007. A causa del temps transcorregut entre el diagnòstic i la notificació, les dades corresponents al darrer període són incompletes.

Dispensació dels psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, en nombre d'envasos (gener - desembre 2007)

PRINCIPI ACTIU (DCI)	NOMBRE D'ENVASOS
Amfetamina sulfat	0
Buprenorfina, CIH	2.933
Clometiazole	200.828
Clorazepat dipotàssic	45.245
Dextropropoxifè, CIH	15.059
Flunitrazepam	86.011
Metilfenidat	104.490
Naltrexona, CIH	11.276
Triazolam	10.870

FONT	Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); Àrea Sanitària (ÀS); Servei Català de la Salut (SCS).
NOTA	Les dades de consum s'agrupen per a cada principi actiu i es refereixen a atenció primària. S'han considerat totes les especialitats farmacèutiques registrades i les diverses presentacions comercials de cada especialitat, excepte per al clorazepat dipotàssic, en què aquestes dades només es refereixen al consum de les especialitats amb 20 mg o més de principi actiu.

Dispensació dels psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d'un possible ús desviat, expressat en mg i en DHD (gener - desembre 2007)

PRINCIPI ACTIU (DCI)	mg	DHD
Amfetamina sulfat	0	0,000000
Buprenorfina, CIH	10.940	0,003410
Clometiazole	1.156.769.280	0,288477
Clorazepat dipotàssic	45.052.710	0,842649
Dextropropoxifè, CIH	22.588.500	0,042249
Flunitrazepam	1.718.444	0,642823
Metilfenidat	59.306.400	0,739497
Naltrexona, CIH	14.272.300	0,106778
Triazolam	40.763	0,060993

FONT	Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); Àrea Sanitària (ÀS); Servei Català de la Salut (SCS).
NOTA	Consum obtingut a partir de les dades de facturació al Servei Català de la Salut dels diversos principis actius objecte d'estudi. L'expressió de les dades s'ha fet en mg de principi actiu i en DHD; aquesta última mesura permet establir comparacions entre fàrmacs de diferent unitat i de dosificació i presentació.

**Relació d'especialitats farmacèutiques per cada principi actiu
(gener - desembre 2007)**

PRINCIPI ACTIU	DDD (dosi diària definida)	ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES
Buprenorfina, CIH	1,2 mg (P, SL)	Buprex 0,2 mg 20 compr. Buprex 0,3 mg 6 ampr.
Clometiazole	1500 mg (O, P)	Distraneurine 192 mg 30 càps.
Clorazepat dipotàssic	20 mg (O)	Tranxilium 50 mg 20 compr. Tranxilium 20 mg 1 vial Tranxilium 50 mg 1 vial
Dextropropoxifè, CIH	200 mg (O)	Deprancol 150 mg 10 càps.
Flunitrazepam	1 mg (O,P)	Rohipnol 1 mg 20 compr. Rohipnol 2 mg 2 amp. 1 ml
Metilfenidat	30 mg (O)	Rubifen 20 mg 30 compr. Rubifen 10 mg 30 compr. Concerta 18 mg 30 compr. Concerta 54 mg 30 compr. Mediklnet 10 mg 30 càps.* Mediklnet 20 mg 30 càps.* Mediklnet 30 mg 30 càps.* Mediklnet 40 mg 30 càps.*
Naltrexona, CIH	50 mg (O)	Antaxone 25 mg 14 càps. Antaxone 50 mg 14 càps. Antaxone 50 mg 14 amp. v. oral Antaxone 50 mg 28 càps. Celupan 50 mg 14 compr. Celupan 50 mg 28 compr. Revia 50 mg 14 compr. Revia 50 mg 28 compr.
Triazolam	0,25 mg (O)	Halcion 0,125 mg 30 compr.

FONT	Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries (DAFPC); Àrea Sanitària (ÀS); Servei Català de la Salut (SCS).
NOTA	El consum d'aquestes especialitats farmacèutiques permet calcular el consum de psicofàrmacs en nombre d'envasos. * Especialitat d'alta des del juliol 2007

Evolució de la prevalença de consum de drogues entre la població escolar de 14-18 anys (%). Catalunya, 1994-2006

	DROGA	ANY						
		1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Alguna vegada a la vida	Tabac	67,0	68,7	67,1	67,1	63,1	65,2	53,2
	Alcohol	86,2	83,6	83,4	76,7	71,1	77,1	82,9
	Cànnabis	26,8	33,7	33,4	37,6	42,3	47,2	46,2
	Èxtasi / Drogues Síntesi	4,4	8,4	5,0	6,2	5,5	4,7	3,8
	Cocaïna	2,4	4,5	6,8	6,0	6,7	8,7	6,9
	Al·lucinògens	6,3	9,5	5,1	4,6	3,7	5,5	5,5
	Amfetamines / Speed	5,0	7,5	5,9	3,0	3,8	4,4	3,6
	Inhalants	3,2	5,3	5,0	4,5	3,8	4,2	4,0
	Heroïna	0,3	0,4	0,7	0,3	0,4	0,6	1,1
	Tranquil·lizants (Sense prescripció mèdica)	6,8	6,5	7,4	7,4	7,3	7,4	10,0

Alguna vegada en els darrers 12 mesos	Tabac*	**	**	**	**	**	**	40
	Alcohol	85,4	81,8	79,9	76,0	70,2	76,8	79,4
	Cànnabis	23,8	31,0	29,6	32,3	37,4	41,8	39,3
	Èxtasi / Drogues Síntesi	4,1	6,7	3,7	5,1	4,0	2,2	2,9
	Cocaïna	1,4	3,9	5,9	4,2	5,0	6,8	4,7
	Al·lucinògens	5,6	7,6	3,7	3,6	2,8	3,7	3,8
	Amfetamines / Speed	4,1	6,2	4,0	2,3	2,7	3,2	2,9
	Inhalants	2,1	3,6	2,7	2,9	2,8	2,8	2,4
	Heroïna	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,5	0,9
	Tranquil·lizants (Sense prescripció mèdica)	4,5	4,9	5,3	5,3	5,1	5,2	6,4

Alguna vegada en els darrers 30 dies	Tabac	31,0	34,8	32,6	34,1	29,5	31,3	30,9
	Alcohol	78,3	64,7	61,0	59,5	49,2	60,6	62,2
	Cànnabis	17,1	21,5	22,1	22,3	26,8	30,4	25,5
	Èxtasi / Drogues Síntesi	2,6	3,8	2,3	2,5	1,3	1,1	1,6
	Cocaïna	0,8	1,9	3,5	2,0	2,7	3,4	2,6
	Al·lucinògens	3,2	3,6	2,0	1,6	1,2	2,0	2,2
	Amfetamines / Speed	2,7	3,5	2,1	1,1	1,5	1,8	1,6
	Inhalants	1,1	1,9	1,7	2,0	1,2	1,4	1,3
	Heroïna	0,2	0,3	0,2	0,05	0,1	0,5	0,8
	Tranquil·lizants (Sense prescripció mèdica)	2,8	2,7	2,6	2,4	2,6	2,7	3,5

FONT Subdirecció General de Drogodependències. Anàlisi de l'Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari. Observatorio Español Sobre Drogas (DGPNSD).

NOTA (*) Pel que fa a la prevalença del consum de tabac, l'enquesta es centra exclusivament en l'ús d'alguna vegada a la vida i alguna vegada en els darrers 30 dies fins l'any 2006.

Edat mitjana d'inici en el consum de substàncies psicoactives entre els estudiants d'educació secundària de 14-18 anys, segons el sexe. Catalunya 2006

	Homes	Dones	Total
Tabac	13,1	13,1	13,1
Tabac (consum diari)	14,4	14,2	14,3
Alcohol	13,7	13,9	13,8
Alcohol (consum setmanal)	15,2	14,9	15,1
Hipnosedants*	13,5	14,4	14,1
Cànnabis	14,4	14,4	14,4
Cocaïna	15,5	15,3	15,4
Heroïna	14,6	15,3	14,9
Amfetamines	15,6	15,2	15,4
Al·lucinògens	15,4	15,8	15,6
Inhalants	13,3	12,7	13,1
Èxtasi	15,7	15,5	15,6

* Hipnosedants: tranquil·litzants o hipnòtics sense recepta mèdica.

Ús d'altres substàncies en els 12 mesos previs entre persones que declaren haver utilitzat les substàncies indicades a l'encapçalament de cada columna en el mateix període. Catalunya 2006

	Tabac	Alcohol	Hipnosedants*	Cànnabis	Èxtasi	Cocaïna	Heroïna
Tabac	-	48,0	55,4	76,5	83,0	78,6	67,5
Alcohol	95,3	-	85,9	97,9	94,0	98,4	87,1
Hipnosedants*	8,9	7,0	-	9,3	31,1	23,5	38,2
Cànnabis	75,0	48,4	56,8	-	93,8	90,9	95,1
Èxtasi	5,8	3,3	13,6	6,7	-	48,8	87,1
Cocaïna	9,3	5,9	17,2	11,0	82,4	-	90,2
Heroïna	1,6	1,0	5,4	2,3	28,9	17,7	-

* Hipnosedants: tranquil·litzants o hipnòtics sense recepta mèdica.


Risc percebut associat al consum de substàncies psicoactives entre els estudiants d'educació secundària de 14-18 anys, segons el sexe. Catalunya 2006

Percentatge que pensa que aquesta conducta pot causar bastants o molts problemes			
	Homes	Dones	Total
Fumar un paquet de tabac diari	76,2	86,8	81,7
Prendre 5 o 6 canyes/copes els caps de setmana	44,9	56,6	51,0
Prendre una o dues canyes/copes cada dia	53,7	67,4	60,9
Consumir cànnabis habitualment	74,0	84,6	79,6
Consumir hipnosedants* habitualment	67,9	76,5	72,5
Consumir èxtasi almenys una vegada per setmana	79,2	89,7	84,8
Consumir cocaïna almenys una vegada per setmana	78,3	89,1	84,1
Consumir heroïna almenys una vegada per setmana	79,3	90,1	85,0

* Hipnosedants: tranquil·litzants o hipnòtics sense recepta mèdica

FONT

Subdirecció General de Drogodependències. Anàlisi de l'Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari. Observatorio Español Sobre Drogas (DGPNSD).



Distribució de la població general per grups d'edat i regió sanitària (any 2007)

92

EDAT	REGIÓ SANITÀRIA								
	Lleida	Tarragona	Terres de l'Ebre	Girona	Alt Pirineu Vall d'Aran	Central	Metropolitana	TOTAL	
Menys de 15 anys	N	48.066	89.719	24.104	104.984	9.587	73.648	696.807	1.046.915
	%	14,10%	15,59%	13,21%	15,17%	12,97%	15,04%	14,35%	14,52%
De 15 a 19 anys	N	16.242	28.602	8.702	34.029	3.179	23.225	221.309	335.288
	%	4,77%	4,97%	4,77%	4,92%	4,30%	4,74%	4,56%	4,65%
De 20 a 24 anys	N	20.623	35.933	11.581	42.168	4.359	28.205	286.777	429.646
	%	6,05%	6,25%	6,35%	6,09%	5,90%	5,76%	5,90%	5,96%
De 25 a 29 anys	N	28.536	50.833	15.394	59.118	6.027	40.399	413.590	613.897
	%	8,37%	8,84%	8,44%	8,54%	8,15%	8,25%	8,52%	8,51%
De 30 a 34 anys	N	30.355	54.951	15.149	63.103	6.667	43.240	468.292	681.757
	%	8,91%	9,55%	8,30%	9,12%	9,02%	8,83%	9,64%	9,46%
De 35 a 39 anys	N	27.979	49.598	14.262	58.669	6.242	39.320	422.467	618.537
	%	8,21%	8,62%	7,82%	8,48%	8,45%	8,03%	8,70%	8,58%
De 40 a 44 anys	N	27.042	45.562	13.366	55.669	6.126	37.847	381.565	567.177
	%	7,93%	7,92%	7,33%	8,05%	8,29%	7,73%	7,86%	7,87%
De 45 a 49 anys	N	24.432	40.893	12.478	50.366	5.838	35.911	339.223	509.141
	%	7,17%	7,11%	6,84%	7,28%	7,90%	7,34%	6,98%	7,06%
De 50 a 54 anys	N	20.360	35.612	10.912	43.270	4.820	30.788	299.809	445.571
	%	5,97%	6,19%	5,98%	6,25%	6,52%	6,29%	6,17%	6,18%
De 55 a 59 anys	N	18.175	32.315	10.494	38.394	4.036	27.273	283.521	414.208
	%	5,33%	5,62%	5,75%	5,55%	5,46%	5,57%	5,84%	5,74%
60 anys o més	N	79.017	111.315	46.020	142.112	17.025	109.663	1.043.219	1.548.371
	%	23,18%	19,35%	25,22%	20,54%	23,04%	22,40%	21,48%	21,47%
TOTAL	N	340.827	575.333	182.462	691.882	73.906	489.519	4.856.579	7.210.508
	%	4,73%	7,98%	2,53%	9,60%	1,02%	6,79%	67,35%	100%

FONT Web de l'IDESCAT (Institut Català d'Estadística)

NOTA "Padró continu del 2007"



Núm. d'història clínica

Núm. d'identificació del centre

Notificació d'inici de tractament ambulatori per a drogodependències

Dues primeres lletres dels dos cognoms (encercleu les que corresponguin)

Primera lletra del primer cognom Segona lletra del primer cognom
 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Primera lletra del segon cognom Segona lletra del segon cognom
 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Data de naixement Província de naixement* (si va néixer a l'estranger, escriviu el nom del país)

Nacionalitat** Sexe

 1. Home 2. Dona

Municipi de residència Data d'inici del tractament en el centre

Nivell d'instrucció

1. No sap llegir o escriure.	6. Altres titulacions per a les quals es requereix el graduat escolar, ESO o equivalents.
2. Estudis primaris incomplets, 5 primers cursos d'EGB o d'educació primària.	7. Títol universitari de grau mitjà, 3 cursos aprovats d'una llicenciatura, cicles formatius de grau superior.
3. Estudis primaris, certificat d'escolaritat o d'educació primària.	8. Títol universitari de grau superior.
4. Batxillerat elemental, graduat escolar o ESO.	Altres titulacions superiors per a les quals es requereixi batxillerat.
5. Batxillerat superior, BUP, COU, batxillerat, formació professional 1r o 2n grau, cicles formatius de grau mitjà o equivalents.	9. superior, BUP o batxillerat.
	99. Desconegut.

Situació laboral principal en el moment de començar el tractament

2. Amb relació laboral, contracte indefinit o treballador per compte propi.	7. Incapacitat permanent, pensionista.
3. Amb contracte o relació temporal.	8. Estudiant o opositant.
4. Treballant sense sou per la família.	9. Relitzant exclusivament feines de la llar.
5. Parat, no havent treballat abans.	77. En una altra situació. Especifiqueu-la.
6. Parat, havent treballat abans.	99. Desconeguda

Procedència del pacient

1. Iniciativa pròpia.	5. Hospitals i altres serveis sanitaris.
2. Familiars o amics.	6. Serveis socials.
3. Centres de tractament de les drogodependències.	7. Serveis legals o policials.
4. Medicina general o atenció primària de salut.	77. Altres. Especifiqueu-los.
	99. Desconegut.

Convivència en els 30 dies anteriors a l'inici del tractament Residència en els 30 dies previs a l'inici del tractament

1. Sol.	5. Amb la parella i els seus fills.	1. Cases, pisos, apartaments.	4. Pensions, hotels, hostals.
2. Sol amb els seus fills.	6. Amb amics.	2. Presó, centre de menors.	5. allotjament inestable.
3. Amb els pares.	7. Altres. Especifiqueu-ho.	3. Altres institucions.	6. Altres.
4. Només amb la parella.			

Droga principal per la qual és admès a tractament**

Any del primer consum de la droga principal Realització prèvia d'algun tractament per la droga principal

Freqüència de consum de la droga principal (darrers 30 dies de consum) Via més freqüent d'administració (darrers 30 dies de consum)

1. Tots els dies.	5. Menys d'un dia a la setmana.	1. Oral.	4. Injectada.
2. Quatre a sis dies a la setmana.	6. No en consumeix.	2. Pulmonar (inclou <i>Chinos</i> i fumada).	5. Altres. Especifiqueu-la.
3. Dos o tres dies a la setmana.	9. Desconegut.	3. Intranassal (<i>esnifada</i>).	9. Desconeguda.
4. Un dia a la setmana.			

Altres drogues consumides en els 30 dies anteriors al tractament**

1.
 2.
 3.
 4.

Temps transcorregut des que es va injectar per darrera vegada qualsevol substància psicoactiva

1. Menys d'una setmana.	4. Menys d'un any.	7. De cinc a nou anys.	99. Desconegut
2. Menys d'un mes.	5. D'un a dos anys.	8. Deu o més anys.	
3. Menys de sis mesos.	6. De tres a quatre anys.	9. No s'ha injectat mai.	

Estat serològic objectiu enfront de l'HIV

1. Positiu.	5. Amb anàlisi realitzada però pendent del resultat.
2. Negatiu amb anàlisi en els últims 6 mesos.	6. No s'ha realitzat anàlisi.
3. Negatiu sense anàlisi en els últims 6 mesos.	9. Desconegut
4. Negatiu sense saber la data de les anàlisis.	

* Codis al dors ** Escriviu-ne el nom sense codificar



NOTIFICACIÓ D'INCLUSIÓ EN TRACTAMENT AMB AGONISTES OPIACIS

B5.1

INFORMACIÓ A FACILITAR PEL CENTRE PRESCRIPTOR

Usuari (Nom i Cognoms):

Núm. de DNI o Passaport

Data de Naixement

Codi Província de Naixement

Sexe

1. Home

2. Dona

Municipi de residència **Codi municipal:**

Nom del Municipi:

Motiu principal de la inclusió (senyalar només un)

- | | |
|---|---|
| 1. Gestació. | 8. Desintoxicació. |
| 2. SIDA. | 9. Trasllet des d'un altre centre. |
| 3. Tuberculosi. | 10. Reaiguda (ja havia estat en el programa). |
| 4. Altra patologia orgànica. | 11. HIV negatiu (per evitar seroconversió) |
| 5. Patologia psiquiàtrica diferent de la drogodependència. | 12. Pendent de desintoxicació hospitalària |
| 6. A petició del pacient sense que hi hagi contraindicació. | 13. Altres motius (especificar) |
| 7. Fracàs d'altres tractaments. | |

Centre que Prescriu **Codi del Centre:**

Nom del Centre:

Data de Derivació al Centre Dispensador

Nom del metge responsable

Número de col·legiat **Signatura**

INFORMACIÓ A FACILITAR PEL CENTRE DISPENSADOR

Data d'inclusió

Centre Dispensador **Codi del Centre:**

Nom del Centre:

Substància (si és metadona, podeu deixar el camp en blanc)

Nom i Signatura del responsable del programa de dispensació

VEGEU INDICACIONS AL DORS

Informació confidencial d'ús restringit sanitari

Butlleta de Notificació de la Llista Mensual d'Usuaris en Tractament amb Agonistes Opiacis



LLISTA MENSUAL D'USUARIS EN TRACTAMENT AMB AGONISTES OPIACIS B5.2

Centre dispensador Codi del centre:

Nom del Centre:

Mes i any de notificació:

Nombre final d'usuaris (mes actual) Nombre final d'usuaris (mes anterior)

Nombre de nous usuaris (mes actual) Nombre d'exclusions (mes actual)

DNI de l'usuari	SUBSTÀNCIA (si és metadona, deixeu en blanc)	DOSI (en mg)	DATA DE FINALITZACIÓ DEL TRACTAMENT	MOTIU (codis al dors)
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 01
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 02
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 03
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 04
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 05
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 06
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 07
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 08
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 09
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 10
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 11
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 12
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 13
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 14
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 15
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 16
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 17
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 18
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 19
<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 20

Nom i signatura del responsable del programa de dispensació

VEGEU INDICACIONS AL DORS



SOL·LICITUD D'INGRÉS A CT O A UHD

B4.1

Data de Derivació

Centre Sol·licitador Codi:

Nom del Centre:

Centre Sol·licitat Codi:

Nom del Centre:

Usuari (Nom i Cognoms):

Data de Naixement

Codi Província de Naixement

Sexe 1. Home 2. Dona

Municipi de residència Codi:

Nom:

Motiu de la derivació a CT	Motiu de la derivació a UHD
1. Sí; 2. No; 9. Desconegut.	1. Sí; 2. No; 9. Desconegut.
Fracàs tractaments ambulatoris <input type="checkbox"/>	Fracàs repetit de la desintoxicació ambulatoria <input type="checkbox"/>
Manca de suport familiar <input type="checkbox"/>	Manca de suport familiar <input type="checkbox"/>
Desestructuració social <input type="checkbox"/>	Embaràs <input type="checkbox"/>
Altres: <input type="checkbox"/>	Inducció Naltrexona <input type="checkbox"/>
Especifiqueu <input type="text"/>	Altres <input type="checkbox"/>
	Especifiqueu <input type="text"/>

Història Toxicològica (drogues) (1)		Edat d'inici (2)	Consum/darrer dia mes (3)	Freq. Consum (4)	Via (5)	Edat 1 ^a Trac. (2)	N. de tract. amb o sense fàrmac	N. desintoxi. en UHD	Nombre d'ingressos en CT	Abstinència màxima en mesos
D1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- (1) Escriviu-ne el nom.
- (2) En anys complets. Si la resposta és desconeguda, cal codificar "99".
- (3) Les unitats s'han d'especificar en mg. per opiàcis, cocaïna i diazepòxids; i en grams per alcohol i cannabis; i en grams per alcohol i tabac.
- (4) Freqüència: {1=mensual; 2=quinzenal; 3=setmanal; 4=més de 2 cops/set.; 5=menys de 3 cops/dia; 6=3 o més cops/dia.
- (5) Via d'Administració Actual: 1=oral; 2=fumada; 3=inhàlada; 4=Snifada; 5=Injeccada; 7=Altres; 9=Desconeguda.

Antecedents de Malalties Orgàniques

<p>Tuberculosi</p> <p>PPD en mm <input type="text"/></p> <p>Ha estat derivat a un centre específic de tuberculosi? 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut <input type="checkbox"/></p> <p>Hepatitis</p> <p>Ag Hbs 1. Positiu; 2. Negatiu; 9. Desconegut <input type="checkbox"/></p> <p>Anti Hbc 1. Positiu; 2. Negatiu; 9. Desconegut <input type="checkbox"/></p> <p>Altres patol. orgàniques <input type="text"/></p>	<p>Té criteris de MTS? 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut. <input type="checkbox"/></p> <p>Ha estat derivat a un centre específic de MTS? 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut. <input type="checkbox"/></p> <p>SIDA</p> <p>Anti HIV 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut <input type="checkbox"/></p> <p>Segueix controls en algun servei de medicina interna? 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut <input type="checkbox"/></p> <p>Servei <input type="text"/></p>
---	---

Antecedents Psicopatològics

<p>Té antecedents Psicopat? (En cas afirmatiu, especifiqueu) 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut</p> <p>Trastorns esquizofrènics 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut</p> <p>Altres Trastorns Psicòtics 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut</p>	<p>Transtorns Depressius 1.Sí. 2. No. 9. Desconegut.</p> <p>Intents d'autolesió 1.Sí. 2. No. 9. Desconegut.</p> <p>Altres 1. Sí; 2. No; (En cas afirmatiu, especifiqueu)</p>
---	---

Antecedents familiars i socials

<p>Hi ha algun familiar o altres persones de referència? 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut. (En cas afirmatiu, especifiqueu)</p> <p>Té algun familiar drogodepenent ? 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut. (En cas afirmatiu, especifiqueu)</p>	<p>Té antecedents legals? 1. Sí; 2. No; 9. Desconegut.</p> <p>Nombre d'ingressos a la presó</p> <p>N. mesos de condemna complerta</p> <p>Nombre de judicis pendents</p>
---	---

Observacions:

NOM I SIGNATURA DEL TERAPEUTA SOL·LICITANT

ESPAI RESERVAT A LA COMUNITAT TERAPÈUTICA EN CAS D'ADMISSIÓ DEL PACIENT

Data d'ingrés

Aportació econòmica del pacient (quantitat en ptes.):

Aportacions institucionals:

Institució: (quantitat en ptes.)

Institució: (quantitat en ptes.)

CONFORMITAT DEL PROGRAMA SOCIAL DE DROGODEPENDÈNCIES DE L'ICASS

ESPAI RESERVAT A LA UNITAT HOSPITALÀRIA DE DESINTOXICACIÓ EN CAS D'ADMISSIÓ DEL PACIENT

Data d'ingrés

NOM I SIGNATURA DEL DIRECTOR DE LA UNITAT HOSPITALÀRIA DE DESINTOXICACIÓ



NOTIFICACIÓ D'ALTA D'UNITATS HOSPITALÀRIES DE DESINTOXICACIÓ

B4.3

Codi de l'hospital al qual pertany l'UHD

Nom de l'hospital

Codi del centre que ha derivat el pacient

Nom del centre que ha derivat el pacient

Pacient (Nom i Cognoms) :

Data de Naixement

Codi Província de Naixement

Sexe 1. Home 2. Dona

Municipi de residència Codi:

Nom del municipi:

Drogues que han motivat l'ingrés. Escriviu el nom.

1.
2.
3.

Data de sol·licitud de l'ingrés

Nombre de dies que el pacient ha estat en llista d'espera

Data d'ingrés

Data d'alta

Motiu d'alta

1. Final desintoxicació	5. Trasllet per complicacions orgàniques	<input type="checkbox"/>
2. Alta voluntària	6. Trasllet per complicacions psíquiques	
3. Alta forçada	7. Trasllet per complicacions legals	
4. Fuga	8. Altres	

Tuberculosi
PPD en mm

Prescripció de tractament o quimioprofilaxi 1. Si; 2. No; 9. Desconegut

Hepatitis
Ag Hbs 1. Positiu; 2. Negatiu; 9. Desconegut

Anti Hbc 1. Positiu; 2. Negatiu; 9. Desconegut

SIDA
Anti HIV 1. Si; 2. No; 9. Desconegut

Segueix controls en algun servei de Med. Interna? 1. Si; 2. No; 9. Desconegut

Diagnosi mèdica de sortida

NOM I SIGNATURA DEL METGE RESPONSABLE DE LA UNITAT HOSPITALÀRIA DE DESINTOXICACIÓ

L'informe anual de 2007 recull informació de les fonts i dels períodes que es detallen tot seguit. S'hi presenten els apartats següents:

- **Perfil dels usuaris que inicien tractament a la XAD.** S'hi presenten les dades de les característiques generals dels inicis de tractament de l'any 2007 notificats pels centres d'atenció i seguiment.

- **Activitat per regió sanitària de residència.** S'hi presenten les dades corresponents a l'any 2007 de: inicis de tractament, sol·licituds d'ingrés a UHD i CT i incursions en PMM per regió sanitària de residència. Aquesta informació és facilitada pels centres d'atenció i seguiment i els centres dispensadors de metadona.

- **Activitat per comarca de residència.** S'hi presenten les dades corresponents a l'any 2007 d'inicis de tractament per comarca de residència. Aquesta informació és facilitada pels centres d'atenció i seguiment.

- **Activitat dels centres d'atenció i seguiment.** S'hi presenten les dades corresponents a l'any 2007 de: inicis de tractament, sol·licituds d'ingrés a UHD i CT, visites individuals, visites a pacients en grups, visites a familiars en grups, desintoxicacions i determinacions de droga en orina realitzades pels centres d'atenció i seguiment, a més de l'evolució anual dels inicis de tractament.

- **Activitat del programa de manteniment en metadona.** Inclou informació del programa de l'any 2007, a més de l'evolució mensual de la sèrie. Aquestes dades les notifiquen els centres

prescriptors i dispensadors de metadona. S'inclou també el càlcul del temps en programa dels usuaris que començaren a prendre metadona durant els anys 1996-2007.

- **Activitat de les unitats hospitalàries de desintoxicació.** Inclou informació de l'any 2007 de les sol·licituds d'ingrés a les diferents unitats, del nombre d'altres i de l'estada mitjana a aquestes unitats. Aquesta informació la notifiquen els centres d'atenció i seguiment i les unitats hospitalàries de desintoxicació.

Inclou també informació de l'any 2007 de les sol·licituds d'ingrés a les diferents comunitats. Aquesta informació és facilitada pels centres d'atenció i seguiment.

- **Programa d'intercanvi de xeringues.** S'hi presenten les dades facilitades per la Subdirecció General de Drogodependències des de l'any 1993 fins al 2007 segons l'agent de distribució i l'activitat dels centres socio-sanitaris d'atenció urgent.

- **Línia verda d'informació i orientació sobre l'alcoholisme i les altres drogodependències.** Dades facilitades per la Subdirecció General de Drogodependències i el ICASS. Departament d'Acció Social i Ciutadania, des de l'any 1993 fins al 2007. Es presenta el perfil de les persones que realitzen la consulta, la droga principal que motiva la consulta i les derivacions a d'altres serveis.

- **Morbiditat i mortalitat associada.** Aquesta informació procedeix de dos orígens diferents:

- Mortalitat per reaccions adverses relacionades amb el consum d'opiacis. Aquestes dades són facilitades pel Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del Departament de Salut. Aquest any no apareixen les dades.

- La sèrie estadística fins al 31 de desembre de 2007, corresponent als malalts de sida residents a Catalunya, que ens és facilitada pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut (CEESCAT). La informació que presentem es centra en els malalts que són usuaris de drogues per via parenteral.

- **Consum d'estupefaents i de psicòtrops.** Reprodueix les dades facilitades per la Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, corresponents a l'any 2007 i referides al consum en nombre d'envasos, en mg i en DHD i les DDD de cada principi actiu.

- **Enquestes PNSD.** La Subdirecció General de Drogodependències presenta les dades per Catalunya, de l'anàlisi de les enquestes bianuals sobre consum de drogues del Observatorio Español sobre drogues: "Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari" des de l'any 1994 fins a l'any 2004 i "Enquesta Domiciliària d'alcohol i drogues" des de l'any 1997 fins a l'any 2005.

- **Enquesta inicis heroïna i cocaïna XAD.** La Subdirecció General de Drogodependències presenta el perfil dels usuaris de la XAD a Catalunya de "l'enquesta a

consumidors d'heroïna i cocaïna en tractament" del Observatorio Español sobre drogues realitzada durant els anys 2003 i 2004

- **Recursos assistencials.** S'hi presenta un mapa comarcal amb la distribució dels recursos assistencials a 31 de desembre de 2007.

- **Distribució de la població.** Es recull la distribució de la població per grups d'edat i regió sanitària l'any 2007 (dades més actualitzades) per tal de tenir un referent respecte a les dades publicades per grups d'edat i per regió sanitària.

- **Recollida de la informació.** Es mostren les butlletes de notificació que omplen els centres per tal de fer possible l'elaboració d'aquest informe.

Agraïm la col·laboració de:

- Tots els centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.
- Registre de Mortalitat del Servei d'Informació i Estudis del Departament de Salut.
- Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida de Catalunya del Departament de Salut (CEESCAT).
- Divisió d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries del Servei Català de la Salut.
- Sistema d'Informació de l'Institut de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de Barcelona.
- ICASS. Departament d'Acció Social i Ciutadania.
- Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil; Departament de Justícia.

**GENERALITAT DE CATALUNYA**

Departament de Salut

Direcció General de Salut Pública

Subdirecció General de Drogodependències

Informe Anual de 2007: Setembre de 2008



www.gencat.net/salut

Edita: Direcció General de Salut Pública
Subdirecció General de Drogodependències
Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona