

1984-2012

Registro de trasplante cardíaco de Cataluña

Informe estadístico



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



OCATT
Organització Catalana
de Trasplantaments

Registro de trasplante cardíaco de Cataluña

Informe estadístico 1984-2012

Comisión Asesora del Registro de trasplante cardíaco de Cataluña

Dr. Fèlix Pérez Villa (Hospital Clínic i Provincial de Barcelona)
Dr. Josep Maria Padró (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)
Dr. Nicolás Manito (Hospital Universitari de Bellvitge)
Dr. Jaume Casaldàliga (Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d'Hebron)
Sra. Nuria Trota (Organització Catalana de Trasplantaments. Servei Català de la Salut)
Dr. Pere Àngel Montserrat (Organització Catalana de Trasplantaments. Servei Català de la Salut)

Centros notificadores

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d'Hebron

Responsable del registro: Organització Catalana de Trasplantaments

Gestor del registro: Comisión Asesora del Registro de trasplante cardíaco de Cataluña

Recogida e introducción de la información: Dra. Eulàlia Roig, Dra. Sònia Mirabet, Dr. Vicens Brossa, *Hospital de la Santa Creu i Sant Pau*; Dr. José Gonzalez Costello, Dr. Josep Roca Elies, *Hospital Universitari de Bellvitge*; Dra. Montse Cardona, Dr. Fèlix Pérez Villa, *Hospital Clínic i Provincial de Barcelona*; Dra. Dimpna C. Albert, Dr. Ferran Gran, *Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d'Hebron*; Sra. Nuria Trota, Sr. Pedro López, *Organització Catalana de Trasplantaments*.

Proceso de los datos y elaboración del informe: Nuria Trota

© Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Edición: Servei Català de la Salut
Organització Catalana de Trasplantaments

Barcelona, noviembre de 2013

Agradecimientos

La Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), responsable del Registro de trasplante cardíaco de Cataluña, quiere agradecer a todo el personal de los centros autorizados para efectuar trasplantes cardíacos su contribución al mantenimiento del registro con la notificación de los datos y la participación en la elaboración del informe a través de sus aportaciones.

Dr. Pere Àngel Montserrat
Directora de la OCATT

Para correspondencia, dirigirse a:

Nuria Trota
Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT)
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Pg. Taulat 106-116
08005 Barcelona

Correo electrónico: ntrota@catsalut.cat

<http://www.trasplantaments.gencat.cat>

Índice

Introducción.....	9
Aspectos metodológicos	10
Evolución del trasplante cardíaco.....	11
Características del receptor.....	13
Características del donante.....	20
Características del trasplante	22
Retrasplantes	24
Supervivencia.....	26
Mortalidad	29
Lista de espera.....	35
Trasplante cardíaco en niños	38

Introducción

En el año 1984 se realizó en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el primer trasplante cardíaco de Cataluña, que también fue el primero practicado con éxito del Estado español. Unos años después, en 1991, el Hospital Universitari de Bellvitge inició la actividad en este campo y en el año 1998 lo hizo el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Posteriormente, en el año 2006, se autorizó al Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d'Hebron para la práctica de trasplantes cardíacos y cardiopulmonares en pacientes hasta la adolescencia.

El Registro de trasplante cardíaco se puso en funcionamiento en el año 1993 y contiene los datos de los trasplantes efectuados en Cataluña desde el año 1984. Los datos de los trasplantes practicados durante el periodo 1984-1993 se recogieron de forma retrospectiva, pero desde el año 1994 el Registro los obtiene de forma periódica y sistemática.

De acuerdo con sus objetivos, el registro es responsabilidad de la OCATT y la gestión de los datos de una comisión asesora del mismo que da respuesta a los requerimientos de información del Servicio Catalán de la Salud y del Departamento de Salud para la planificación, la gestión de recursos y la compra de servicios. El registro también es una fuente de información accesible para usuarios externos, como los profesionales que trabajan en el ámbito de la asistencia, y da respuesta a las demandas que se efectúan desde otros sectores. En todos los casos, el tratamiento y el acceso a los datos están sometidos a la normativa vigente por lo que respecta a protección de datos de carácter personal.

El principal objetivo del presente documento es dar a conocer la actividad y características de los trasplantes cardíacos realizados en Cataluña en el año 2012, así como la evolución de los que se han efectuado desde 1984, tanto a los profesionales directamente implicados en este tratamiento como a los de la Administración sanitaria.

Aspectos metodológicos

En este informe se describe la evolución del trasplante cardíaco en Cataluña y se analizan las características de los receptores, los donantes y los trasplantes, así como los resultados obtenidos.

Para el cálculo de la supervivencia del paciente (tiempo hasta el fallecimiento) se ha utilizado el método Kaplan-Meier, evaluándose el nivel de significación estadística entre las diferentes curvas con el test Log-rank. Las curvas de supervivencia se han interrumpido cuando el número de casos ha sido inferior a 10.

La probabilidad de recibir un trasplante se ha calculado considerando un modelo de riesgos competitivos con tres acontecimientos de interés: trasplante, muerte y salida de la lista.

Descripción de los indicadores:

Tasa de trasplante anual

Número total de trasplantes cardíacos efectuados durante el año en los centros autorizados, independientemente del lugar de residencia del receptor, con relación a la población de Cataluña (padrón de habitantes de 1991, 1996 y, a partir de 1997, las actualizaciones anuales del padrón. Instituto Nacional de Estadística). Se expresa por millón de población (pmp).

Tasa de mortalidad a los 30 días

Porcentaje de muertes ocurridas en los 30 días posteriores al trasplante en la población de pacientes que han recibido un trasplante cardíaco.

Evolución del trasplante cardíaco

En el periodo 1984-2012 en Cataluña se han efectuado 1.090 trasplantes cardíacos; 1.070 primeros trasplantes y 20 retrasplantes. Estos trasplantes se han practicado a 1.071 pacientes, dado que un paciente recibió el primer trasplante fuera de Cataluña.


El 1,4% (15) de los trasplantes realizados han sido combinados con otro órgano (tabla 1).

Tabla 1. Número de trasplantes simultáneos realizados. 1984-2012

	Año inicio actividad	n
Corazón – páncreas	1988	1
Corazón – riñón	1999	10
Corazón – pulmón	2006	1
Corazón – hígado	2008	3
Total trasplantes simultáneos		15

La evolución anual del número de trasplantes cardíacos ha ido variando a lo largo de los años y muestra una tendencia creciente a partir de los años 1992 y 1997 (fechas que coinciden con el inicio de la actividad en nuevos centros) y hasta el 2000. A partir de entonces se han producido varias oscilaciones; en el último año se ha hecho 52 trasplantes, 2 menos que el año anterior (figura 1).


Figura 1. Evolución anual del número de trasplantes y de la tasa anual de trasplante cardíaco. 1984-2012



Debido a los cambios de tendencia, la tasa anual de trasplante cardíaco también resulta afectada y muestra una clara tendencia creciente en el periodo 1992-2000, y decreciente a partir de entonces. En el año 2012, la tasa de trasplante es de 6.9 por millón de población (figura 1).

La tasa anual de trasplante cardíaco varía considerablemente entre países y Cataluña se sitúa entre los que presentan una actividad más alta (figura 2). Sin embargo, hay que interpretar estos datos con cautela teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen en la actividad de trasplante en cada país (sistema sanitario, criterios de indicación, estructura de la población, etcétera).

Figura 2. Tasa de trasplante cardíaco en diferentes países. 2012




Características del receptor

◆ Sexo y edad

De los 1.070 pacientes trasplantados –primeros trasplantes– en el periodo 1984-2012, 840 (78,5%) son hombres y 230 (21,5%) mujeres. En el año 2012, 38 (74,5%) pacientes han sido hombres y 13 (25,5%) mujeres.

La media de edad de los pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco en el periodo 1984-2012 es de 51 años (52 para los hombres y 48 para las mujeres), la mediana de 54 años y el rango de tres meses a 71 años (figura 3).

Figura 3. Número de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por grupos de edad y sexo. 1984-2012



A lo largo de los años, la media de edad ha ido aumentando y ha pasado de los 48 años de 1997 a los 54 del año 2012 (figura 4). Tres de los pacientes trasplantados en el 2012 han sido niños menores de 16 años, si sólo se tienen en cuenta los trasplantes realizados a pacientes de 16 años o más, la media de edad del año 2012 aumenta hasta los 57 años.

El incremento en la media de la edad observado a lo largo de los años se debe principalmente al aumento progresivo de trasplantes a pacientes de 50 años o más. En el año 2012, el 33,3% (17) de los pacientes que han recibido un primer trasplante tienen entre 50-60 años y el 39,2% (20) son mayores de 60 años, porcentajes que eran del 33,3% (15) y el 20,0% (9) en el año 1997 (figura 5).

Globalmente, el 65,4% de todos los pacientes trasplantados tiene 50 años o más en el momento del primer trasplante cardíaco y, de hecho, el 52,5% de todos los pacientes son hombres de 50 años o más.

Figura 4. Evolución anual de la media de edad de los pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco. 1992-2012





Figura 5. Evolución anual del porcentaje de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por grupo de edad. 1992-2012



◆ **Residencia**


El 91,4% (n = 979) de los pacientes trasplantados son residentes en Cataluña, el 8,3% (n = 89) en el resto de España y el 0,3% (n = 3) extranjeros. Básicamente, los no residentes en Cataluña son de las comunidades autónomas de las islas Baleares (n = 51) y Aragón (n = 14).

◆ **Indicaciones**

Las indicaciones del trasplante cardíaco se reúnen en cuatro grupos: cardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular y otras, que comprende la cardiopatía restrictiva, la congénita y la hipertrófica.

La cardiopatía dilatada y la cardiopatía isquémica son las dos indicaciones más frecuentes y representan el 43,0% y el 38,7%, respectivamente, del total de trasplantes cardíacos practicados en Cataluña desde 1984 (figura 6). En el caso de los hombres, el 45,8% de los pacientes sufren una cardiopatía isquémica y el 40,0% una cardiopatía dilatada. Por lo que respecta a las mujeres, la indicación más frecuente (53,9%) es la cardiopatía dilatada (figura 7).

Figura 6. Porcentaje de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por indicación. 1984-2012



En la tabla 2 se describen las indicaciones incluidas en la categoría "otras indicaciones".

Figura 7. Porcentaje de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por indicación y sexo. 1984-2012




Tabla 2. Indicaciones incluidas en la categoría "otras indicaciones". 1984-2012

	Hombres		Mujeres		Global	
	n	%	n	%	n	%
C. hipertrófica	15	33,3%	19	37,3%	34	35,4%
C. restrictiva	14	31,1%	16	31,4%	30	31,3%
Enfermedad congénita	11	24,4%	12	23,5%	23	24,0%
Displasia arritmogénica VD	4	8,9%	4	7,8%	8	8,3%
Sarcoidosis	1	2,2%	-	-	1	1,0%
Total	45	100%	51	100%	96	100%

En el año 2012, el 35,3% (n = 18) de los pacientes presentan una cardiopatía dilatada, el 35,3% (n = 18) una cardiopatía isquémica, el 7,8% (n = 4) una cardiopatía valvular, y el 21,6% (n = 11) alguna otra indicación (cuatro pacientes con cardiopatía restrictiva, tres con cardiopatía hipertrófica, dos con enfermedad congénita, uno con una displasia arritmogénica de los dos ventrículos y uno con Sarcoidosis).

A lo largo de los años, la enfermedad incidente más frecuente ha ido variando y, si bien en los primeros años la cardiopatía dilatada era la indicación más frecuente, ahora los porcentajes son muy parecidos a los de la cardiopatía isquémica y algún año esta indicación ha sido hasta la más frecuente. De todas formas, y teniendo en cuenta el bajo número de trasplantes que se practican anualmente, es difícil valorar las pequeñas oscilaciones que hay de un año al otro (figuras 8 y 9).

Figura 8. Evolución anual del número de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por indicación. 1992-2012






Figura 9. Evolución anual del porcentaje de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por indicación. 1992-2012




A partir del año 2004, se incorpora al registro una nueva clasificación de las indicaciones de trasplante que permite precisarlas más. Las indicaciones más frecuentes en los años 2004-2012 son la cardiopatía dilatada idiopática, la cardiopatía isquémica y la cardiopatía valvular (figura 10).

Figura 10. Porcentaje de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por indicación. 2004-2012



La cardiopatía dilatada es la indicación más frecuente en los pacientes menores de 50 años. En cambio, en los pacientes de 50 años o más, la proporción de pacientes con cardiopatía isquémica es ligeramente superior a los de cardiopatía dilatada (figura 11).

Figura 11. Porcentaje de pacientes que han recibido un primer trasplante cardíaco, por indicación y grupos de edad. 1984-2012



La media de edad presenta diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,0001$) entre las cuatro indicaciones: los pacientes con cardiopatía isquémica o valvular son mayores que los que presentan una cardiopatía dilatada (tabla 3). Las diferencias también son estadísticamente significativas en los hombres y en las mujeres por separado (tabla 4).

Tabla 3. Media e intervalo de confianza de la edad por indicación. 1984-2012

	n	media	IC 95%	rango
Cardiopatía dilatada	460	49	47,4 – 50,1	1 – 72
Cardiopatía isquémica	414	55	54,1 – 55,6	28 – 72
Cardiopatía valvular	100	54	52,4 – 56,1	17 – 67
Otras cardiopatías	96	40	36,3 – 44,0	0 – 67
Total	1.070	51	50,0 – 51,6	0 – 72

Tabla 4. Media e intervalo de confianza de la edad por indicación y sexo. 1984-2012

		n	media	IC 95%	rango
Cardiopatía dilatada	Hombres	336	49	46,9 – 50,1	1 – 72
	Mujeres	124	49	46,7 – 52,0	1 – 67
Cardiopatía isquémica	Hombres	385	55	54,2 – 55,8	28 – 72
	Mujeres	29	53	50,0 – 55,9	34 – 62
Cardiopatía valvular	Hombres	74	54	51,4 – 55,8	17 – 67
	Mujeres	26	56	52,6 – 59,8	28 – 65
Otras cardiopatías	Hombres	45	42	36,3 – 47,9	1 – 67
	Mujeres	51	38	33,2 – 43,7	0 – 67
Total	Hombres	840	52	50,7 – 52,4	1 – 72
	Mujeres	230	48	46,1 – 50,2	0 – 67

Características del donante


◆ Sexo y edad

En los 977 trasplantes practicados en el periodo 1992-2012, el 69,5% (n = 679) de los donantes son hombres y el 30,5% (n = 298) mujeres. En el año 2012, el 65,4% (n = 34) han sido hombres y el 34,6% (n = 18) mujeres.

Para todo el periodo 1984-2012, la media de edad del donante es de 33 años, la mediana de 31 años y el rango está comprendido entre unos meses y 64 años (en el periodo 1992-2012 la media y la mediana es de 34 años). A lo largo de los años, la media de edad ha ido aumentando y ha pasado de los 25 años del año 1992 a los 40 del año 2012 (figura 12).

Este incremento se produce a expensas de los donantes de edad más avanzada, dado que en el año 2012 el 21,2% de los donantes tenían 50 años o más mientras que en los primeros años este grupo era inexistente.

Figura 12. Evolución de la edad del donante. 1992-2012




◆ Causas de muerte

La causa más frecuente de muerte del donante es el traumatismo craneoencefálico (TCE), que representa el 55,5% (n = 572) de todas las causas, seguido del accidente vascular cerebral (AVC), que supone el 38,2% (n = 416) (en el periodo 1992-2012 estos porcentajes son del 50,7% y el 39,9%, respectivamente).

Paralelamente al aumento de la edad del donante, a lo largo de los años también ha aumentado la proporción de donantes fallecidos debido a un AVC (figura 13). En el año 2012, el 19,2% (n = 10) de los donantes han sido por TCE y el 57,7% (n = 30) por AVC.


Figura 13. Evolución anual del porcentaje de la causa de muerte del donante. 1992-2012



◆ **Procedencia de los órganos**

En el periodo 1984-2012, el 21,2% (n = 231) de los órganos trasplantados proceden del propio hospital donde se efectúa el trasplante, el 44,6% (n = 486) de otros hospitales de Cataluña y el 34,2% (n = 373) de hospitales de fuera de Cataluña. En el año 2012, el 15,4% (n = 8) son del hospital que practica el trasplante, el 46,2% (n = 24) de Cataluña y el 38,5% (n = 20) de fuera de Cataluña (figura 14).

Figura 14. Evolución anual del porcentaje de procedencia del órgano. 1992-2012




Características del trasplante

◆ Urgencia

De los 1.090 trasplantes cardíacos practicados en el período 1984-2012, 242 (22,2%) fueron urgentes.

El 34,6% (18) de los trasplantes del año 2012 han sido urgentes, porcentaje inferior al del año anterior (figura 15).

Figura 15. Evolución anual del porcentaje de trasplantes urgentes. 2000-2012



◆ Tiempo de isquemia

La media del tiempo de isquemia es de 176 minutos. Teniendo en cuenta la procedencia del órgano, las diferencias que se observan son estadísticamente significativas ($p < 0,0001$). Cuando el órgano proviene de un centro de fuera de Cataluña, la media es superior en 72 minutos que cuando el órgano proviene de un hospital de Cataluña (tabla 5).


◆ Inmunosupresores

Los fármacos inmunosupresores utilizados en las seis primeras semanas del trasplante se muestran en la figura 16. La gran mayoría de los pacientes trasplantados efectúan un tratamiento inmunosupresor de inducción, siendo el basiliximab el fármaco más utilizado.

Tabla 5. Tiempo de isquemia, en minutos, según la procedencia del órgano. 1984-2012

	Propio centro (n = 231)	Resto de Cataluña (n = 483)	Fuera de Cataluña (n = 370)	Total (n = 1.084)
Media	132	157	229	176
Mediana	126	150	230	170
Rango	60 – 238	64 – 369	87 – 360	60 – 369
IC 95%	128 – 136	153 – 161	225 – 233	173 – 179

Figura 16. Fármacos inmunosupresores utilizados durante las seis primeras semanas del trasplante cardíaco. 2004-2012



Retrasplantes

Veinte (1,8%) de los 1.090 trasplantes realizados en el periodo 1984-2012 han sido retrasplantes, si bien uno de los pacientes recibió el primer trasplante fuera de Cataluña.

El tiempo transcurrido entre los dos trasplantes oscila entre 1 día y 13 años¹. La media se sitúa en cinco años (y la mediana en seis años). Concretamente, cuatro pacientes (21,1%) recibieron el segundo trasplante antes de la primera semana de haber recibido el primero, tres (15,8%) entre la primera semana y tres meses después del primero y 12 (63,2%) después del primer año.

En las tablas 6 y 7 se muestran las principales características de los retrasplantes.

Tabla 6. Características de los pacientes que han recibido un retrasplante, por periodo de tiempo transcurrido entre los dos trasplantes. 1984-2012

	0 - 3 meses (n = 7)	> 3 meses (n = 12)
Sexo		
Hombre	5 (71,4%)	9 (75,0%)
Mujer	2 (28,6%)	3 (25,0%)
Edad (año)		
Media	44	37
Mediana	42	39,5
Rango	35 – 63	15 – 59
Indicaciones		
Cardiopatía dilatada	2 (28,6%)	9 (75,0%)
Cardiopatía isquémica	3 (42,9%)	3 (25,0%)
Cardiopatía valvular	-	-
Otras	2 (28,6%)	-

De los siete pacientes que han recibido un retrasplante antes de tres meses, a 31 de diciembre de 2012 han fallecido cuatro, dos de ellos por infección. En cuanto a los 12 pacientes retrasplantados a partir del tercer mes, han muerto nueve: dos por enfermedad vascular del injerto, dos por disfunción primaria del injerto, uno por infección y cuatro por otras causas.

¹ Únicamente se tienen en cuenta aquellos pacientes que han recibido el primer trasplante y el retrasplante en Cataluña


Tabla 7. Características de los donantes y de los trasplantes (primer trasplante), por periodo de tiempo transcurrido entre los dos trasplantes. 1984-2012

	0 - 3 meses (n = 7)	> 3 meses (n = 12)
Edad donante (años)		
Media	20	26
Mediana	23	22,5
Rango	11 – 25	14 – 49
Causa muerte donante		
TCE	6 (85,7%)	9 (75,0%)
AVC	-	2 (16,7%)
Otras	1 (14,3%)	1 (8,3%)
Tiempo isquemia (minutos)		
Media	139	168
Mediana	115	148
Rango	82 – 230	95 – 300

Supervivencia

La supervivencia del paciente que ha recibido un primer trasplante cardíaco en Cataluña en el periodo 1984-2012 es del 86% al primer mes y del 77%, el 72% y el 69% al primer, tercer y quinto año, respectivamente (figura 17).

Figura 17. Supervivencia de los pacientes que han recibido un trasplante cardíaco. 1984-2012



Porcentajes de supervivencia muy semejantes a los de los registros español e internacional (tabla 8).

Tabla 8. Supervivencia: Datos comparativos de los registros catalán (RTCC), español (RETC)² e internacional (ISHLT)³. 1984-2012

	RTCC (1984-2012)	RETC (1984-2012)	ISHLT (1982-6/2011)
1º mes	0,86	0,87	0,90
1º año	0,77	0,78	0,81
5º año	0,69	0,67	0,69
10º año	0,56	0,53	0,52
15º año	0,38	0,38	0,35


² González-Vílchez F, et al. Registro Español de Trasplante Cardíaco. XXIV Informe Oficial de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco de la Sociedad Española de Cardiología (1984-2012). Rev Esp Cardiol. 2013.

³ International Society for Heart and Lung Transplantation (disponible en: <http://www.isHLT.org>)

La supervivencia global del paciente en el periodo 1984-2012 está afectada tanto por las características de los trasplantes realizados durante los primeros años (bajo número de casos, periodo de aprendizaje), como por otros factores de los trasplantes practicados en años posteriores (inclusión de pacientes con patologías de peor pronóstico y mayor edad).

El estudio por periodos se ha dividido en cuatro intervalos: 1984-1991, 1992-1996, 1997-2001, 2002-2006 y 2007-2012. Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los cinco periodos ($p = 0,002$), pero no entre los cuatro últimos (figura 18).


Figura 18. Supervivencia de los pacientes que han recibido un trasplante cardíaco, por periodos. 1984-2012



Para tener una visión más actualizada de los resultados, se elaboran las supervivencias con los datos de los trasplantes practicados a partir del año 1997. En el periodo 1997-2012, la supervivencia de los pacientes es del 88% al primer mes y del 80%, el 74%, el 71% y el 57% al primer, tercer, quinto y décimo año, respectivamente.


A largo plazo, las mujeres presentan una supervivencia ligeramente superior a la de los hombres (figura 19), aunque las diferencias no son estadísticamente significativas ($p = 0,100$).

Figura 19. Supervivencia de los pacientes que han recibido un trasplante cardíaco, por sexo. 1997-2012



Las diferencias en la supervivencia del paciente según los cinco grupos de edad (< 50, 50-54, 55-59, 60-64, ≥ 65) son estadísticamente significativas ($p = 0,019$); los pacientes mayores de 60 años presentan una supervivencia más reducida (figura 20).

Figura 20. Supervivencia de los pacientes de 15 años o más que han recibido un trasplante cardíaco, por grupos de edad. 1997-2012



Teniendo en cuenta la indicación del trasplante, los pacientes con una cardiopatía valvular son los que presentan mejor supervivencia en contraposición a los pacientes con una cardiopatía isquémica, que son los que tienen una supervivencia más baja (figura 21). Las diferencias son estadísticamente significativas entre los cuatro grupos diagnósticos ($p = 0,038$) y entre los dos categorías diagnósticas más representadas ($p = 0,029$).

Figura 21. Supervivencia de los pacientes que han recibido un trasplante cardíaco, por indicación. 1997-2012






Figura 22. Supervivencia de los pacientes que han recibido un trasplante cardíaco, según el tiempo de isquemia. 1997-2012



Cuando se analiza la supervivencia según el tiempo transcurrido desde la extracción del órgano hasta el momento del trasplante, se observa que la probabilidad de sobrevivir es mayor cuando el tiempo de isquemia es inferior o igual a cuatro horas ($p = 0,049$) (figura 22).

Hay diferencias estadísticamente significativas ($p = 0,008$) en la supervivencia del paciente según si el trasplante ha sido urgente o electivo (figura 23).

Figura 23. Supervivencia de los pacientes que han recibido un trasplante cardíaco, según el tipo de urgencia. 1997-2012




Mortalidad

De los 1.071 pacientes trasplantados en el periodo 1984-2012, 520 (48,6%) han fallecido a 31 de diciembre de 2012, 541 (50,5%) siguen vivos y hay 10 (0,9%) de los que se ha perdido el seguimiento.

Las causas más frecuentes de muerte son las infecciones (21,4%) y las disfunciones primarias del injerto (16,1%), seguidas por las neoplasias (13,4%) y el rechazo agudo (9,7%). Las dos primeras causas de muerte representan más del 40% de todas las defunciones (figura 24).

Figura 24. Porcentaje de defunciones según la causa de la muerte. 1984-2012



Estas cuatro primeras causas de muerte son las mismas teniendo en cuenta el sexo del paciente, aunque los porcentajes varían según sean hombres o mujeres (figura 25).

En el 29,4% de las muertes, el deceso se ha producido durante el mes posterior al primer trasplante (figura 26) y la principal causa de muerte es la disfunción primaria del injerto (figura 27).

Para todo el periodo, la tasa de mortalidad a los 30 días es el 14,8% (12,7% para el periodo 1997-2012). En el año 2012, la tasa de mortalidad a los 30 días ha sido del 9,6%, valor inferior a la del año anterior, 18,5% (figura 28).

Figura 25. Porcentaje de defunciones, causa de muerte y sexo. 1984-2012






Figura 26. Tiempo transcurrido desde el trasplante hasta la muerte. 1984-2012



distribución de las causas de muerte por periodo observándose una disminución de la mortalidad por disfunción primaria del injerto y rechazo agudo.

Figura 29. Distribución de las causas de muerte por periodo, año de la muerte, en porcentajes (por 100 personas/año). 1984-2012



Lista de espera

El número de pacientes en lista de espera a finales del año 2012 se ha mantenido estable respecto el año anterior en 21 pacientes (figura 30).

Figura 30. Evolución de la lista de espera y del número de trasplantes cardíacos. 1990-2012






Figura 31. Media de días de espera para recibir un trasplante cardíaco. 2000-2012



En el año 2012, la media de días de espera para un trasplante cardíaco fue de 131; 159 días en los trasplantes electivos y 48 días para los urgentes (figura 31).

En el año 2012 hubo 75 inclusiones en la lista de espera. Por lo que respecta a las exclusiones, dos fueron por empeoramiento, uno por cambio de lista y siete por cambios de urgencia. La mortalidad en lista fue del 8,0% (7 pacientes), superior a la del año anterior. Dado el bajo número de casos en los últimos años, hay que valorar con cautela las importantes fluctuaciones que se observan (figura 32).

Figura 32. Porcentaje de mortalidad en lista de espera para recibir un trasplante cardíaco. 2000-2012



En el periodo 2000-2012, la probabilidad de recibir un trasplante cardíaco fue del 60% a los seis meses de estar en lista de espera y del 72% al cabo de un año (figura 33).

Al analizar la probabilidad de recibir un trasplante teniendo en cuenta el grupo sanguíneo del paciente se observa que los pacientes del grupo A y grupo O tienen las mismas probabilidades (58% a los seis meses y 70% al año). Los pacientes de los otros dos grupos, B y AB, presentan probabilidades superiores, pero estas son inestables dado el bajo número de casos (figura 34).

Figura 33. Probabilidad de recibir un trasplante cardíaco. 2000-2012





Figura 34. Probabilidad de recibir un trasplante cardíaco, por grupo sanguíneo. 2000-2012




Trasplante cardíaco en niños

De los 1.090 trasplantes cardíacos practicados en Cataluña en el periodo 1984-2012, 36 (35 primeros trasplantes y un retrasplante) corresponden a niños menores de 16 años. En el año 2012 se han realizado 3.

De los 35 pacientes trasplantados, el 51,4% (18) son hombres y el 48,6% (17) mujeres. La media de edad es de 10 años (mediana = 12, rango = 3 meses – 15 años), si bien el 57,1% (20) tienen entre 12 y 15 años.

La cardiopatía dilatada y la enfermedad congénita son las dos indicaciones más frecuentes (figura 35 y 36).

Figura 35. Indicaciones de los pacientes que han recibido el primer trasplante en edad pediátrica (menores de 16 años). 1984-2012



Las tablas 9 y 10 muestran las características de los donantes y de los trasplantes practicados en niños.

De los 35 niños (menores de 16 años) trasplantados, 1 ha sido retrasplantado en edad adulta y 13 han fallecido a 31 de diciembre de 2012.

Figura 36. Indicaciones de los pacientes que han recibido el primer trasplante en edad pediátrica (menores de 16 años) por grupos de edad. 1984-2012




Tabla 9. Características de los donantes. Trasplantes en receptores en edad pediátrica (menores de 16 años). 1984-2012

Sexo donante	
Hombre	16 (45,7%)
Mujer	18 (51,4%)
Falta información	1 (2,9%)
Edad donante	
Media (\pm DE)	16 (\pm 12,7)
Mediana	17
Rango	0 – 56
Muerte del donante	
TCE	19 (54,3%)
AVC	5 (14,3%)
Otras	11 (31,4%)
Procedencia órgano	
Propio centro	7 (20,0%)
Resto de Cataluña	7 (20,0%)
Fuera de Cataluña	21 (60,0%)

Tabla 10. Características de los donantes y de los trasplantes. Trasplantes en receptores en edad pediátrica (menores de 16 años). 1984-2012

Urgencia	
Urgente	16 (45,7%)
Electivo	19 (54,3%)
Tiempo isquemia (minutos)	
Media (\pm DE)	203 (\pm 62,5)
Mediana	206
Rango	60 – 340
