



Consells d'actuació davant del maltractament infantil per a professionals de centres sanitaris

Què s'entén per maltractament infantojuvenil?

Tota acció, omisió o tracte negligent, no accidental, que priva l'infant o adolescent dels seus drets i el seu benestar, i que amenaça el seu desenvolupament físic, psíquic o social o hi interfereix.

Tipus de maltractament

Físic: acció que provoca dany físic o malalties a l'infant o adolescent.

Per negligència o abandonament: falta d'atenció a les necessitats bàsiques.

Psicològic o emocional: provocació de sentiments negatius i limitació de les iniciatives que té l'infant o adolescent.


Abús sexual: satisfacció d'un desig sexual d'un adult utilitzant un infant o adolescent amb la seva participació o presència.

Maltractament prenatal: falta d'atenció al fetus durant el procés de gestació amb risc de perjudicar-lo.

Submissió quimicofarmacèutica: sotmetre l'infant o adolescent, sense necessitat mèdica, a qualsevol tipus de fàrmacs.

Síndrome de Münchhausen: sotmetre l'infant o adolescent a exploracions contínues o ingressos hospitalaris al·legant símptomes ficticis simulats pels pares, mares o cuidadors.

Altres tipus de maltractament: **l'explotació laboral i l'explotació sexual.**



Indicadors d'alerta més habituals davant de la sospita de maltractament

- Retard en l'assistència mèdica.
- Història inversemblant (no s'associen signes i símptomes).
- Etiologia i mecanisme de lesió que no concorden.
- Història clínica contradictòria entre pares i mares.
- Antecedents d'episodis similars.
- Hiperfreqüentació a urgències.
- Actituds passives davant les lesions de l'infant.
- Absentisme a les visites programades.
- Canvi sistemàtic de pediatre, de serveis de salut i d'urgències.
- Múltiples accidents o traumatismes.
- Millora clínica inexplicable durant un ingrés hospitalari.

Com actuar davant d'un maltractament o abús sexual

- Evitar la victimització secundària: cal que els professionals d'urgències i els metges forenses facin l'exploració conjuntament.
- Diferenciar les actuacions següents:

Urgent: actuació duta a terme menys de 72 hores després del maltractament o l'abús sexual. S'ha de derivar l'infant o adolescent al servei d'urgències dels hospitals de referència, que han d'avisar el metge forense.

No urgent: actuació duta a terme més de 72 hores després del maltractament o l'abús sexual. S'ha de derivar l'infant o adolescent a unitats especialitzades en abús sexual.



Coordinar-se bé és important


- Amb els serveis interns de l'hospital (treball social i altres).
- Amb els serveis externs (escola, serveis socials bàsics, equips de la DGAIA, Mossos d'Esquadra, jutjat de guàrdia, Fiscalia de Menors i metges forenses, en cas d'abús sexual).

Trucar al telèfon Infància Respon 116 111

ÉS EL PRIMER QUE S'HA DE FER, SOBRETOT EN CAS DE MALTRACTAMENT GREU...

- Per fer conèixer a la DGAIA el cas de certesa o sospita de maltractament.
- Per tal que la DGAIA pugui reactivar els seus serveis (EVAMI, en cas urgent, i/o EAIA).
- Per assegurar el seguiment i la protecció de l'infant o adolescent després de l'alta hospitalària.

Procediment que cal seguir davant d'un maltractament



En cas d'abús sexual

Dispositiu d'atenció primària comunitària i hospitalària

Atenció mèdica urgent

- Agressió esporàdica < 72 h
- Abús sexual repetitiu amb darrer episodi < 72 h
- Aparició de símptomes recents
- Valoració de necessitat de protecció 6

Atenció mèdica no urgent

- Agressió sexual > 72 h
- Abús sexual repetitiu
- Valoració de necessitat de protecció 6

Servei d'urgències hospitalari 4

Si no és urgent

Equip funcional d'experts

Què és el RUMI?

És el registre unificat de maltractaments infantils (Departament de Salut i DGAIA).

Els professionals han de registrar-hi els casos.

És una eina on:

- Es registren els casos que es detecten en els diferents dispositius sanitaris de Catalunya.
- Es pot consultar si un cas (certesa o sospita) té antecedents de maltractaments previs en altres centres sanitaris.

1. El primer que s'ha de fer és trucar InfànciaRespon 116 111
2. Derivació i assegurar l'arribada.
3. En cas de necessitat, cal avisar els cossos de seguretat.
4. En cas d'abús sexual, el metge forense s'ha de traslladar a l'hospital tan aviat com sigui possible, per realitzar l'exploració conjuntament amb els professionals del centre.
5. Si cal valoració per a la protecció de l'infant, s'ha de trucar al 116 111.
6. La DGAIA decideix la mesura de protecció que cal prendre.