

Com a personal sanitari,  
el vostre paper en el diagnòstic  
 precoç del VIH i les HEPATITIS  
és primordial.

Actualment un nombre elevat de persones  
infectades es diagnostiquen tard.

Convé oferir les proves del  
VIH i de les HEPATITIS a les  
persones que:

La majoria dels pacients estan d'acord en fer-se  
les proves si els ho proposa un professional sanitari

# Recomana-les!

## PRESENTIN UNA PATOLOGIA INDICATIVA DE POSSIBLE INFECCIÓ PEL VIH.

- » Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.
- » Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb VIH o de qui desconeixen l'estat serològic.

- » Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu.
- » Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s'hi.
- » Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.



## PRESENTIN UNA PATOLOGIA INDICATIVA DE POSSIBLE INFECCIÓ PER HEPATITIS VÍRIQUES.

- » Pateixin o hagin patit alguna infecció de transmissió sexual.
- » Estiguin diagnosticades d'infecció pel VIH.
- » Hagin mantingut relacions sexuals, sobre tot analis, amb penetració sense protecció.
- » Practiquin chemsex o slamsex.
- » Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.

- » Hagin compartit estris d'higiene personal.
- » S'hagin fet tatuatges o pírcings sense garanties sanitàries.
- » Van rebre sang o hemoderivats abans de 1992.
- » Hagin viscut a un país amb elevada prevalença (Xina, Marroc, Pakistan, Índia, Romania, Egipte, Països sud-saharians...).

