

## Administració de medicaments

# Via tòpica -Transdèrmica-



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Descripció</b></p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> És una forma d'administració de medicaments que consisteix en aplicar sobre la pell un dispositiu adhesiu que conté el fàrmac de tal manera que aquest es vagi absorbint de manera contínua.</li> </ul>   |
| <p><b>Presentacions</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pegat transdèrmic.</li> </ul>   |
| <p><b>Recomanacions</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Assegurar-se que la pell estigui neta i seca.</li> <li><input type="checkbox"/> El lloc de l'aplicació ha d'estar sense restes de maquillatge, cremes, locions ni altres productes tòpics.</li> <li><input type="checkbox"/> Escollir una zona de la pell que tingui la mínima quantitat possible de pèl. Es recomana la part exterior del braç o la part superior del tronc, en un lloc on no hi hagi fregament amb la roba.</li> <li><input type="checkbox"/> Aplicar la part adhesiva sobre la pell.</li> <li><input type="checkbox"/> No s'han d'aplicar sobre cicatrius, cremades, pell irritada, ni en zones on la pell faci plecs. Intentar evitar articulacions molt mòbils (colze, genoll...), així com mans i peus. Així s'assegura que el fàrmac s'absorbeixi correctament.</li> <li><input type="checkbox"/> Els pegats no s'han de doblegar, tallar ni partir, per evitar que es trenqui la matriu o el reservori i que es produeixi una sobredosificació o, per contra, una pèrdua del medicament abans de ser aplicat.</li> <li><input type="checkbox"/> Cal anar canviant la zona d'aplicació per evitar l'aparició de reaccions al·lèrgiques locals</li> </ul> |
| <p><b>Material</b></p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Medicament prescrit</li> <li><input type="checkbox"/> Gel hidroalcohòlic</li> <li><input type="checkbox"/> Equips de protecció individual (EPI): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guants de nitril o làtex, d'un sol ús</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Safata</li> </ul>   |
| <p><b>Procediment</b></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedir a la higiene de mans</li> <li>• Posar-se els guants</li> <li>• Treure el pegat de l'envàs protector, i aplicar-lo sobre la pell fent una lleugera pressió sobre ell amb la mà durant uns 10 segons per facilitar la seva adhesió</li> <li>• Retirar els guants i procedir a la higiene de mans</li> </ul>   |
| <p><b>Complicacions</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intolerància al fàrmac o algun dels seus components</li> <li>• Sobredosi i/o efectes adversos com qualsevol altre medicament</li> </ul>  |
| <p><b>Tractament de material residus</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Desestimar tot el material d'un sol ús com a residu sanitari del <b>grup II</b></li> <li><input type="checkbox"/> Els pegats utilitzats poden contenir restos significatius de principi actiu. S'han de doblegar de manera que el costat adhesiu del pegat s'enganxi sobre sí mateix i eliminar-los, posteriorment, de forma segura, en el contenidor de residus <b>grup II</b></li> </ul>  |