


Administració de medicaments

Via vaginal



Presentacions	<input type="checkbox"/> Gel <input type="checkbox"/> Pomades <input type="checkbox"/> Cremes <input type="checkbox"/> Comprimit <input type="checkbox"/> Òvuls	
Recomanacions	<input type="checkbox"/> Demanar-li que orini abans d'administrar la medicació per aquesta via. <input type="checkbox"/> Posar la pacient en decúbit supí i dir-li que flexioni els genolls i que separi les cames. <input type="checkbox"/> Posar un xopador per protegir la roba de la llitera i una talla a sobre de les cames de manera que quedi exposat únicament el perineu. <input type="checkbox"/> Verificar la higiene de la zona genital.	
Material	<input type="checkbox"/> Fàrmac prescrit <input type="checkbox"/> Gel hidroalcohòlic <input type="checkbox"/> Equips de protecció individual (EPI): <ul style="list-style-type: none"> • Guants de nitril o làtex, d'un sol ús 	<input type="checkbox"/> Aplicador vaginal <input type="checkbox"/> Xopador, talla <input type="checkbox"/> Compreses ginecològiques <input type="checkbox"/> Orinal pla <input type="checkbox"/> Estris de neteja <input type="checkbox"/> Gases

Procediment	<ul style="list-style-type: none"> • Procedir a la higiene de mans. • Posar-se els guants. • Col·locar la medicació prescrita a l'aplicador. Separar els llavis majors i introduir l'aplicador suaument a la vagina fent, lleugerament, un angle cap al sacre, després empènyer l'èmbol per aplicar-hi el gel, la pomada o la crema, o per deixar anar el comprimit vaginal o l'òvul. • Retirar l'aplicador i llençar-lo si és d'un sol ús. • Després d'administrar la medicació cal observar la mucosa que envolta la vagina, per si hi apareixen reaccions al·lèrgiques. • Posar-li una compresa perquè el medicament no taqui la roba de vestir o la del llit. • Acomodar la pacient i demanar-li que estigui estirada durant 30 minuts. • Retirar els guants i rentar-se les mans.
-------------	--

Tractament de material residus

- Llençar tot el material d'un sol ús a la bossa de residus sanitaris del grup II.