

## Administració de medicaments

# Via parenteral



<b>Descripció</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> El terme “parenteral” fa referència a les diverses vies d’administració d’un fàrmac dins l’organisme, a través de les diferents capes de la pell.</li><li><input type="checkbox"/> Les més utilitzades en atenció primària són: la via subcutània, la via intradèrmica, la intramuscular i l’endovenosa (vegeu annexos 15, 14, 17 o 19).</li></ul>
<b>Objectius</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Aconseguir una absorció sistèmica ràpida del fàrmac amb finalitats terapèutiques, diagnòstiques o preventives, en condicions asèptiques en les situacions següents.</li><li><input type="checkbox"/> Tractar/revertir situacions vitals urgents.</li><li><input type="checkbox"/> Tractar patologies no urgents buscant un inici d’acció més ràpid que a través d’altres vies (enteral, tòpica, etc.).</li><li><input type="checkbox"/> Fer proves diagnòstiques (proves de sensibilització cutània).</li><li><input type="checkbox"/> Immunitzar amb preparats vacunals.</li><li><input type="checkbox"/> Administrar fàrmacs que per les seves característiques farmacocinètiques només admeten aquestes vies (insulina).</li><li><input type="checkbox"/> Proporcionar tractament pal·liatiu a malalts terminals si la via oral està compromesa.</li></ul>
<b>Recomanacions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Observar i palpar la zona escollida per descartar induracions o altres alteracions (erupcions, marques de naixement, cicatrius, etc.) que farien canviar la zona d’injecció.</li><li><input type="checkbox"/> Preparar i desinfectar la pell amb antisèptic. S’aplica sobre la zona amb una gasa o cotó realitzant un moviment en espiral, de dins cap a fora, deixant assecar durant 1 minut.</li><li><input type="checkbox"/> Tenir en compte incompatibilitats entre fàrmacs i antisèptics o al·lèrgies (per exemple, al iode).</li></ul>
<b>Recomanacions de prevenció de riscos laborals</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Dins de les vies d’administració de fàrmacs, la via parenteral és la que suposa un risc més elevat per als professionals de patir un accident biològic, a causa de la manipulació de material punxant. En aquest sentit, les recomanacions per prevenir aquest risc són:<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilitzar equips de protecció individual (EPI) segons indica cada procediment: guants, mascareta, bata d’un sol ús durant tot el procés.</li><li>• Fer servir el material de bioseguretat posat a disposició a cada centre.</li><li>• Activar sempre el dispositiu de seguretat immediatament després de finalitzar la tècnica i abans de rebutjar al contenidor de grup III.</li><li>• Mai tornar a posar el caputxó a les agulles utilitzades, rebutjar-les als contenidors de grup III. En el de grup IV, en el cas de citostàtics com el metotrexat.</li></ul></li></ul>