

## Administració de medicaments

### Via oral



<b>Presentacions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> En format sòlid: comprimits, dragees, càpsules, pols, granulats...</li><li><input type="checkbox"/> En format líquid: solucions, xarops, elixirs o suspensions</li></ul>
<b>Recomanacions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Si el medicament és en format líquid, cal preparar la dosi en una xeringa estèril d'un sol ús.</li><li><input type="checkbox"/> Oferiu sempre un got d'aigua.</li></ul>
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Fàrmac prescrit</li><li><input type="checkbox"/> Equips de protecció individual (EPI):<ul style="list-style-type: none"><li>● Guants de nitril o làtex, d'un sol ús</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Got unidosi d'un sol ús / xeringa estèril Luer-Lock</li><li><input type="checkbox"/> Got d'aigua</li></ul>
<b>Procediment</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Desinfectar-se les mans i col·locar-se els guants.</li><li>● El pacient ha d'estar en bipedestació o assegut (posició més adient si hi ha risc d'aspiració).</li><li>● Oferir el medicament.</li><li>● Cal ajudar el pacient a prendre's el medicament si no ho pot fer sol.</li><li>● Assegurar-se que s'hagi pres el medicament.</li><li>● Deixar el pacient incorporat 30 minuts després de la presa dels fàrmacs.</li><li>● Retirar els guants i desinfectar-se les mans.</li></ul>
<b>Observacions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Cal tenir en compte si s'ha d'ingerir el medicament amb els àpats o fora d'aquests.</li><li>● Si ha de prendre més d'un fàrmac, cal tenir en compte la possibilitat d'interacció entre ells.</li><li>● Comprovar la capacitat de deglució del pacient. En cas de no poder empassar formes sòlides, intentar no manipular el medicament (buidar càpsules, triturar dragees, etc.) i valorar la presentació líquida del fàrmac.</li><li>● Empassar sense mastegar el comprimit llevat que s'indiqui el contrari.</li><li>● Si la forma farmacèutica és efervescent, primer cal dissoldre-la en aigua abans d'empassar-la.</li></ul>
<b>Tractament de material i residus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Eliminar tots els residus a la bossa de residus grup II.</li></ul>