

Administració de medicaments

Via tòpica
-Cutània-



Presentacions	<input type="checkbox"/> Ungüent <input type="checkbox"/> Pomada <input type="checkbox"/> Crema <input type="checkbox"/> Gel <input type="checkbox"/> Locions	<input type="checkbox"/> Pasta <input type="checkbox"/> Escuma <input type="checkbox"/> Pols <input type="checkbox"/> Apòsits
Recomanacions	<input type="checkbox"/> Observar la pell; si presenta restes d'aplicacions prèvies, netejar-les amb aigua i sabó o amb sèrum fisiològic. <input type="checkbox"/> Si cal, es poden aplicar apòsits de protecció.	
Material	<input type="checkbox"/> Fàrmac prescrit <input type="checkbox"/> Depressor <input type="checkbox"/> Gases <input type="checkbox"/> Gel hidroalcohòlic <input type="checkbox"/> Equips de protecció individual (EPI): <ul style="list-style-type: none"> • Guants de nitril o làtex, d'un sol ús <input type="checkbox"/> Safata <input type="checkbox"/> Sèrum fisiològic	
Procediment	<ul style="list-style-type: none"> • Procedir a la higiene de mans i col·locar-se els guants. • Netejar amb aigua i sabó la zona a tractar. • Esbandir i eixugar la zona sense friccionar ni irritar la pell. • Retirar els guants, fer higiene de mans i col·locar-se uns guants nets. • Si l'envàs està començat, (comprovar la data d'obertura per valorar el rebutjar-lo) i llavors rebutjar una petita quantitat del fàrmac. • Aplicar la quantitat de medicament indicada a la part afectada. • En el cas de que no sigui apòsit, s'hi aplicarà el medicament prescrit fent moviments llargs i suaus en la mateixa direcció en què creix el pèl. • En cas de locions, impregnar una gasa amb el producte i aplicar-la. • Cal evitar fer una pressió excessiva, perquè es pot excoriar la pell. • Si hi ha un excés de medicament cal eliminar-lo amb una gasa, especialment a les àrees on tendeix a dipositar-se (les mames o plecs de greix en pacients obesos). • Retirar-se els guants i procedir a la higiene de mans. • Per al cas específic dels apòsits, separar amb una pinça estèril el paper que cobreix la zona estèril de l'apòsit i col·locar aquesta part sobre la zona afectada o elegida. 	
Complicacions potencials	<ul style="list-style-type: none"> • Al·lèrgia o intolerància al principi actiu o els excipients • Sobredosificació • Efectes adversos com qualsevol altre medicament 	
Tractament de material residus	<input type="checkbox"/> Desestimar tot el material d'un sol ús com a residu sanitari del grup II.	