

Embenats

Vuit de guarisme

Descripció	Embenat que s'utilitza per reduir i immobilitzar una fractura/luxació de clavícula.
Objectiu	<input type="checkbox"/> Reduir la fractura i immobilitzar la clavícula.
Indicacions	<input type="checkbox"/> Fractura de clavícula
Material	<input type="checkbox"/> Gel hidroalcohòlic <input type="checkbox"/> Guants de làtex o nitril d'un sol ús, no estèrils <input type="checkbox"/> Vuit de guarisme conformat

Procediment

- Seguir les **Recomanacions generals** 5.2 del Procediment.
- Seguir les **Consideracions generals**, annex 2.
- Primerament farem seure el pacient en un tamboret alt.
- Demanarem al pacient que col·loqui l'espatlla i els braços forçats en sentit posterior i inferior, sense lliscar cap a la regió cervical (no pujar les espatlles).
- La columna ha d'estar en extensió i els braços han d'estar a 45° d'abducció amb els colzes en angle recte. Si cal, un ajudant col·loca el genoll a l'espai interescapular del pacient, tibant-li els colzes enrere. D'aquesta manera s'aconsegueix la reducció de la fractura mentre el professional col·loca l'embenat.
- Vigilar que l'adhesiu no fregui la pell.
- Seguir les instruccions que porta cada model.

Complicacions

- Veure **Complicacions generals** (punt 7) del Procediment
- Edemes a les extremitats superiors
- Compressió arterial i venosa
- Erosions a la pell per fregament de les vores de l'embenat

Instruccions

- Durada del tractament
 - ✓ De 3 a 6 setmanes, segons patologia
- Explicar signes d'alarma.
- Comprovar l'aparició d'edemes a extremitats superiors.
- Comprovar la compressió arterial i venosa.
- Controlar l'aparició d'erosions a la pell per fregament.
- Al llit, el pacient ha d'estar en posició semiincorporat.
- No es pot fer la pronosupinació de la mà perquè estaríem treballant el bíceps.

Tractament de material residus

- Desestimar tot el material d'un sol ús com a residu sanitari del grup II.