

Instruccions per a l'administració de la vacuna COVID19 de Johnson & Johnson /Janssen



La vacuna de **Johnson&Johnson/Janssen utilitza com a plataforma un adenovirus humà que normalment causa refredats, anomenat adenovirus 26, que es debilita i se li treu la seva capacitat de replicació.** A través d'ell es transporta el material genètic que codifica només la proteïna de l'espícula o S de la superfície del SARS-CoV-2, la part que utilitza per fixar-se a les cèl·lules. Així, les cèl·lules humanes formen durant uns dies la proteïna de l'espícula i és aquí quan el sistema immunitari reacciona i hi crea anticossos.

1. Conservació

1. La temperatura de conservació ha d'estar entre els 2 °C i els 8 °C.
2. Té una vida dins d'aquesta temperatura de 3 mesos o fins a la data de caducitat.
3. Es pot conservar fins a 12 hores sense refrigerar.
4. Una vegada perforat el vial s'ha d'administrar durant les 3 hores següents.
5. No s'ha de congelar (ja ha estat congelada).
6. No s'ha de diluir.
7. No s'ha de sacsejar.

	Conservació	Transport
Refrigeració (entre 2 °C i 8 °C)	3 mesos sense obrir 12 hores sense refrigerar 3 hores una vegada perforat el vial	Refrigerat (entre 2 °C i 8 °C)

IMPORTANT!

- Cal protegir els vials de l'exposició solar o de la llum ultraviolada.
- S'ha d'observar que la vacuna no presenti cap alteració de textura o color; en aquest cas, cal descartar-la.
- Des que el vial es treu de la nevera, s'ha d'utilitzar com a màxim abans de 12 hores.
- Si s'ha obert el vial, cal administrar la totalitat de les dosis durant les 3 hores següents (cal marcar l'hora al vial).
- **No es pot sacsejar.**



2. Administració

La vacuna de Johnson&Johnson/Janssen és una suspensió incolora lleugerament groguenca i opalescent. **S'han d'inspeccionar visualment els vials per si hi haguessin partícules o decoloració**; si existeix alguna d'aquestes condicions, no s'ha d'administrar.

Abans d'obrir i d'administrar la vacuna, s'ha de barrejar acuradament el contingut del vial, girant suaument en posició vertical durant 10 segons. **No es pot sacsejar.**

La vacuna s'administra per via intramuscular en una pauta d'una dosi (0,5 ml).

Cada vial conté 5 dosis.

3. Indicacions, contraindicacions i precaucions

Segons l'Agència Europea de Medicaments, la vacuna està indicada per a la immunització activa per prevenir la COVID-19 en persones **a partir de 18 anys**.

Només està contraindicada en persones que hagin presentat una **reacció d'hipersensibilitat greu** (de tipus anafilàctic) a una dosi prèvia de vacuna contra la COVID-19 o a algun dels seus components.

S'ha de disposar de recursos per actuar immediatament en cas d'anafilaxi.

Després de rebre la vacunació, s'ha d'observar la persona vacunada durant un temps de 15 minuts per detectar reaccions al·lèrgiques immediates o síncope. En persones amb antecedents d'una reacció al·lèrgica greu (anafilaxi), cal mantenir el seguiment fins a 30 minuts després de la vacunació.