

Vacuna COVID-19 Oxford /AstraZeneca - Vaxzevria



Com actua?

- Utilitza un virus atenuat i modificat genèticament (adenovirus).
- Produeix immunitat a partir de la reacció del cos a les proteïnes del virus.
- Eficàcia del 81,3% amb la segona dosi, 12 setmanes després de la primera dosi.



Presentació i conservació

- Vials multidosi de 10 dosis de 0,5 ml.
- Mantenir entre els 2 °C i els 8 °C.
- No s'ha de congelar.
- No s'ha de diluir.



A qui es pot administrar?

Indicada

- De 60 fins a 69 anys*.
- *Edat acordada a l'Estat espanyol .


Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



Administració

- Intramuscular en el deltoides.
- Dues dosis de 0,5 ml.
- Interval entre dosis: 10 a 12 setmanes (70 – 84 dies).



Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
 - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
 - Febre o febrícula
 - Fatiga
 - Maldecap
 - Calfreds
 - Nàusees
 - Dolor articular o muscular

* S'ha descrit un efecte advers molt rar i potencialment molt greu: trombosis associada a trombocitopènia, sobre tot en persones menors de 60 anys.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacuna-astrazeneca