

# INFORME DE VIGILÀNCIA DE LES VARIANTS GENÒMIQUES DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 A CATALUNYA. Setmana 3 - 2022 (17 de gener - 23 de gener de 2022)

## CASOS NOTIFICATS AL SISTEMA DE NOTIFICACIÓ MICROBIOLÒGICA DE CATALUNYA (SNMC)

### Resum del més destacat

#### Cribatge

Segons els resultats del cribatge, el percentatge de casos compatibles amb la variant òmicron ha estat del 91,8% (5.995 casos) la setmana 3 i del 90,8% (7.021 casos) la setmana 2. La variant delta ha representat el 4,5% (97 casos) la setmana 3 i el 6,1% (171 casos) la setmana 2.

#### Seqüenciació

Durant la **setmana 1**, s'han seqüenciat **544 casos**, la qual cosa representa el **2,5%** del total de casos de coronavirus SARS-CoV-2 amb PCR positiva. El **85,1% dels casos han estat de la variant òmicron** i el **14,9%** de la **variant delta**.

### Variants de preocupació (VOC, *variants of concern*)

#### Òmicron (BA.1, BA.2 i BA.3)

- El primer cas a Catalunya es va notificar durant la setmana 47.
- Durant les setmanes 48-1 se n'han notificat 1.825 casos.
- El grup d'edat amb més freqüència d'afectació ha estat el de 15-29 anys (23,6%), seguit del grup de 30-39 (16,2%).

#### Delta (B.1.617.2)

- Des del primer cas notificat a Catalunya (16 d'abril de 2021), la presència d'aquesta variant ha anat augmentant de forma important fins a la setmana 51, on ha estat desplaçada per la variant òmicron.
- Durant les setmanes 48-1, el grup d'edat amb més freqüència d'afectació ha estat el de 5-14 anys (17,1%).
- Dels 77 casos de la variant delta que s'han diferenciat en subllinatges la setmana 1 (95,1%), el AY.43 ha estat el més freqüent (27,3%), seguit del AY.4 (11,7%).

#### Alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351) i gamma (P.1)

- **Alfa:** la variant alfa va ser la variant majoritària des de principis de l'any 2021 fins a la setmana 25, que va ser desplaçada per la variant delta. L'últim cas es va notificar durant la setmana 46.
- **Beta:** la variant beta va presentar un pic de casos a les setmanes 17 (36 casos) i 18 (23 casos). L'últim cas es va notificar durant la setmana 32.
- **Gamma:** la variant gamma va presentar un pic de casos la setmana 25 (42 casos). L'últim cas es va notificar durant la setmana 43.

### Variants d'interès (VOI, *variants of interest*) i altres

- L'últim cas del llinatge B.1.621 (mu) es va notificar durant la setmana 47.

Tots els virus, inclòs el SARS-CoV-2, canvien constantment a través de mutacions que confereixen petites diferències genètiques. Una variant genètica del coronavirus SARS-CoV-2 té una o més mutacions que la diferencien de les altres variants circulants. La majoria de les mutacions no tenen cap impacte o en tenen poc respecte a canvis en el desenvolupament de la malaltia. No obstant això, de totes les mutacions, les que més preocupen són les que afecten el gen que codifica per la proteïna de l'espícula, la proteïna S, ja que és la que interacciona amb el receptor cel·lular ACE2 (enzim conversiu de l'angiotensina) i que pot afectar la seva transmissibilitat. Aquesta proteïna és la més exposada i la més antigènica, sobre la qual actuen els anticossos. Per tant, és important controlar el nombre de mutacions i els gens afectats.

La vigilància de les variants del SARS-CoV-2 té interès per a la salut pública, ja que aquestes poden tenir més transmissibilitat, ser més virulentes i ocasionar que la malaltia sigui més greu o que tingui més mortalitat, o també poden escapar de l'efecte dels anticossos adquirits després d'una infecció natural o de la vacunació. Així doncs, és important conèixer les variants que es troben a cada territori per tal de saber la prevalença de les variants circulants, la situació epidemiològica i avaluar les mesures de salut pública que s'hagin de prendre en cas necessari.

Les variants del SARS-CoV-2 es classifiquen en dues categories: les variants de preocupació (VOC, *variants of concern*) i les variants d'interès (VOI, *variants of interest*). Una variant del SARS-CoV-2 és una **VOI** si té un genoma amb mutacions que condueixen a canvis d'aminoàcid que poden incloure canvis en l'epidemiologia, antigenicitat o virulència, o canvis que tenen un impacte negatiu en el diagnòstic, les vacunes, les teràpies o les mesures socials i de salut pública; si s'ha identificat que causa múltiples casos de transmissió comunitària o s'ha detectat en diversos països. Una VOI del SARS-CoV-2 passa a ser una **VOC** si s'ha demostrat que, a més, està associada a un augment de la transmissibilitat o canvi perjudicial en l'epidemiologia de la COVID-19, un augment de la virulència o canvi en la presentació clínica de la malaltia, o una disminució de l'eficàcia de les mesures socials i de salut pública (diagnòstic, tractament i vacunes).

Actualment, les VOC considerades són: B.1.1.7 (alfa), B.1.351 (beta), P.1 (gamma), B.1.617.2 (delta) i B.1.1.529 (BA.1, BA.2 i BA.3) (òmicron).

Per saber la prevalença de les variants circulants a Catalunya es fa una vigilància de seqüenciació amb mostres aleatòries i una vigilància dirigida –indicada des de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC)– de les situacions rellevants per a la

salut pública que ajudin a entendre el context dels casos que tenen més transmissibilitat, persones amb sospita de reinfeccions o vacunades, entre d'altres, per tal de poder confirmar la variant, el llinatge o el sublinatge.

Amb aquesta finalitat, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública coordina la vigilància de les variants del SARS-CoV-2 amb els laboratoris que fan seqüenciació (parcial o completa) del genoma del coronavirus SARS-CoV-2.

Les seqüenciacions i els cribratges dels casos els han fet els centres que consten a l'annex 1 i els resultats d'aquests s'han notificat al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC). Per a més informació del procediment, podeu consultar el protocol [Vigilància de noves variants de SARS-CoV-2: integració de la seqüenciació genòmica del SARS-CoV-2 al sistema de vigilància a Catalunya](#).

Segons els **resultats de cribratge**, el percentatge de casos compatibles amb la variant òmicron ha estat del 91,8% (5.995 casos, 12 centres declarants) la setmana 3 (17-23 gener 2022) i del 85,7% (7.021 casos, 14 centres) la setmana 2 (10-16 gener 2022), respecte del nombre total de PCR positives fetes amb una PCR capaç de detectar aquesta variant. Els casos compatibles amb la variant delta han estat del 4,5% (97 casos, 5 centres) la setmana 3 i del 6,1% (171 casos, 7 centres) la setmana 2.


**Des del 4 de gener fins al 9 de gener de 2021 (setmana 1)** s'han analitzat els **casos seqüenciats notificats** pels centres de forma individualitzada de les variants del SARS-CoV-2. Cal tenir en compte que els resultats de seqüenciació es notifiquen amb uns 15 dies de retard des del diagnòstic.

Les variables epidemiològiques analitzades han estat les següents: edat, sexe, setmana de diagnòstic i servei de vigilància epidemiològica (SVE).

Els casos notificats s'han extret del repositori VARCO i estan validats, depurats i contrastats amb els casos confirmats per PCR obtinguts del registre TAGA-COVID-19.

Durant el període d'estudi **s'han seqüenciat 26.965 casos**. El nombre de seqüenciacions va augmentar en les primeres setmanes, amb un pic màxim la setmana 28 (1.028 casos). A partir d'aquí van anar disminuint fins a arribar a 273 casos la setmana 41. Des d'aleshores, el nombre de seqüenciacions va tornar a augmentar fins a la setmana 51 (839 casos) (figura 1). Les dades de la setmana 1, amb 544 casos seqüenciats, són provisionals, atès que hi ha centres que les notifiquen amb retard.


**Figura 1. Nombre de casos de SARS-CoV-2 seqüenciats per nombre de centres declarants. Catalunya, 4 de gener 2021- 9 de gener de 2022**



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

Durant les setmanes 51 (20 - 26 de desembre), 52 (27 de desembre de 2021 - 2 de gener de 2022) i 1 (3 - 9 de gener 2022) s'ha fet la seqüenciació completa dels casos de SARS-CoV-2 positius per PCR a 839 mostres (3,0%), 683 mostres (2,6%) i 544 mostres (2,5%) del total de casos, respectivament (figura 2).

**Figura 2. Nombre i percentatge de casos de SARS-CoV-2 seqüenciats per setmanes. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022**



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.



El percentatge de seqüenciació ha estat molt heterogeni entre els SVE i ha anat canviant al llarg dels mesos. Durant el mes de gener, l'SVE amb més percentatge de seqüenciació respecte a casos de SARS-CoV-2 amb PCR positiva han estat Barcelona Ciutat (1,7%), seguit de Girona i la Catalunya Central (ambdós amb 0,8%) (taula 1).

*Taula 1. Nombre de casos de SARS-CoV-2 seqüenciats i percentatge per SVE i mes de diagnòstic. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022*

	Barcelona Zona Sud		Barcelonès Nord - Maresme		Catalunya Central		Ciutat Barcelona		Girona		Lleida		Tarragona		Terres de l'Ebre		Vallès		
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	
2021	Gener	40	0,4%	134	2,3%	0	0%	213	2,2%	12	0,4%	0	0%	13	0,3%	0	0%	91	1%
	Febrer	232	5,5%	439	11,8%	63	2,7%	399	8,7%	60	3,1%	46	2,6%	10	1%	3	1,5%	231	4,9%
	Març	184	5,4%	362	14,3%	140	5,2%	466	10,5%	89	4,2%	100	4,7%	20	2%	7	7,7%	356	7%
	Abril	279	6,9%	260	11,2%	187	6,3%	395	7,9%	115	3,3%	79	2,9%	18	1,1%	14	4,2%	413	6,2%
	Maig	288	12,5%	414	31,8%	153	11,2%	314	12,1%	183	8,4%	55	6,3%	37	3,2%	9	4,6%	467	15,1%
	Juny	237	8,8%	526	25,7%	139	17,7%	456	10,4%	233	23,1%	73	16,2%	41	4,2%	19	9,9%	478	12,4%
	Juliol	335	2,6%	951	11,5%	202	7,4%	1,214	5,9%	265	5,7%	35	1,2%	85	1,9%	15	2,5%	547	3,8%
	Agost	384	10%	834	30,5%	184	13%	550	13%	441	20,2%	23	2,2%	167	12,6%	12	3,9%	307	8,3%
	Setembre	255	24,3%	355	48,8%	99	9,7%	255	18,9%	304	32,7%	43	7,7%	117	23,9%	10	4,5%	356	28%
	Octubre	239	37,3%	227	56%	112	23,2%	265	37,8%	229	33,7%	139	26,6%	55	14,5%	7	2,7%	249	32,5%
	Novembre	349	11,6%	471	25,6%	115	6,5%	376	11,6%	316	13%	162	10,1%	82	7,8%	6	1,3%	498	14,1%
	Desembre	348	2,9%	465	4,8%	134	2,4%	992	5%	373	4,9%	35	0,7%	193	4,4%	34	2,5%	450	1,8%
2022	Gener	83	0,7%	26	0,3%	34	0,8%	303	1,7%	48	0,8%	4	0,1%	2	0,1%	2	0,2%	29	0,2%

Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

### Motius de seqüenciació

Dels casos seqüenciats dels quals ha estat notificat el tipus de seqüenciació (24.348 casos), el 69,5% ha estat aleatori i el 30,5% no aleatori. D'aquests últims, el motiu de seqüenciació no aleatori més freqüent ha estat "vacunació", amb 5.031 casos (67,8%).

Durant les setmanes 48-1, el motiu de seqüenciació no aleatori més freqüent ha estat "vacunació" (33,3%-81,1%), seguit de "brot" (6,8%-24,8%) (taula 2).

**Taula 2. Motiu de seqüenciació no aleatòria pels casos de les últimes sis setmanes. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022**

	set. 48		set. 49		set. 50		set. 51		set. 52		set. 1	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Altres	0	0%	1	0,8%	10	5,7%	8	4,9%	27	32,9%	1	2,4%
Antecedent de viatge a països endèmics	8	3,4%	2	1,6%	3	1,7%	1	0,6%	1	1,2%	0	0%
Brot	30	12,9%	31	24,8%	12	6,8%	20	12,3%	6	7,3%	4	9,5%
Cas greu (ingrés hospitalari)	1	0,4%	3	2,4%	4	2,3%	8	4,9%	0	0%	1	2,4%
Situació d'alta transmissibilitat o virulència	1	0,4%	1	0,8%	1	0,6%	0	0%	0	0%	1	2,4%
Sospita reinfecció	4	1,7%	8	6,4%	18	10,2%	19	11,7%	10	12,2%	1	2,4%
Vacunat	189	81,1%	76	60,8%	101	57,4%	54	33,3%	37	45,1%	34	81%
Víncle epidemiològic on hi ha una nova variant	0	0%	3	2,4%	27	15,3%	52	32,1%	1	1,2%	0	0%
<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>100%</b>	<b>125</b>	<b>100%</b>	<b>176</b>	<b>100%</b>	<b>162</b>	<b>100%</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>

Altres: 1 cas = brot + postvacunal; 5 casos = brot + fallada vacunal; 5 casos = fallada vacunal + reinfecció; 2 casos = pacient atípic; 25 casos = reinfecció + postvacunal; 9 casos = sospita òmicron

Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

### Variants de preocupació (VOC, *variants of concern*)

La **variant alfa**, que pertany al llinatge **B.1.1.7**, es va detectar per primera vegada al Regne Unit el setembre de 2020. A Catalunya, el 16 de desembre de 2020 se'n va detectar el primer cas. Aquesta variant presenta 17 mutacions (annex 2).

El 18 de desembre de 2020, el Departament de Salut de Sud-àfrica va anunciar la detecció d'una nova variant, la **variant beta**, pertanyent al llinatge **B.1.351**. Es va detectar per primer cop a la província del Cap Oriental de Sud-àfrica l'octubre de 2020 i a Catalunya va ser diagnosticada el 19 de gener de 2021. Aquesta variant té unes 21 mutacions, de les quals 9 es troben al gen S (annex 2).

A principis de gener de 2021, el Japó va notificar una nova variant, la **variant gamma**, que pertany al llinatge **P.1**. El primer cas a Catalunya enregistrat a l'SNMC va ser el 5 de febrer de 2021. La gamma presenta 17 mutacions de les quals 10 són al gen S (annex 2).

La **variant delta (B.1.617.2)** va ser detectada per primer cop a l'Índia a l'octubre del 2020. El 16 d'abril de 2021 es va notificar el primer cas de B.1.617.2 a Catalunya. Aquesta variant conté unes 13-15 mutacions (annex 2).

El 24 de novembre de 2021, Sud-àfrica va notificar a l'OMS una nova variant, l'anomenada **òmicron**, que engloba els llinatges **BA.1**, **BA.2** i **BA.3**. Aquesta variant

presenta una gran quantitat de mutacions a la proteïna de l'espícula (més de 30) (annex 2). A Catalunya, el 28 de novembre de 2021 se'n va notificar el primer cas.


**Del total de casos seqüenciats** des del 4 de gener de 2021 (26.965 casos), el 91,4% (n = 24.636) han estat VOC (alfa, beta, gamma, delta o òmicron) i el 8,6% (n = 2.329) VOI.

La variant alfa ha estat la més freqüent fins a la setmana 24 (6.550 casos). A l'inici del 2021 es va observar un augment progressiu dels casos, amb un pic màxim la setmana 18 (490 casos), i la setmana 20 van anar disminuint de forma important (figures 3 i 4). En contrapartida, els casos de la variant B.1.177, més present a l'inici del 2021, van anar disminuint al llarg de les setmanes. Durant les setmanes 48-1, no s'ha notificat cap cas de variant alfa.

Des de la setmana 33 i 37 no s'ha detectat cap cas de variant beta ni de variant gamma, respectivament.

Els primers casos de la variant delta es van detectar durant la setmana 16 (3 casos). Des d'aleshores ha presentat un creixement notable. Va superar la variant alfa la setmana 25 i ha estat la variant predominant a tot el territori fins a la setmana 50. A la setmana 51 (295 casos) ha estat desplaçada per la variant òmicron (509 casos). Aquesta variant va ser detectada per primer cop la setmana 47 i des de llavors ha presentat un increment exponencial (figura 3).

*Figura 3. Percentatge dels casos dels 10 llinatges i variants del SARS-CoV-2 més freqüents per setmana. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022*



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.




Durant les setmanes 48-50, la variant delta s'ha mantingut estable, però amb l'aparició de la variant òmicron s'ha vist desplaçada molt ràpidament (setmanes 51-1) (taula 3, figura 4).

*Taula 3. Nombre de casos de SARS-CoV-2 segons variants durant les sis últimes setmanes epidemiològiques. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022*

	B.1.617.2		BA.1		BA.2		Total
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	
set. 48	702	98,2%	13	1,8%	0	0%	715
set. 49	510	96,4%	19	3,6%	0	0%	529
set. 50	452	64,3%	251	35,7%	0	0%	703
set. 51	324	38,6%	515	61,4%	0	0%	839
set. 52	119	17,4%	563	82,4%	1	0,1%	683
set. 1	81	14,9%	463	85,1%	0	0%	544

Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

*Figura 4. Nombre de casos de SARS-CoV-2 segons VOC i setmana. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022*



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.




A partir de la setmana 30 es van començar a detectar **subllinatges de la variant delta**; actualment s'han identificat més de 95 subllinatges diferents a Catalunya.

Cal tenir present que la variant delta es va reclassificant en subllinatges de forma constant; per tant, les dades d'aquest informe poden estar no actualitzades segons les reclassificacions de GISAID.

Durant la setmana 1, s'han identificat 77 casos de subllinatges delta, dels quals el AY.43 ha estat el més freqüent, amb 21 casos (27,3%), seguit del AY.4, amb 9 casos (11,7%) (figura 5).

*Figura 5. Percentatge dels casos dels 10 subllinatges de delta més freqüents per setmana. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022*




Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

En l'anàlisi en **funció del sexe** de la **variant delta** no es troba gaire diferència entre homes i dones, on el rang del percentatge de casos les últimes sis setmanes (48-1) és del 47,4% - 53,1% en dones i del 46,9% - 52,6% en homes.

Pel que fa als **grups d'edat** de casos d'aquesta variant de les últimes sis setmanes, el grup de 5-14 anys ha estat el més nombrós (17,1%). La setmana 1, el grup majoritari ha estat el de 70-79 anys, amb 16 casos (19,8%), seguit del grup de 60-69 anys, amb 13 casos (16,0%) (figura 6).


Figura 6. Nombre de casos de SARS-CoV-2 per delta i grup d'edat. Catalunya, 4 de gener 2021- 9 de gener de 2022



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

En el cas de la **variant òmicron i grups d'edat**, el 23,6% del total de casos notificats a les setmanes 48-1 pertanyen al grup de 15-29 anys, seguit del 16,2% del grup de 30-39 anys (figura 7).

Figura 7. Nombre de casos de SARS-CoV-2 per òmicron i grup d'edat. Catalunya, 4 de gener 2021 - 9 de gener de 2022



Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya. Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Secretaria de Salut Pública.

El 34,4% dels casos d'aquesta variant corresponen a l'SVE de Barcelona Ciutat, seguit del 16,1% del Barcelonès Nord-Maresme.

### Variants d'interès (VOI, *variants of interest*) i altres

Durant el 2021 es van detectar 2.274 variants d'interès i altres llinatges, de les quals la més freqüent va ser la B.1.177 (no VOC), amb un 45,6% (1.038 casos), seguida del llinatge B.1.621 (8,4%; 191 casos) i del B.1 (8,0%; 183 casos).

Durant les setmanes d'estudi 48-1 no s'ha detectat cap VOI ni altres llinatges (no VOC).



## **ANNEX 1. CENTRES NOTIFICANTS**

### **SEQÜENCIACIÓ**

Banc de Sang i Teixits

Hospital Clínic

Hospital Joan XXIII

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Laboratori de Referència de Catalunya

### **CRIBRATGE DE LA VARIANT DELTA O ÒMICRON**

Banc de Sang i Teixits

Hospital Clínic

Hospital Joan XXIII

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Laboratori de Referència de Catalunya

Althaia (Xarxa Assistencial Universitària de Manresa)

CATLAB

Hospital Universitari Sant Joan de Déu

Laboratori Echevarne

Laboratori Cerba Internacional

Synlab

Teletest



## ANNEX 2. MUTACIONS I CARACTERÍSTIQUES DE CADA VARIANT DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2

### Principals variants de preocupació (VOC) per a la salut pública

VARIANT	Mutacions d'interès	País detectat per primer cop	Any i mes del primer cas detectat	Evidència impacte en la transmissibilitat	Evidència impacte en la immunitat	Evidència impacte de la gravetat	Transmissió a UE/EEE
<b>B.1.1.7 (alfa)</b>	del 69-70, N501Y, D614G, P681H, Y144 del, A540D	Regne Unit	Setembre 2020	Sí	No	Sí	Circulació dràsticament reduïda a UE/EEE a causa de l'aparició de la variant delta
<b>B.1.351 (beta)</b>	K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V	Sud-àfrica	Setembre 2020	Sí	Sí	Sí	Comunitària
<b>P.1 (gamma)</b>	K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y	Brasil	Desembre 2020	Sí	Sí	Sí	Comunitària
<b>B.1.617.2 (delta) i llinatges AY</b>	L452R, T478K, D614G, P681R	Índia	Desembre 2020	Sí	Sí	Sí	Comunitària
<b>B.1.1.529 (òmicron)</b>	*	Sud-Àfrica i Botswana	Novembre 2021		Sí		Dominant

\*A67V, Δ69-70, T95I, G142D, Δ143-145, Δ211, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F

### Variants d'interès (VOI)

VARIANT	Mutacions d'interès	País detectat per primer cop	Any i mes del primer cas detectat	Evidència impacte en la transmissibilitat	Evidència impacte en la immunitat	Transmissió a UE/EEE
<b>C.37 (lambda)</b>	L452Q, G75V, T76I, F490S, D614G, T859N	Perú	Desembre 2020		Sí	Esporàdica/Viatge
<b>B.1.621 (mu)</b>	R346K, E484K, N501Y, D614G, P681H	Colòmbia	Gener 2021	Sí	Sí	Esporàdica/Viatge

Taula basada en: [ECDC Variants de preocupació](#). Data: 26 de gener de 2022.



**Elaboració:** Pilar Ciruela, Aurora Sabrià, Cèlia Serrano, Carolina Ferrer, Sergi Mendoza, Jacobo Mendioroz.

**Agraïments:** als professionals de la Xarxa del Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC) i de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC).

**Font:** Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya i TAGA-COVID-19  
Servei de Prevenció i Control de Malalties Emergents.

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.