

La vacuna contra les infeccions per rotavirus. Què n'has de saber?



Què és el rotavirus?



El rotavirus és un **virus molt contagiós** i és la causa principal de **gastroenteritis aguda en infants menors de 5 anys**.



Els símptomes principals són **vòmits, diarrea, febre i deshidratació**. A vegades, en nounats i infants de menor edat pot arribar a ser **greu**, i esdevé la **principal causa d'ingrés** per diarrea aguda.




Com es transmet i per què cal vacunar els nadons?



La principal via de **transmissió és fecal-oral**. El contagi es produeix a través del contacte directe de les mans amb objectes com bolquers, joguines o superfícies, com l'aigua i els aliments.



Tot i les mesures de prevenció, no s'ha aconseguit reduir el nombre de casos. La **vacunació és l'única eina eficaç** per prevenir la infecció per rotavirus.



Quins nadons s'han de vacunar i quan cal fer-ho?



Els nadons **nascuts a partir del gener de 2025** han de rebre la vacuna **als 2 mesos d'edat**, seguint la pauta establerta segons la vacuna disponible.



Com s'administra?



La vacuna s'administra **per via oral en dues o tres dosis**, segons la vacuna disponible, i en un **entorn sanitari**. La vacuna és segura i es pot administrar conjuntament amb d'altres.

Qui no es pot vacunar contra el rotavirus?



Cal consultar un professional sanitari en cas de trastorn immunitari, malformació congènita gastrointestinal no corregida o història prèvia d'invaginació intestinal.



Si el lactant conviu amb una embarassada o amb una persona immunodeprimida, es recomana que els contactes tinguin **especial cura en el rentat de mans després del canvi de bolquers**.



gen.cat/rotavirus

Per a més informació, escanegeu aquest codi QR o consulteu gen.cat/rotavirus



Generalitat
de Catalunya