

Ce este scabia?

Scabia sau râia este o boală cauzată de un acarian (parazit). Este foarte frecventă și poate afecta persoane de orice vârstă, origine, statut social sau obiceiuri igienice.

Care sunt simptomele?

Scabia provoacă mâncărimi intense, mai ales în timpul nopții. Simptomele apar la 2 până la 6 săptămâni după expunere sau contact fizic direct (piele pe piele) cu o persoană infestată.

Cum se transmite?

- Prin contact fizic direct și prelungit, piele pe piele, cu o persoană infestată.
- Prin folosirea la comun, cu o persoană infestată, a anumitor obiecte personale, precum haine, lenjerie de pat, prosoape, perne sau alte articole textile.

O persoană cu scabie poate transmite boala chiar dacă nu are simptome.

Dacă ați intrat în contact cu o persoană care are scabie și prezentați simptome, este important să vă adresați cât mai curând unui centru de sănătate.

Scabie

Prevenire și control



Cum se tratează?

Atât persoana diagnosticată cu scabie, cât și contactele acesteia (membri ai familiei, concubin(ă), parteneri sexuali sau persoane cu care a avut contact fizic direct și prelungit) trebuie să urmeze tratamentul conform indicațiilor personalului medical. Este important ca toți cei implicați să înceapă tratamentul în același timp și să respecte măsurile de igienă recomandate.

Măsuri de igienă



Aplicați aceste măsuri odată cu începerea tratamentului medical.



Spălați la 60°C hainele, prosoapele și lenjeria de pat folosite în săptămâna dinaintea primei doze de tratament. De asemenea, nu uitați să aspirați bine covoarele din casă.



Depozitați hainele sau materialele care nu pot fi spălate (pături, perne, covoare etc.) într-o pungă de plastic închisă, timp de 7 zile. Curățați suprafețele utilizate frecvent cu soluții pe bază de clor.



Nu folosiți hainele și prosoapele la comun cu alte persoane.



Schimbați hainele și lenjeria de pat folosite în timpul tratamentului.



Repetăți măsurile după 7 zile.

Tratament medical

Cum se administrează ivermectina orală?



1. Începeți tratamentul în același timp cu toți membrii familiei și contactele directe.



2. Tăiați-vă unghiile, faceți duș cu apă și săpun, apoi uscați-vă bine pielea.



3. Luați medicamentul, de preferință seara. Nu consumați alimente cu două ore înainte și după administrarea medicamentului, conform indicațiilor personalului medical. Evitați contactul social timp de 24 de ore după tratament (școală, serviciu etc.).



4. A doua zi, faceți duș cu apă caldă sau rece și săpun. Uscăți-vă cu un prosop curat.



5. Folosiți haine și așternuturi curate.



6. Repetați tratamentul după 7 zile, conform indicațiilor personalului medical.

Mâncărima poate persista până la 6 săptămâni după tratament.

