

Informe d'activitat assistencial: urgències relacionades amb el consum de drogues

Any 2024

Octubre 2025



**Generalitat
de Catalunya**

Alguns drets reservats

© 2025, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina [web de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Edita:

Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques

Primera edició:

Barcelona, octubre de 2025

Assessorament editorial:

Gabinet del conseller. Serveis editorials

Assessorament lingüístic:

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Pla editorial 2025:

Núm. de registre: 13743

Sumari

1	Introducció	5
2	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de drogues	6
3	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'alcohol en funció de l'edat i del sexe	12
4	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de cocaïna en funció de l'edat i del sexe	17
5	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'hipnosedants en funció de l'edat i del sexe	21
6	Annex 1. Taules descriptives.....	25
6.1	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de cànnabis en funció de l'edat i del sexe	25
6.2	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'opiacis en funció de l'edat i del sexe	27
6.3	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'estimulants en funció de l'edat i del sexe	31
6.4	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'al·lucinògens en funció de l'edat i del sexe	34
6.5	Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'altres substàncies psicoactives en funció de l'edat i del sexe	33

Glossari de sigles

CMBD-UR	Conjunt mínim bàsic de dades d'urgències
SISCAT	Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya
CIM10	10a revisió de la Classificació internacional de malalties

1 Introducció

En aquest document es presenten les dades de les urgències hospitalàries de Catalunya notificades durant el període 2018-2024 pels hospitals en el registre del conjunt mínim bàsic de dades d'urgències (CMBD-UR), al qual s'ha de notificar tota l'activitat d'atenció urgent del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

L'informe d'urgències relacionades amb el consum de drogues recull les dades de les urgències hospitalàries ateses amb un diagnòstic principal relacionat amb drogues, segons la Classificació internacional de malalties, 10a revisió (CIM10). Les drogues incloses es categoritzen en els grans grups de substàncies següents: alcohol, hipnosedants, cocaïna, cànnabis, opioides, estimulants, al·lucinògens i altres drogues. No s'hi inclouen les urgències ateses amb un diagnòstic secundari relacionat amb el consum de drogues.

Per altra banda, les urgències relacionades amb drogues es classifiquen en dos grups, segons les reaccions i conseqüències que en genera el consum: intoxicacions o altres urgències relacionades amb drogues. Les altres urgències inclouen les cirrosis, les dependències amb altres trastorns de salut mental, gastritis, hepatitis alcohòlica, hepatopaties i miocardiopaties atribuïbles al consum de substàncies. Cal recordar que el consum de drogues en aquestes urgències també figura com a diagnòstic principal.

Metodològicament, cal assenyalar que les urgències de les persones menors de dotze anys no s'han inclòs i que durant l'any 2024 s'ha fet una revisió exhaustiva dels codis diagnòstics relacionats amb drogues i se n'han inclòs de nous. Aquesta revisió també ha afectat les dades retrospectivament.

L'informe s'estructura en els apartats següents:

- Anàlisi evolutiva de les urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de drogues.
- Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'alcohol en funció de l'edat i del sexe.
- Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de cocaïna en funció de l'edat i del sexe.
- Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'hipnosedants en funció de l'edat i del sexe.
- Taules descriptives de les urgències hospitalàries.

2 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de drogues

L'any 2024, en els centres hospitalaris que integren el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) es van notificar un total de 3.377.286 episodis d'urgències hospitalàries per qualsevol causa en persones de 12 anys o més. Del total d'episodis atesos durant el 2024, un 0,75 % ($n = 25.416$) dels diagnòstics principals dels episodis estaven relacionats amb el consum de drogues i les conseqüències que s'hi associen.

La taula 1 recull el nombre total d'urgències ateses i el nombre d'episodis amb un diagnòstic principal relacionat amb drogues. Des de l'any 2018 s'observa un increment progressiu en termes absoluts i relatius del nombre total d'urgències relacionades amb el consum de drogues. El 2024 és l'any amb el nombre més elevat d'urgències relacionades amb drogues de tota la sèrie històrica, tot i que respecte al total d'urgències ateses presenta percentatges similars al 2022 i al 2023.

Taula 1. Total d'urgències hospitalàries i d'urgències relacionades amb drogues ateses, 2018-2024

Any	Total d'episodis d'urgències hospitalàries	Total d'episodis relacionats amb drogues*	Percentatge de diagnòstics relacionats amb drogues
2018	3.111.944	18.646	0,6
2019	3.210.697	20.512	0,64
2020	2.411.934	16.034	0,66
2021	2.778.232	19.674	0,71
2022	3.122.996	22.738	0,73
2023	3.245.890	24.090	0,74
2024	3.377.286	25.416	0,75

* Total d'episodis relacionats amb drogues: nombre d'episodis d'urgències en els quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum de drogues. Una persona pot tenir més d'un episodi d'urgències al llarg de l'any.

A la figura 1 es mostra una gràfica evolutiva del període 2018-2024 amb el nombre total d'urgències ateses relacionades amb drogues, segons grups de substàncies. S'hi observa que l'alcohol ($n = 12.978$) és, amb molta diferència, la substància psicoactiva per la qual s'atenen més urgències, seguit a molta distància de la cocaïna ($n = 3.775$) i dels hipnosedants ($n = 3.308$). Es pot observar que durant l'any 2024 els casos relacionats amb l'alcohol van augmentar lleugerament respecte a l'any anterior i que es van situar en el màxim de la sèrie


històrica. Tot i això, les urgències per alcohol s'han estabilitzat aquests últims anys després de la davallada observada durant la pandèmia.

En el cas de la cocaïna, s'observa una clara tendència ascendent des del 2020 i el nombre de casos supera, per primera vegada des del 2019, el dels hipnosedants. En canvi, en el cas dels hipnosedants s'observa un increment considerable a partir de l'any 2020, però amb una tendència a l'estabilització aquest últim període, 2022-2024. L'increment observat pot estar relacionat amb la pandèmia de la COVID-19 i els malestars generats associats.

En menor mesura s'observa un increment de les urgències per cànnabis respecte a la prepandèmia i una estabilització posterior, de manera que es va situar per sota del 1.500 casos l'any 2024.

El nombre d'urgències relacionades amb el consum d'opioides, altres estimulants i al·lucinògens és molt residual. Durant el 2024 es van atendre un total de 824 urgències relacionades amb el consum d'opioides, 806 relacionades amb el consum d'altres estimulants i 78 relacionades amb el consum d'al·lucinògens.


Figura 1. Tipus d'urgències hospitalàries amb diagnòstic principal relacionat amb drogues, 2018-2024



A la figura 2 es representa un gràfic evolutiu del percentatge de cadascuna de les drogues sobre el total de les urgències hospitalàries en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb drogues. L'any 2024 el 51 % de les urgències les va causar l'alcohol; el 15 %, la cocaïna; el 13 %, els hipnosedants; el 9 %, altres

substàncies; el 6 %, el cànnabis; el 3 %, els opioïdes, i un 3 % més es va atribuir als estimulants.

Figura 2. Tipus d'urgències hospitalàries amb diagnòstic principal relacionat amb drogues, 2018-2024



A la taula 2 s'especifiquen en termes absoluts i relatius el nombre d'urgències segons les drogues i el tipus d'urgència, és a dir, si es tracta d'intoxicacions o d'altres urgències. A les taules 3 i 4 es mostra aquesta mateixa informació estratificada segons el sexe. La taula 3 recull les dades d'urgències relacionades amb drogues entre els homes i la taula 4, entre les dones.

Taula 2. Urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb drogues, 2018-2024

Urgències hospitalàries	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Intoxicació per alcohol	8.660 (46,4 %)	9.668 (47,1 %)	6.657 (41,5 %)	8.642 (43,9 %)	9.902 (43,5 %)	9.992 (41,5 %)	10.374 (40,8 %)
Altres urgències per alcohol	2.464 (13,2 %)	2.470 (12 %)	2.036 (12,7 %)	2.201 (11,2 %)	2.463 (10,8 %)	2.454 (10,2 %)	2.604 (10,2 %)
Total d'urgències per alcohol	11.124 (59,7 %)	12.138 (59,2 %)	8.693 (54,2 %)	10.843 (55,1 %)	12.365 (54,4 %)	12.446 (51,7 %)	12.978 (51,1 %)
Intoxicació per cocaïna	1.228 (6,6 %)	1.468 (7,2 %)	1.250 (7,8 %)	1569 (8 %)	1.861 (8,2 %)	2.394 (9,9 %)	2.746 (10,8 %)
Altres urgències per cocaïna	606 (3,3 %)	758 (3,7 %)	475 (3 %)	559 (2,8 %)	589 (2,6 %)	950 (3,9 %)	1.029 (4 %)
Total d'urgències per cocaïna	1.834 (9,8 %)	2.226 (10,9 %)	1.725 (10,8 %)	2.128 (10,8 %)	2.450 (10,8 %)	3.344 (13,9 %)	3.775 (14,9 %)
Intoxicació per cànnabis	604 (3,2 %)	764 (3,7 %)	790 (4,9 %)	862 (4,4 %)	968 (4,3 %)	1.139 (4,7 %)	1.114 (4,4 %)
Altres urgències per cànnabis	267 (1,4 %)	311 (1,5 %)	284 (1,8 %)	259 (1,3 %)	278 (1,2 %)	329 (1,4 %)	367 (1,4 %)
Total d'urgències per cànnabis	871 (4,7 %)	1.075 (5,2 %)	1.074 (6,7 %)	1.121 (5,7 %)	1.246 (5,5 %)	1.468 (6,1 %)	1.481 (5,8 %)
Intoxicació per altres estimulants	481 (2,6 %)	542 (2,6 %)	498 (3,1 %)	516 (2,6 %)	639 (2,8 %)	712 (3 %)	704 (2,8 %)
Altres urgències per altres estimulants	30 (0,2 %)	45 (0,2 %)	57 (0,4 %)	76 (0,4 %)	104 (0,5 %)	108 (0,4 %)	102 (0,4 %)
Total d'urgències per altres estimulants	511 (2,7 %)	587 (2,9 %)	555 (3,5 %)	592 (3 %)	743 (3,3 %)	820 (3,4 %)	806 (3,2 %)
Intoxicació per hipnosedants	1.823 (9,8 %)	1.952 (9,5 %)	1.992 (12,4 %)	2.665 (13,5 %)	3.030 (13,3 %)	3.026 (12,6 %)	3.099 (12,2 %)
Altres urgències per hipnosedants	100 (0,5 %)	134 (0,7 %)	116 (0,7 %)	124 (0,6 %)	145 (0,6 %)	169 (0,7 %)	209 (0,8 %)
Total d'urgències per hipnosedants	1.923 (10,3 %)	2.086 (10,2 %)	2.108 (13,1 %)	2.789 (14,2 %)	3.175 (14 %)	3.195 (13,3 %)	3.308 (13 %)
Intoxicació per opioïdes	404 (2,2 %)	434 (2,1 %)	341 (2,1 %)	406 (2,1 %)	514 (2,3 %)	501 (2,1 %)	497 (2 %)
Altres urgències per opioïdes	379 (2 %)	362 (1,8 %)	274 (1,7 %)	314 (1,6 %)	393 (1,7 %)	325 (1,3 %)	327 (1,3 %)
Total d'urgències per opioïdes	783 (4,2 %)	796 (3,9 %)	615 (3,8 %)	720 (3,7 %)	907 (4 %)	826 (3,4 %)	824 (3,2 %)
Intoxicació per al·lucinògens	83 (0,4 %)	72 (0,4 %)	51 (0,3 %)	58 (0,3 %)	67 (0,3 %)	64 (0,3 %)	71 (0,3 %)
Altres urgències per al·lucinògens	1 (0 %)	5 (0 %)	4 (0 %)	2 (0 %)	3 (0 %)	6 (0 %)	7 (0 %)
Total d'urgències per al·lucinògens	84 (0,5 %)	77 (0,4 %)	55 (0,3 %)	60 (0,3 %)	70 (0,3 %)	70 (0,3 %)	78 (0,3 %)
Intoxicació per altres drogues	1.042 (5,6 %)	981 (4,8 %)	745 (4,6 %)	917 (4,7 %)	1.256 (5,5 %)	1.346 (5,6 %)	1.593 (6,3 %)
Altres urgències per altres drogues	474 (2,5 %)	546 (2,7 %)	464 (2,9 %)	504 (2,6 %)	526 (2,3 %)	575 (2,4 %)	573 (2,3 %)
Total d'urgències per altres drogues	1.516 (8,1 %)	1.527 (7,4 %)	1.209 (7,5 %)	1.421 (7,2 %)	1.782 (7,8 %)	1.921 (8 %)	2.166 (8,5 %)
Total de diagnòstics	18.646 (100 %)	20.512 (100 %)	16.034 (100 %)	19.674 (100 %)	22.738 (100 %)	24.090 (100 %)	25.416 (100 %)

Taula 3. Urgències hospitalàries ateses en homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb drogues, 2018-2024

Urgències hospitalàries	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Intoxicació per alcohol	5.626 (44,5 %)	6.311 (45,7 %)	4.547 (41,4 %)	5.612 (43,1 %)	6.292 (42,3 %)	6.323 (39,3 %)	6.628 (38,7 %)
Altres urgències per alcohol	1.958 (15,5 %)	1.889 (13,7 %)	1.594 (14,5 %)	1.699 (13 %)	1.881 (12,6 %)	1.830 (11,4 %)	2.001 (11,7 %)
Total d'urgències per alcohol	7.584 (60 %)	8200 (59,3 %)	6.141 (55,9 %)	7.311 (56,1 %)	8.173 (55 %)	8.153 (50,7 %)	8.629 (50,4 %)
Intoxicació per cocaïna	980 (7,8 %)	1.164 (8,4 %)	994 (9 %)	1.262 (9,7 %)	1.460 (9,8 %)	1.887 (11,7 %)	2.115 (12,3 %)
Altres urgències per cocaïna	496 (3,9 %)	600 (4,3 %)	382 (3,5 %)	435 (3,3 %)	476 (3,2 %)	754 (4,7 %)	783 (4,6 %)
Total d'urgències per cocaïna	1.476 (11,7 %)	1.764 (12,8 %)	1.376 (12,5 %)	1.697 (13 %)	1.936 (13 %)	2.641 (16,4 %)	2.898 (16,9 %)
Intoxicació per cànnabis	436 (3,5 %)	569 (4,1 %)	575 (5,2 %)	648 (5 %)	700 (4,7 %)	842 (5,2 %)	860 (5 %)
Altres urgències per cànnabis	222 (1,8 %)	246 (1,8 %)	216 (2 %)	204 (1,6 %)	225 (1,5 %)	275 (1,7 %)	314 (1,8 %)
Total d'urgències per cànnabis	658 (5,2 %)	815 (5,9 %)	791 (7,2 %)	852 (6,5 %)	925 (6,2 %)	1.117 (6,9 %)	1.174 (6,9 %)
Intoxicació per altres estimulants	309 (2,4 %)	387 (2,8 %)	358 (3,3 %)	401 (3,1 %)	463 (3,1 %)	567 (3,5 %)	541 (3,2 %)
Altres urgències per altres estimulants	30 (0,2 %)	41 (0,3 %)	55 (0,5 %)	63 (0,5 %)	90 (0,6 %)	99 (0,6 %)	82 (0,5 %)
Total d'urgències per altres estimulants	339 (2,7 %)	428 (3,1 %)	413 (3,8 %)	464 (3,6 %)	553 (3,7 %)	666 (4,1 %)	623 (3,6 %)
Intoxicació per hipnosedants	706 (5,6 %)	778 (5,6 %)	817 (7,4 %)	1.015 (7,8 %)	1.175 (7,9 %)	1.263 (7,9 %)	1.346 (7,9 %)
Altres urgències per hipnosedants	71 (0,6 %)	86 (0,6 %)	87 (0,8 %)	88 (0,7 %)	98 (0,7 %)	123 (0,8 %)	154 (0,9 %)
Total d'urgències per hipnosedants	777 (6,1 %)	864 (6,2 %)	904 (8,2 %)	1.103 (8,5 %)	1.273 (8,6 %)	1.386 (8,6 %)	1.500 (8,8 %)
Intoxicació per opioides	273 (2,2 %)	267 (1,9 %)	200 (1,8 %)	237 (1,8 %)	350 (2,4 %)	324 (2 %)	309 (1,8 %)
Altres urgències per opioides	303 (2,4 %)	296 (2,1 %)	228 (2,1 %)	255 (2 %)	299 (2 %)	261 (1,6 %)	264 (1,5 %)
Total d'urgències per opioides	576 (4,6 %)	563 (4,1 %)	428 (3,9 %)	492 (3,8 %)	649 (4,4 %)	585 (3,6 %)	573 (3,3 %)
Intoxicació per al·lucinògens	65 (0,5 %)	41 (0,3 %)	34 (0,3 %)	41 (0,3 %)	44 (0,3 %)	52 (0,3 %)	51 (0,3 %)
Altres urgències per al·lucinògens	1 (0 %)	4 (0 %)	1 (0 %)	2 (0 %)	3 (0 %)	6 (0 %)	7 (0 %)
Total d'urgències per al·lucinògens	66 (0,5 %)	45 (0,3 %)	35 (0,3 %)	43 (0,3 %)	47 (0,3 %)	58 (0,4 %)	58 (0,3 %)
Intoxicació per altres drogues	782 (6,2 %)	727 (5,3 %)	541 (4,9 %)	658 (5,1 %)	898 (6 %)	1.020 (6,3 %)	1224 (7,1 %)
Altres urgències per altres drogues	378 (3 %)	418 (3 %)	365 (3,3 %)	401 (3,1 %)	417 (2,8 %)	448 (2,8 %)	453 (2,6 %)
Total d'urgències per altres drogues	1.160 (9,2 %)	1.145 (8,3 %)	906 (8,2 %)	1.059 (8,1 %)	1.315 (8,8 %)	1.468 (9,1 %)	1.677 (9,8 %)
Total de diagnòstics	12.636 (100 %)	13.824 (100 %)	10.994 (100 %)	13.021 (100 %)	14.871 (100 %)	16.074 (100 %)	17.132 (100 %)

Taula 4. Urgències hospitalàries ateses en dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb drogues, 2018-2024

Urgències hospitalàries	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Intoxicació per alcohol	3.031 (50,5 %)	3.356 (50,2 %)	2.109 (41,9 %)	3.027 (45,6 %)	3.600 (45,9 %)	3.667 (45,8 %)	3.742 (45,2 %)
Altres urgències per alcohol	506 (8,4 %)	581 (8,7 %)	442 (8,8 %)	501 (7,5 %)	582 (7,4 %)	624 (7,8 %)	603 (7,3 %)
Total d'urgències per alcohol	3.537 (58,9 %)	3.937 (58,9 %)	2.551 (50,6 %)	3.528 (53,1 %)	4.182 (53,3 %)	4.291 (53,6 %)	4.345 (52,5 %)
Intoxicació per cocaïna	247 (4,1 %)	304 (4,5 %)	256 (5,1 %)	307 (4,6 %)	400 (5,1 %)	505 (6,3 %)	631 (7,6 %)
Altres urgències per cocaïna	110 (1,8 %)	158 (2,4 %)	93 (1,8 %)	123 (1,9 %)	113 (1,4 %)	196 (2,4 %)	246 (3 %)
Total d'urgències per cocaïna	357 (5,9 %)	462 (6,9 %)	349 (6,9 %)	430 (6,5 %)	513 (6,5 %)	701 (8,8 %)	877 (10,6 %)
Intoxicació per cànnabis	168 (2,8 %)	195 (2,9 %)	215 (4,3 %)	213 (3,2 %)	266 (3,4 %)	297 (3,7 %)	254 (3,1 %)
Altres urgències per cànnabis	45 (0,7 %)	65 (1 %)	68 (1,3 %)	54 (0,8 %)	52 (0,7 %)	54 (0,7 %)	53 (0,6 %)
Total d'urgències per cànnabis	213 (3,5 %)	260 (3,9 %)	283 (5,6 %)	267 (4 %)	318 (4,1 %)	351 (4,4 %)	307 (3,7 %)
Intoxicació per altres estimulants	172 (2,9 %)	155 (2,3 %)	140 (2,8 %)	115 (1,7 %)	176 (2,2 %)	145 (1,8 %)	163 (2 %)
Altres urgències per altres estimulants	0 (0 %)	4 (0,1 %)	2 (0 %)	13 (0,2 %)	14 (0,2 %)	9 (0,1 %)	20 (0,2 %)
Total d'urgències per altres estimulants	172 (2,9 %)	159 (2,4 %)	142 (2,8 %)	128 (1,9 %)	190 (2,4 %)	154 (1,9 %)	183 (2,2 %)
Intoxicació per hipnosedants	1.117 (18,6 %)	1.174 (17,6 %)	1.174 (23,3 %)	1.650 (24,8 %)	1.853 (23,6 %)	1.762 (22 %)	1.752 (21,2 %)
Altres urgències per hipnosedants	29 (0,5 %)	48 (0,7 %)	29 (0,6 %)	36 (0,5 %)	47 (0,6 %)	46 (0,6 %)	55 (0,7 %)
Total d'urgències per hipnosedants	1.146 (19,1 %)	1.222 (18,3 %)	1.203 (23,9 %)	1.686 (25,4 %)	1.900 (24,2 %)	1.808 (22,6 %)	1.807 (21,8 %)
Intoxicació per opioides	131 (2,2 %)	167 (2,5 %)	141 (2,8 %)	169 (2,5 %)	164 (2,1 %)	177 (2,2 %)	187 (2,3 %)
Altres urgències per opioides	76 (1,3 %)	66 (1 %)	46 (0,9 %)	59 (0,9 %)	93 (1,2 %)	64 (0,8 %)	63 (0,8 %)
Total d'urgències per opioides	207 (3,4 %)	233 (3,5 %)	187 (3,7 %)	228 (3,4 %)	257 (3,3 %)	241 (3 %)	250 (3 %)
Intoxicació per al·lucinògens	18 (0,3 %)	31 (0,5 %)	17 (0,3 %)	17 (0,3 %)	23 (0,3 %)	12 (0,1 %)	20 (0,2 %)
Altres urgències per al·lucinògens	0 (0 %)	1 (0 %)	3 (0,1 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Total d'urgències per al·lucinògens	18 (0,3 %)	32 (0,5 %)	20 (0,4 %)	17 (0,3 %)	23 (0,3 %)	12 (0,1 %)	20 (0,2 %)
Intoxicació per altres drogues	260 (4,3 %)	254 (3,8 %)	204 (4 %)	258 (3,9 %)	357 (4,5 %)	325 (4,1 %)	369 (4,5 %)
Altres urgències per altres drogues	96 (1,6 %)	128 (1,9 %)	99 (2 %)	103 (1,6 %)	109 (1,4 %)	127 (1,6 %)	120 (1,4 %)
Total d'urgències per altres drogues	356 (5,9 %)	382 (5,7 %)	303 (6 %)	361 (5,4 %)	466 (5,9 %)	452 (5,6 %)	489 (5,9 %)
Total de diagnòstics	6.006 (100 %)	6.687 (100 %)	5.038 (100 %)	6.645 (100 %)	7.849 (100 %)	8.010 (100 %)	8.278 (100 %)


3 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'alcohol en funció de l'edat i del sexe

L'alcohol és la droga que genera el nombre més elevat d'episodis d'urgències relacionades amb drogues. Concretament, durant el 2024, es van atendre un total de 12.978 episodis (10.374 d'intoxicacions i 2.604 d'altres urgències) amb un diagnòstic principal relacionat amb l'alcohol. Aquesta xifra significa que l'alcohol va representar més del 50 % del total d'episodis d'urgències relacionades amb drogues, exactament, un 51,1 % l'any 2024.

És destacable que durant els últims anys de la sèrie històrica s'observa un descens del percentatge d'urgències relacionades amb l'alcohol i un increment del percentatge d'urgències relacionades amb altres substàncies, com és el cas de la cocaïna i els hipnosedants. No obstant això, en termes absoluts, el 2024 ha estat l'any amb el nombre més elevat d'urgències ateses relacionades amb l'alcohol.

Quan s'analitzen les urgències hospitalàries en les quals el diagnòstic principal va ser l'alcohol en funció del sexe, s'observa que al llarg de tota la sèrie històrica, més del 65 % de les persones ateses van ser homes. L'any 2024, només el 34 % ($n = 4.345$) de les urgències amb un diagnòstic principal relacionat amb l'alcohol corresponien a dones. No obstant això, si només es posa el focus en les urgències ateses a menors d'edat (2024: 950 episodis), la proporció es reverteix i majoritàriament corresponen a dones (52 % dones, 48 % homes). Per tant, entre el grup de persones més joves, les dones tenen més presència en els recursos d'urgències per episodis relacionats amb el consum d'alcohol, però a mesura que augmenta l'edat, les urgències relacionades amb l'alcohol corresponen majoritàriament als homes. A més, les diferències segons el sexe s'incrementen cada vegada més: en el grup de més grans de 60 anys, el 77 % de les urgències per alcohol va correspondre a homes (vegeu les taules 5, 6 i 7).

Figura 3. Evolució anual del percentatge d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb l'alcohol en funció del sexe, 2018-2024




* S'hi han exclòs les urgències de sexe desconegut.

Si es fa aquesta mateixa anàlisi segons els grups d'edat (figura 4), s'observa que el grup d'edat amb més presència als recursos d'urgències per episodis relacionats amb l'alcohol correspon a les persones de 41 a 60 anys. Concretament, el 2024 un 41 % ($n = 5.350$) de les persones ateses per urgències hospitalàries relacionades amb l'alcohol es trobaven en aquesta franja d'edat. Els grups d'edat següents amb més presència van ser el grup de 26 a 40 anys i de 18 a 25 anys, amb un percentatge de 22,5 % ($n = 2.926$) i 15,5 % ($n = 2.012$) respectivament.

També s'observa que l'any 2024 un 7,3 % ($n = 950$) de les urgències relacionades amb l'alcohol corresponia a menors d'edat. Això significa que l'any 2024 i els percentatges observats els anys 2018, 2019 i 2021 van ser els anys amb la proporció més alta d'urgències relacionades amb l'alcohol en la població menor d'edat de tot el període analitzat.

Figura 4. Evolució anual 2018-2024 del percentatge d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb l'alcohol en funció dels grups d'edat



* S'hi han exclòs les urgències d'edat desconeguda.

A les taules 5, 6 i 7 es presenten amb més detall, amb valors absoluts i relatius, les urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb l'alcohol en funció del sexe i les categories d'edat.

Taula 5. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb l'alcohol en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	229 (2,1 %)	286 (2,4 %)	181 (2,1 %)	376 (3,5 %)	271 (2,2 %)	244 (2 %)	383 (3 %)
De 16 a 17 anys	581 (5,2 %)	589 (4,9 %)	224 (2,6 %)	419 (3,9 %)	451 (3,6 %)	468 (3,8 %)	567 (4,4 %)
De 18 a 25 anys	1.994 (17,9 %)	2.076 (17,1 %)	1.058 (12,2 %)	1.600 (14,8 %)	2.232 (18,1 %)	2.121 (17 %)	2.012 (15,5 %)
De 26 a 40 anys	2.553 (23 %)	2.758 (22,7 %)	2.031 (23,4 %)	2.315 (21,4 %)	2.837 (22,9 %)	2.786 (22,4 %)	2.926 (22,5 %)
De 41 a 60 anys	4.310 (38,7 %)	4.866 (40,1 %)	3.909 (45 %)	4.582 (42,3 %)	4.906 (39,7 %)	5.114 (41,1 %)	5.350 (41,2 %)
Més de 60 anys	1.441 (13 %)	1.537 (12,7 %)	1.273 (14,6 %)	1.527 (14,1 %)	1.620 (13,1 %)	1.679 (13,5 %)	1.720 (13,3 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat desconeguda.

Taula 6. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb l'alcohol en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	79 (1 %)	112 (1,4 %)	65 (1,1 %)	110 (1,5 %)	87 (1,1 %)	84 (1 %)	128 (1,5 %)
De 16 a 17 anys	312 (4,1 %)	324 (4 %)	109 (1,8 %)	206 (2,8 %)	216 (2,6 %)	230 (2,8 %)	294 (3,4 %)
De 18 a 25 anys	1.139 (15 %)	1.180 (14,4 %)	657 (10,7 %)	937 (12,8 %)	1.133 (13,9 %)	1.089 (13,4 %)	1.135 (13,2 %)
De 26 a 40 anys	1.740 (22,9 %)	1.889 (23 %)	1.435 (23,4 %)	1.618 (22,1 %)	1.953 (23,9 %)	1.895 (23,2 %)	2.066 (23,9 %)
De 41 a 60 anys	3.185 (42 %)	3.466 (42,3 %)	2.860 (46,6 %)	3.258 (44,6 %)	3.500 (42,8 %)	3.538 (43,4 %)	3.656 (42,4 %)
Més de 60 anys	1.115 (14,7 %)	1.207 (14,7 %)	998 (16,3 %)	1.165 (15,9 %)	1.250 (15,3 %)	1.288 (15,8 %)	1.333 (15,4 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat desconeguda.

Taula 7. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb l'alcohol en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	150 (4,2 %)	174 (4,4 %)	116 (4,5 %)	266 (7,5 %)	184 (4,4 %)	160 (3,7 %)	255 (5,9 %)
De 16 a 17 anys	268 (7,6 %)	265 (6,7 %)	115 (4,5 %)	213 (6 %)	235 (5,6 %)	238 (5,5 %)	273 (6,3 %)
De 18 a 25 anys	855 (24,2 %)	896 (22,8 %)	400 (15,7 %)	663 (18,8 %)	1.099 (26,3 %)	1.032 (24,1 %)	875 (20,1 %)
De 26 a 40 anys	813 (23 %)	869 (22,1 %)	596 (23,4 %)	697 (19,8 %)	883 (21,1 %)	891 (20,8 %)	859 (19,8 %)
De 41 a 60 anys	1.124 (31,8 %)	1.399 (35,5 %)	1.049 (41,1 %)	1.324 (37,5 %)	1.406 (33,6 %)	1.575 (36,7 %)	1.694 (39 %)
Més de 60 anys	326 (9,2 %)	330 (8,4 %)	275 (10,8 %)	362 (10,3 %)	370 (8,8 %)	391 (9,1 %)	387 (8,9 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat desconeguda.


4 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de cocaïna en funció de l'edat i del sexe

Des de l'any 2020, s'ha observat un increment tant en valor absolut com relatiu del nombre d'urgències hospitalàries en les quals el diagnòstic principal és el consum de cocaïna. A més, aquest increment ha estat encara més pronunciat durant el període 2022-2024. De fet, l'any 2024 es va assolir el nombre màxim d'urgències relacionades amb el consum de cocaïna, tant en termes absoluts com relatius.

L'any 2024, des dels hospitals del SISCAT es van atendre un total de 3.775 episodis relacionats amb el consum de cocaïna (2.746 episodis d'intoxicacions i 1.029 episodis d'altres urgències). Aquesta xifra representa un 14,9 % del total del nombre d'urgències relacionades amb drogues ($n = 25.416$).

Gairebé un 80 % de les urgències relacionades amb cocaïna corresponen a homes, un percentatge molt superior a l'observat en el cas de les urgències relacionades amb l'alcohol i especialment amb els hipnosedants. Tot i això, és remarcable que al llarg de la sèrie històrica s'observa un lleuger increment del percentatge de dones ateses per urgències relacionades amb cocaïna que assolix valors màxims l'any 2024. Durant el 2024, exactament, un 77 % ($n = 2.898$) d'aquestes urgències corresponien a homes i un 23 %, a dones ($n = 877$).


Figura 5. Evolució anual del percentatge d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb la cocaïna en funció del sexe, 2018-2024



* S'hi han exclòs les urgències de sexe desconegut.

L'any 2024, el 43 % ($n = 1.628$) de les persones ateses per urgències relacionades amb cocaïna tenien entre 41 i 60 anys, i el 42 % ($n = 1.590$), entre 26 i 40 anys. Tot i l'augment en nombres absoluts de les urgències per cocaïna en ambdós grups d'edat, el percentatge d'urgències en la franja de 26 a 40 anys respecte al total ha disminuït des del 2018 i ha augmentat en la franja d'edat de 41 a 60 anys fins a ser superior a partir de l'any 2023. Només el 15 % de les persones ateses estan fora de la franja d'edat de 26 a 60 anys. El percentatge d'urgències entre les persones menors d'edat va ser molt residual, el 2024 només es van atendre 15 episodis entre les persones en aquest grup d'edat. Sí que és destacable, però, un lleuger increment en la proporció de les persones de 18 a 25 anys, que el 2024 va arribar a un 13 % ($n = 482$) de les urgències per cocaïna.

Figura 6. Evolució anual del percentatge d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb la cocaïna en funció del grup d'edat, 2018-2024



* S'hi han exclòs les urgències de sexe desconegut.

A les taules següents (taules 8, 9 i 10) es presenten amb més detall, en termes absoluts i relatius, el nombre d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb la cocaïna en funció del sexe i les categories d'edat.

Taula 8. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum de cocaïna en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	2 (0,1 %)	5 (0,2 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (0,1 %)	3 (0,1 %)	6 (0,2 %)
De 16 a 17 anys	2 (0,1 %)	3 (0,1 %)	6 (0,3 %)	3 (0,1 %)	2 (0,1 %)	12 (0,4 %)	9 (0,2 %)
De 18 a 25 anys	163 (8,9 %)	244 (11 %)	184 (10,7 %)	247 (11,6 %)	279 (11,4 %)	403 (12,1 %)	482 (12,8 %)
De 26 a 40 anys	1.064 (58 %)	1.128 (50,7 %)	863 (50 %)	1.024 (48,1 %)	1.078 (44 %)	1.409 (42,1 %)	1.590 (42,1 %)
De 41 a 60 anys	585 (31,9 %)	832 (37,4 %)	656 (38 %)	830 (39 %)	1.057 (43,1 %)	1.471 (44 %)	1.628 (43,1 %)
Més de 60 anys	16 (0,9 %)	11 (0,5 %)	14 (0,8 %)	23 (1,1 %)	29 (1,2 %)	38 (1,1 %)	58 (1,5 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat desconeguda.

Taula 9. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum de cocaïna en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	2 (0,1 %)	1 (0,1 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (0 %)	1 (0 %)
De 16 a 17 anys	2 (0,1 %)	2 (0,1 %)	4 (0,3 %)	2 (0,1 %)	1 (0,1 %)	6 (0,2 %)	5 (0,2 %)
De 18 a 25 anys	121 (8,2 %)	179 (10,1 %)	147 (10,7 %)	183 (10,8 %)	213 (11 %)	312 (11,8 %)	358 (12,4 %)
De 26 a 40 anys	854 (57,9 %)	887 (50,3 %)	697 (50,7 %)	828 (48,8 %)	861 (44,5 %)	1.145 (43,4 %)	1.270 (43,8 %)
De 41 a 60 anys	484 (32,8 %)	684 (38,8 %)	517 (37,6 %)	665 (39,2 %)	839 (43,3 %)	1.141 (43,2 %)	1.219 (42,1 %)
Més de 60 anys	13 (0,9 %)	8 (0,5 %)	9 (0,7 %)	19 (1,1 %)	21 (1,1 %)	31 (1,2 %)	43 (1,5 %)

*S'hi han exclòs les urgències amb edat o sexe desconeguts

Taula 10. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum de cocaïna en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	0 (0 %)	4 (0,9 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (0,6 %)	2 (0,3 %)	5 (0,6 %)
De 16 a 17 anys	0 (0 %)	1 (0,2 %)	2 (0,6 %)	1 (0,2 %)	1 (0,2 %)	6 (0,9 %)	4 (0,5 %)
De 18 a 25 anys	42 (11,8 %)	65 (14,1 %)	37 (10,6 %)	64 (14,9 %)	66 (12,9 %)	91 (13 %)	124 (14,1 %)
De 26 a 40 anys	210 (58,8 %)	241 (52,2 %)	166 (47,6 %)	196 (45,6 %)	217 (42,3 %)	264 (37,7 %)	320 (36,5 %)
De 41 a 60 anys	101 (28,3 %)	148 (32 %)	139 (39,8 %)	165 (38,4 %)	218 (42,5 %)	330 (47,1 %)	409 (46,6 %)
Més de 60 anys	3 (0,8 %)	3 (0,6 %)	5 (1,4 %)	4 (0,9 %)	8 (1,6 %)	7 (1 %)	15 (1,7 %)


*S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

5 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'hipnosedants en funció de l'edat i del sexe

Des de l'any 2020, s'ha observat un increment important tant en valors absoluts com relatius del nombre d'urgències hospitalàries en les quals el diagnòstic principal és el consum d'hipnosedants. L'any 2024, des dels hospitals del SISCAT es van atendre un total de 3.308 episodis relacionats amb el consum d'hipnosedants (3.099 episodis d'intoxicacions i 209 episodis d'altres urgències). Aquesta xifra representa un 13 % del total d'urgències relacionades amb drogues ($n = 25.416$).

L'anàlisi de la distribució de les urgències relacionades amb hipnosedants segons el sexe (figura 7) mostra que, al llarg de la sèrie històrica, més del 50 % de les urgències relacionades amb els hipnosedants correspon a dones. Això significa que en el cas de les urgències relacionades amb hipnosedants, i a diferència de la majoria de drogues, hi ha un predomini de població femenina. També en altres indicadors com els inicis de tractament o la mortalitat veiem un impacte més destacat d'aquestes substàncies en les dones. Tot i que a l'evolució no s'observen grans diferències en la proporció d'homes i de dones que han estat atesos per urgències relacionades amb hipnosedants respecte a altres anys, cal assenyalar que l'any 2024 es produeix el percentatge més alt d'urgències relacionades amb hipnosedants entre els homes, concretament un 45 % ($n = 1.500$).

Figura 7. Evolució anual del percentatge d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb els hipnosedants en funció del sexe, 2018-2024




* S'hi han exclòs les urgències de sexe desconegut.

Quan s'analitzen les dades en funció de l'edat (figura 8), s'observa que el grup de 41 a 60 anys és el que presenta el nombre més elevat d'urgències per hipnosedants al llarg de tota la sèrie històrica. L'any 2024 es van produir un total de 1.251 episodis, cosa que representa un 38 % (35 % entre els homes i 40 % entre les dones) de les urgències per hipnosedants. També cal assenyalar que l'any 2024 va disminuir el percentatge d'episodis entre el grup de joves de 18 a 25 anys respecte als anys anteriors després d'uns anys amb tendència a l'alça. En canvi, entre el grup de persones de 26 a 40 anys, la proporció d'urgències ateses va augmentar respecte als últims anys. El 2024 es van atendre 145 episodis d'urgències per hipnosedants entre menors d'edat (25 % homes, 75 % dones).

A les taules 12 i 13 s'observa que la població de dones ateses a urgències per consum d'hipnosedants està més envellida que la població d'homes atesa.

Figura 8. Evolució anual del percentatge d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb els hipnosedants en funció del grup d'edat, 2018-2024



* S'hi han exclòs les urgències de sexe desconegut.

A les taules següents (taules 11, 12 i 13) es presenten amb més detall, en termes absoluts i relatius, el nombre d'urgències hospitalàries ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb els hipnosedants en funció del sexe i les categories d'edat.

Taula 11. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'hipnosedants en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	34 (1,8 %)	24 (1,2 %)	48 (2,3 %)	72 (2,6 %)	75 (2,4 %)	62 (1,9 %)	73 (2,2 %)
De 16 a 17 anys	47 (2,4 %)	43 (2,1 %)	42 (2 %)	89 (3,2 %)	97 (3,1 %)	71 (2,2 %)	72 (2,2 %)
De 18 a 25 anys	199 (10,3 %)	260 (12,5 %)	323 (15,3 %)	452 (16,2 %)	609 (19,2 %)	689 (21,6 %)	608 (18,4 %)
De 26 a 40 anys	495 (25,7 %)	466 (22,3 %)	520 (24,7 %)	672 (24,1 %)	679 (21,4 %)	749 (23,4 %)	858 (25,9 %)
De 41 a 60 anys	785 (40,8 %)	936 (44,9 %)	846 (40,1 %)	1.101 (39,5 %)	1255 (39,5 %)	1146 (35,9 %)	1251 (37,8 %)
Més de 60 anys	360 (18,7 %)	354 (17 %)	328 (15,6 %)	401 (14,4 %)	457 (14,4 %)	471 (14,7 %)	437 (13,2 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 12. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'hipnosedants en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	11 (1,4 %)	10 (1,2 %)	14 (1,5 %)	12 (1,1 %)	10 (0,8 %)	18 (1,3 %)	14 (0,9 %)
De 16 a 17 anys	13 (1,7 %)	17 (2 %)	15 (1,7 %)	23 (2,1 %)	27 (2,1 %)	28 (2 %)	22 (1,5 %)
De 18 a 25 anys	80 (10,3 %)	114 (13,2 %)	168 (18,6 %)	211 (19,1 %)	275 (21,6 %)	337 (24,3 %)	311 (20,7 %)
De 26 a 40 anys	225 (29 %)	212 (24,5 %)	249 (27,5 %)	309 (28 %)	322 (25,3 %)	365 (26,3 %)	482 (32,1 %)
De 41 a 60 anys	324 (41,7 %)	399 (46,2 %)	351 (38,8 %)	420 (38,1 %)	497 (39 %)	479 (34,6 %)	530 (35,3 %)
Més de 60 anys	121 (15,6 %)	109 (12,6 %)	107 (11,8 %)	126 (11,4 %)	141 (11,1 %)	153 (11 %)	132 (8,8 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 13. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'hipnosedants en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	23 (2 %)	14 (1,1 %)	34 (2,8 %)	60 (3,6 %)	65 (3,4 %)	44 (2,4 %)	59 (3,3 %)
De 16 a 17 anys	34 (3 %)	26 (2,1 %)	27 (2,2 %)	66 (3,9 %)	70 (3,7 %)	43 (2,4 %)	50 (2,8 %)
De 18 a 25 anys	119 (10,4 %)	146 (11,9 %)	155 (12,9 %)	241 (14,3 %)	334 (17,6 %)	352 (19,5 %)	297 (16,4 %)
De 26 a 40 anys	270 (23,6 %)	254 (20,8 %)	271 (22,5 %)	363 (21,5 %)	357 (18,8 %)	384 (21,2 %)	375 (20,8 %)
De 41 a 60 anys	461 (40,2 %)	537 (43,9 %)	495 (41,1 %)	681 (40,4 %)	758 (39,9 %)	667 (36,9 %)	721 (39,9 %)
Més de 60 anys	239 (20,9 %)	245 (20 %)	221 (18,4 %)	275 (16,3 %)	316 (16,6 %)	318 (17,6 %)	305 (16,9 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

6 Annex 1. Taules descriptives

6.1 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum de cànnabis en funció de l'edat i del sexe

Taula 14. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum de cànnabis en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	58 (6,7 %)	51 (4,7 %)	30 (2,8 %)	37 (3,3 %)	43 (3,5 %)	30 (2 %)	36 (2,4 %)
De 16 a 17 anys	71 (8,2 %)	90 (8,4 %)	77 (7,2 %)	81 (7,2 %)	69 (5,5 %)	59 (4 %)	76 (5,1 %)
De 18 a 25 anys	320 (36,7 %)	402 (37,4 %)	398 (37,1 %)	429 (38,3 %)	469 (37,6 %)	560 (38,1 %)	592 (40 %)
De 26 a 40 anys	301 (34,6 %)	394 (36,7 %)	408 (38 %)	413 (36,8 %)	444 (35,6 %)	580 (39,5 %)	542 (36,6 %)
De 41 a 60 anys	115 (13,2 %)	120 (11,2 %)	147 (13,7 %)	150 (13,4 %)	201 (16,1 %)	218 (14,9 %)	219 (14,8 %)
Més de 60 anys	5 (0,6 %)	17 (1,6 %)	13 (1,2 %)	10 (0,9 %)	16 (1,3 %)	16 (1,1 %)	15 (1 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 15. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum de cànnabis en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	25 (3,8 %)	27 (3,3 %)	11 (1,4 %)	17 (2 %)	21 (2,3 %)	18 (1,6 %)	23 (2 %)
De 16 a 17 anys	46 (7 %)	59 (7,2 %)	52 (6,6 %)	55 (6,5 %)	42 (4,5 %)	37 (3,3 %)	48 (4,1 %)
De 18 a 25 anys	253 (38,4 %)	301 (36,9 %)	291 (36,8 %)	332 (39 %)	341 (36,9 %)	434 (38,9 %)	482 (41,1 %)
De 26 a 40 anys	241 (36,6 %)	321 (39,4 %)	316 (39,9 %)	330 (38,7 %)	353 (38,2 %)	450 (40,3 %)	434 (37 %)
De 41 a 60 anys	89 (13,5 %)	94 (11,5 %)	112 (14,2 %)	113 (13,3 %)	156 (16,9 %)	160 (14,3 %)	174 (14,8 %)
Més de 60 anys	3 (0,5 %)	12 (1,5 %)	8 (1 %)	5 (0,6 %)	11 (1,2 %)	13 (1,2 %)	12 (1 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 16. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum de cànnabis en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	33 (15,5 %)	24 (9,2 %)	19 (6,7 %)	20 (7,5 %)	22 (6,9 %)	12 (3,4 %)	13 (4,2 %)
De 16 a 17 anys	25 (11,7 %)	31 (11,9 %)	25 (8,8 %)	26 (9,7 %)	27 (8,5 %)	22 (6,3 %)	28 (9,1 %)
De 18 a 25 anys	67 (31,5 %)	101 (38,8 %)	107 (37,8 %)	96 (36 %)	128 (40,3 %)	126 (35,9 %)	110 (35,8 %)
De 26 a 40 anys	60 (28,2 %)	73 (28,1 %)	92 (32,5 %)	83 (31,1 %)	91 (28,6 %)	130 (37 %)	108 (35,2 %)
De 41 a 60 anys	26 (12,2 %)	26 (10 %)	35 (12,4 %)	37 (13,9 %)	45 (14,2 %)	58 (16,5 %)	45 (14,7 %)
Més de 60 anys	2 (0,9 %)	5 (1,9 %)	5 (1,8 %)	5 (1,9 %)	5 (1,6 %)	3 (0,9 %)	3 (1 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

6.2 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'opiacis en funció de l'edat i del sexe

Taula 17. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'opiacis en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	5 (0,6 %)	38 (4,8 %)	18 (2,9 %)	21 (2,9 %)	15 (1,7 %)	35 (4,2 %)	46 (5,6 %)
De 16 a 17 anys	7 (0,9 %)	30 (3,8 %)	32 (5,2 %)	18 (2,5 %)	17 (1,9 %)	29 (3,5 %)	38 (4,6 %)
De 18 a 25 anys	52 (6,6 %)	40 (5 %)	34 (5,5 %)	54 (7,5 %)	84 (9,3 %)	70 (8,5 %)	63 (7,6 %)
De 26 a 40 anys	324 (41,4 %)	262 (32,9 %)	195 (31,7 %)	178 (24,7 %)	295 (32,5 %)	200 (24,2 %)	174 (21,1 %)
De 41 a 60 anys	300 (38,3 %)	325 (40,8 %)	248 (40,3 %)	331 (46 %)	372 (41 %)	369 (44,7 %)	364 (44,2 %)
Més de 60 anys	93 (11,9 %)	100 (12,6 %)	83 (13,5 %)	117 (16,2 %)	123 (13,6 %)	122 (14,8 %)	137 (16,6 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 18. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'opiacis en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	3 (0,5 %)	10 (1,8 %)	5 (1,2 %)	8 (1,6 %)	6 (0,9 %)	6 (1 %)	6 (1 %)
De 16 a 17 anys	6 (1 %)	7 (1,2 %)	12 (2,8 %)	4 (0,8 %)	9 (1,4 %)	10 (1,7 %)	11 (1,9 %)
De 18 a 25 anys	40 (6,9 %)	30 (5,3 %)	22 (5,1 %)	36 (7,3 %)	65 (10 %)	58 (9,9 %)	48 (8,4 %)
De 26 a 40 anys	255 (44,3 %)	219 (38,9 %)	152 (35,5 %)	135 (27,4 %)	226 (34,8 %)	155 (26,5 %)	139 (24,3 %)
De 41 a 60 anys	236 (41 %)	260 (46,2 %)	196 (45,8 %)	258 (52,4 %)	293 (45,1 %)	302 (51,6 %)	302 (52,7 %)
Més de 60 anys	34 (5,9 %)	36 (6,4 %)	36 (8,4 %)	50 (10,2 %)	50 (7,7 %)	53 (9,1 %)	66 (11,5 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 19. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'opiacis en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	2 (1 %)	28 (12 %)	13 (7 %)	13 (5,7 %)	9 (3,5 %)	29 (12 %)	40 (16 %)
De 16 a 17 anys	1 (0,5 %)	23 (9,9 %)	20 (10,7 %)	14 (6,1 %)	8 (3,1 %)	19 (7,9 %)	27 (10,8 %)
De 18 a 25 anys	12 (5,8 %)	10 (4,3 %)	12 (6,4 %)	18 (7,9 %)	19 (7,4 %)	12 (5 %)	15 (6 %)
De 26 a 40 anys	69 (33,3 %)	43 (18,5 %)	43 (23 %)	43 (18,9 %)	69 (26,8 %)	45 (18,7 %)	35 (14 %)
De 41 a 60 anys	64 (30,9 %)	65 (27,9 %)	52 (27,8 %)	73 (32 %)	79 (30,7 %)	67 (27,8 %)	62 (24,8 %)
Més de 60 anys	59 (28,5 %)	64 (27,5 %)	47 (25,1 %)	67 (29,4 %)	73 (28,4 %)	69 (28,6 %)	71 (28,4 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

6.3 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'estimulants en funció de l'edat i del sexe

Taula 20. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum d'estimulants en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	8 (1,6 %)	6 (1 %)	14 (2,5 %)	13 (2,2 %)	22 (3 %)	10 (1,2 %)	17 (2,1 %)
De 16 a 17 anys	14 (2,7 %)	18 (3,1 %)	9 (1,6 %)	12 (2 %)	11 (1,5 %)	13 (1,6 %)	14 (1,7 %)
De 18 a 25 anys	101 (19,8 %)	115 (19,6 %)	103 (18,6 %)	99 (16,7 %)	132 (17,8 %)	153 (18,7 %)	192 (23,8 %)
De 26 a 40 anys	200 (39,1 %)	244 (41,6 %)	265 (47,7 %)	283 (47,8 %)	326 (43,9 %)	405 (49,4 %)	349 (43,3 %)
De 41 a 60 anys	156 (30,5 %)	173 (29,5 %)	138 (24,9 %)	174 (29,4 %)	232 (31,2 %)	217 (26,5 %)	221 (27,4 %)
Més de 60 anys	32 (6,3 %)	30 (5,1 %)	23 (4,1 %)	11 (1,9 %)	19 (2,6 %)	20 (2,4 %)	13 (1,6 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 21. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum d'estimulants en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	4 (1,2 %)	5 (1,2 %)	6 (1,5 %)	3 (0,6 %)	8 (1,4 %)	2 (0,3 %)	8 (1,3 %)
De 16 a 17 anys	2 (0,6 %)	9 (2,1 %)	3 (0,7 %)	3 (0,6 %)	7 (1,3 %)	8 (1,2 %)	9 (1,4 %)
De 18 a 25 anys	63 (18,6 %)	77 (18 %)	71 (17,2 %)	76 (16,4 %)	85 (15,4 %)	102 (15,3 %)	142 (22,8 %)
De 26 a 40 anys	151 (44,5 %)	200 (46,7 %)	221 (53,5 %)	232 (50 %)	266 (48,1 %)	367 (55,1 %)	300 (48,2 %)
De 41 a 60 anys	110 (32,4 %)	123 (28,7 %)	100 (24,2 %)	144 (31 %)	177 (32 %)	173 (26 %)	155 (24,9 %)
Més de 60 anys	9 (2,7 %)	13 (3 %)	9 (2,2 %)	6 (1,3 %)	9 (1,6 %)	12 (1,8 %)	9 (1,4 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 22. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal està relacionat amb el consum d'estimulants en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	4 (2,3 %)	1 (0,6 %)	8 (5,6 %)	10 (7,8 %)	14 (7,4 %)	8 (5,2 %)	9 (4,9 %)
De 16 a 17 anys	12 (7 %)	9 (5,7 %)	6 (4,2 %)	9 (7 %)	4 (2,1 %)	5 (3,2 %)	5 (2,7 %)
De 18 a 25 anys	38 (22,1 %)	38 (23,9 %)	32 (22,5 %)	23 (18 %)	47 (24,7 %)	51 (33,1 %)	50 (27,3 %)
De 26 a 40 anys	49 (28,5 %)	44 (27,7 %)	44 (31 %)	51 (39,8 %)	60 (31,6 %)	38 (24,7 %)	49 (26,8 %)
De 41 a 60 anys	46 (26,7 %)	50 (31,4 %)	38 (26,8 %)	30 (23,4 %)	55 (28,9 %)	44 (28,6 %)	66 (36,1 %)
Més de 60 anys	23 (13,4 %)	17 (10,7 %)	14 (9,9 %)	5 (3,9 %)	10 (5,3 %)	8 (5,2 %)	4 (2,2 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

6.4 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'al·lucinògens en funció de l'edat i del sexe

Taula 23. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'al·lucinògens en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	5 (6 %)	6 (7,8 %)	1 (1,8 %)	4 (6,7 %)	0 (0 %)	1 (1,4 %)	1 (1,3 %)
De 16 a 17 anys	6 (7,1 %)	8 (10,4 %)	1 (1,8 %)	2 (3,3 %)	2 (2,9 %)	4 (5,7 %)	3 (3,8 %)
De 18 a 25 anys	25 (29,8 %)	22 (28,6 %)	17 (30,9 %)	18 (30 %)	17 (24,3 %)	16 (22,9 %)	23 (29,5 %)
De 26 a 40 anys	27 (32,1 %)	24 (31,2 %)	21 (38,2 %)	19 (31,7 %)	24 (34,3 %)	26 (37,1 %)	35 (44,9 %)
De 41 a 60 anys	16 (19 %)	16 (20,8 %)	14 (25,5 %)	15 (25 %)	24 (34,3 %)	17 (24,3 %)	14 (17,9 %)
Més de 60 anys	5 (6 %)	1 (1,3 %)	1 (1,8 %)	1 (1,7 %)	3 (4,3 %)	6 (8,6 %)	2 (2,6 %)

* S'hi han exclòs les urgències amb edat o sexe desconeguts.

Taula 24. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'al·lucinògens en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	3 (4,5 %)	1 (2,2 %)	1 (2,9 %)	2 (4,7 %)	0 (0 %)	1 (1,7 %)	1 (1,7 %)
De 16 a 17 anys	6 (9,1 %)	4 (8,9 %)	1 (2,9 %)	2 (4,7 %)	2 (4,3 %)	3 (5,2 %)	1 (1,7 %)
De 18 a 25 anys	19 (28,8 %)	11 (24,4 %)	9 (25,7 %)	16 (37,2 %)	11 (23,4 %)	14 (24,1 %)	16 (27,6 %)
De 26 a 40 anys	23 (34,8 %)	20 (44,4 %)	13 (37,1 %)	10 (23,3 %)	16 (34 %)	25 (43,1 %)	27 (46,6 %)
De 41 a 60 anys	12 (18,2 %)	9 (20 %)	11 (31,4 %)	12 (27,9 %)	18 (38,3 %)	13 (22,4 %)	12 (20,7 %)
Més de 60 anys	3 (4,5 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (3,4 %)	1 (1,7 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 25. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'al·lucinògens en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	2 (11,1 %)	5 (15,6 %)	0 (0 %)	2 (11,8 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
De 16 a 17 anys	0 (0 %)	4 (12,5 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (8,3 %)	2 (10 %)
De 18 a 25 anys	6 (33,3 %)	11 (34,4 %)	8 (40 %)	2 (11,8 %)	6 (26,1 %)	2 (16,7 %)	7 (35 %)
De 26 a 40 anys	4 (22,2 %)	4 (12,5 %)	8 (40 %)	9 (52,9 %)	8 (34,8 %)	1 (8,3 %)	8 (40 %)
De 41 a 60 anys	4 (22,2 %)	7 (21,9 %)	3 (15 %)	3 (17,6 %)	6 (26,1 %)	4 (33,3 %)	2 (10 %)
Més de 60 anys	2 (11,1 %)	1 (3,1 %)	1 (5 %)	1 (5,9 %)	3 (13 %)	4 (33,3 %)	1 (5 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

6.5 Urgències hospitalàries ateses relacionades amb el consum d'altres substàncies psicoactives en funció de l'edat i del sexe

Taula 26. Urgències hospitalàries* ateses en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'altres substàncies psicoactives en funció de l'edat

Edat	Total 2018	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
De 12 a 15 anys	24 (1,6 %)	22 (1,4 %)	15 (1,2 %)	18 (1,3 %)	20 (1,1 %)	33 (1,7 %)	27 (1,2 %)
De 16 a 17 anys	34 (2,2 %)	32 (2,1 %)	34 (2,8 %)	24 (1,7 %)	38 (2,1 %)	45 (2,3 %)	50 (2,3 %)
De 18 a 25 anys	263 (17,3 %)	285 (18,7 %)	167 (13,8 %)	300 (21,1 %)	338 (19 %)	428 (22,3 %)	500 (23,1 %)
De 26 a 40 anys	636 (42 %)	603 (39,5 %)	499 (41,3 %)	540 (38 %)	683 (38,3 %)	723 (37,6 %)	875 (40,4 %)
De 41 a 60 anys	494 (32,6 %)	523 (34,3 %)	440 (36,4 %)	472 (33,2 %)	626 (35,1 %)	604 (31,4 %)	636 (29,4 %)
Més de 60 anys	62 (4,1 %)	61 (4 %)	51 (4,2 %)	65 (4,6 %)	71 (4 %)	81 (4,2 %)	72 (3,3 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 27. Urgències hospitalàries* ateses entre els homes en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'altres substàncies psicoactives en funció de l'edat

Edat	Homes 2018	Homes 2019	Homes 2020	Homes 2021	Homes 2022	Homes 2023	Homes 2024
De 12 a 15 anys	12 (1 %)	9 (0,8 %)	9 (1 %)	6 (0,6 %)	6 (0,5 %)	10 (0,7 %)	7 (0,4 %)
De 16 a 17 anys	27 (2,3 %)	19 (1,7 %)	20 (2,2 %)	13 (1,2 %)	21 (1,6 %)	22 (1,5 %)	29 (1,7 %)
De 18 a 25 anys	196 (16,9 %)	212 (18,5 %)	128 (14,1 %)	237 (22,4 %)	249 (18,9 %)	336 (22,9 %)	377 (22,5 %)
De 26 a 40 anys	517 (44,6 %)	474 (41,4 %)	389 (42,9 %)	420 (39,7 %)	533 (40,5 %)	585 (39,9 %)	707 (42,2 %)
De 41 a 60 anys	369 (31,8 %)	401 (35 %)	337 (37,2 %)	358 (33,8 %)	469 (35,7 %)	466 (31,7 %)	507 (30,2 %)
Més de 60 anys	36 (3,1 %)	29 (2,5 %)	21 (2,3 %)	23 (2,2 %)	32 (2,4 %)	43 (2,9 %)	44 (2,6 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.

Taula 28. Urgències hospitalàries* ateses entre les dones en les quals el diagnòstic principal estava relacionat amb el consum d'altres substàncies psicoactives en funció de l'edat

Edat	Dones 2018	Dones 2019	Dones 2020	Dones 2021	Dones 2022	Dones 2023	Dones 2024
De 12 a 15 anys	12 (3,4 %)	13 (3,4 %)	6 (2 %)	12 (3,3 %)	14 (3 %)	23 (5,1 %)	20 (4,1 %)
De 16 a 17 anys	7 (2 %)	13 (3,4 %)	14 (4,6 %)	11 (3 %)	17 (3,6 %)	23 (5,1 %)	21 (4,3 %)
De 18 a 25 anys	67 (18,8 %)	73 (19,1 %)	39 (12,9 %)	63 (17,5 %)	89 (19,1 %)	92 (20,4 %)	123 (25,2 %)
De 26 a 40 anys	119 (33,4 %)	129 (33,8 %)	110 (36,3 %)	119 (33 %)	150 (32,2 %)	138 (30,5 %)	168 (34,4 %)
De 41 a 60 anys	125 (35,1 %)	122 (31,9 %)	103 (34 %)	114 (31,6 %)	157 (33,7 %)	138 (30,5 %)	129 (26,4 %)
Més de 60 anys	26 (7,3 %)	32 (8,4 %)	30 (9,9 %)	42 (11,6 %)	39 (8,4 %)	38 (8,4 %)	28 (5,7 %)

* S'hi han exclòs les urgències d'edat o de sexe desconeguts.