

Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

Any 2023

Octubre 2025



**Generalitat
de Catalunya**

Alguns drets reservats

© 2025, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina [web de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Edita:

Secretaria de Salut Pública.

Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques.

Primera edició:

Barcelona, octubre de 2025.

Assessorament editorial:

Gabinet del Conseller. Serveis editorials.

Assessorament lingüístic:

Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut.

Sumari

1	Introducció	5
2	Descripció de les morts RASUPSI a Catalunya	7
2.1	Nombre de morts a Catalunya.....	7
2.2	Distribució geogràfica de les morts RASUPSI	8
2.3	Sexe i edat de les persones mortes de les morts RASUPSI	9
2.4	Procedència del cadàver	13
2.5	Signes de venipunció	14
2.6	Morts RASUPSI identificades com a morts per a una patologia prèvia	15
2.7	Presència d'anticossos positius pel VIH.....	15
2.8	Presència d'anticossos positius pel VHC	15
2.9	Evidències de suïcidi	15
2.10	Trastorns mentals	16
3	Descripció de les substàncies detectades a les toxicologies de les morts RASUPSI a Catalunya l'any 2023	17
3.1	Substàncies	17
3.2	Combinacions substàncies.....	19
3.3	Metadona.....	20
4	Annex.....	22

Glossari de sigles

ASPB	Agència de Salut Pública de Barcelona
EDDP	Metabòlit de la metadona (2-etilidin-1, 5-dimetil-3, 3-difenolpirrolidina)
EUDA	European Union Drugs Agency
PNSD	Pla Nacional sobre Drogues
RASUPSI	Reacció aguda a substàncies psicoactives
VIH	Virus de la immunodeficiència humana

1 Introducció

L'Agència Europea sobre Drogues (EUDA), conjuntament amb els seus estats membres, utilitza cinc indicadors principals amb la finalitat d'establir una vigilància epidemiològica del consum de substàncies psicoactives amb potencial addictiu i de les seves conseqüències. Un d'aquests indicadors és el de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives (RASUPSI). Sovint se les coneix com a morts per sobredosi, tot i que la intoxicació aguda no ha de per què ser l'única causa.

A la ciutat de Barcelona, aquest indicador ha estat recollit des dels anys noranta per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), gràcies a la col·laboració que manté amb l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). Des del 2017, amb la concentració de l'activitat de l'IMLCFC en sis divisions i seus, s'ha pogut estendre aquest indicador a tot el territori de Catalunya.

L'indicador de mortalitat RASUPSI està basat en la definició i el mètode utilitzats pel Pla Nacional sobre Drogues (PNSD) i consensuat amb les Comunitats Autònomes, en consonància amb la definició i els mètodes proposats per l'EUDA. Dins d'aquest indicador s'engloben les morts relacionades amb el consum de substàncies psicoactives, excloent-ne l'alcohol, tret del cas que es presenti en combinació amb alguna altra substància psicoactiva. Fins a l'any 2022, l'edat també era un criteri d'inclusió i només es consideraven les morts RASUSPI de les persones d'entre 10 i 65 anys. Tanmateix, des d'aquest últim any, s'inclouen totes les morts RASUPSI de les persones majors de 10 anys. Per tant, la definició d'una mort RASUPSI engloba els punts següents:

- Està provocada pel consum recent d'alguna substància psicoactiva.
- El consum d'aquesta substància és de caràcter no mèdic.
- El consum és intencional, ja sigui per a la cerca d'efectes psíquics o per la dependència que ha generat, o bé amb propòsit suïcida.

Totes les morts considerades dins d'aquest indicador són morts que han requerit una investigació forense i, per tant, es recullen a les diferents seus de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. La recollida d'aquest conjunt de dades i la definició de cas es fan seguint el Protocol de l'indicador mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives de l'Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, en la seva actualització del 2003.

Les dades que es recullen s'agrupen segons els conceptes següents:

- Dades sociodemogràfiques, sexe i edat, de la persona.


- Variables sociodemogràfiques relacionades amb la mort, com són la província de defunció, i la data defunció.
- Circumstàncies relacionades amb la mort.
- Variables clinicopatològiques relacionades amb l'èxitus.
- Dades toxicològiques relacionades amb les substàncies psicoactives trobades a les mostres forenses.

2 Descripció de les morts RASUPSI a Catalunya

2.1 Nombre de morts a Catalunya

L'any 2023 a Catalunya hi va haver un total de 278 morts RASUPSI (210 homes; 68 dones). Aquesta xifra, 278 morts RASUPSI, representa el nombre màxim de morts RASUPSI de tota la sèrie històrica, 2017-2023. En gran part, aquest increment està explicat per les modificacions dutes a terme en els criteris d'inclusió de l'indicador, incloent-hi també les persones majors de 65 anys mortes per reaccions agudes a substàncies psicoactives. Entre les morts RASUPSI de l'any 2023, 22 persones (9 dones i 13 homes) eren majors de 65 anys, la qual cosa representa un 8% del total de les morts (figura 1).

Figura 1. Evolució del nombre de morts RASUPSI per anys a tot Catalunya (2017-2023)




Cal tenir en compte a l'hora de valorar tota la sèrie històrica que l'any 2023 hi va haver 22 persones majors de 65 anys que van estar incloses pels canvis de criteris d'inclusió.

En tot cas, l'increment de morts no només està explicat pels canvis de criteris d'inclusió de l'edat. Si no comptabilitzem les persones majors de 65 anys, el nombre de morts va augmentar un 27% respecte al 2022 i un 61% respecte al 2021. Hi ha, però, altres possibles raons que poden haver influït en aquest increment, la principal és la major inclusió de morts on hi ha consum concomitant d'alcohol i benzodiazepines sense cap altra explicació de la mort segons la investigació forense, fet que s'ha produït sobretot en la recollida a Barcelona ciutat i comarques en aquest any 2023. Per altra banda, cal recordar que la pandèmia, a més d'haver tingut impacte en el sistema sanitari, en la disponibilitat de substàncies, així com en les pràctiques de consum, també va poder influir en els procediments d'actuació forense. Per tant, aquest increment en el nombre de

casos s'ha d'interpretar amb cura i continuar monitorant l'evolució del nombre de morts RASUPSI.

Si s'analitza la distribució de les morts de l'any 2023 segons els mesos (figura 2), s'observa que el mes de juny i agost van ser els mesos que van concentrar el major nombre de morts, 28 i 32 morts respectivament. Això implica que durant aquests mesos hi va haver, de mitjana, una mort RASUPSI al dia.

Figura 2. Nombre de morts RASUPSI per mes a tot Catalunya (2023)




2.2 Distribució geogràfica de les morts RASUPSI

Les diferències en l'oferta i demanda de substàncies, així com les diferències sociodemogràfiques que pot haver-hi entre els diferents territoris de Catalunya, justifica la necessitat d'analitzar aquest indicador segons les províncies de defunció.

L'any 2023, més del 77% (n = 215) de les morts es van dur a terme a la província de Barcelona, un 9,4% (n = 26) a la província de Tarragona, un 9% (n = 25) a Girona i un 4% a Lleida (n = 12) (figura 3). Aquests percentatges mostren un augment considerable de la proporció de morts recollides a la província de Barcelona i un descens de la proporció de les morts recollides, sobretot, a la província de Lleida. Cal assenyalar que, com hem esmentat més amunt, en la recollida de dades a la província de Barcelona es van produir alguns canvis que poden explicar, en part, l'augment del nombre de morts observades a Barcelona.

Figura 3. Evolució del nombre de morts RASUPSI, per província (2017-2023)



A la taula 1 es poden veure les taxes de morts RASUPSI per cada 100.000 habitants a cadascuna de les províncies de Catalunya i el total d'aquesta. Es pot comprovar que la taxa de mortalitat més alta va ser a la província de Barcelona amb 3,71 morts RASUPSI per cada 100.000 habitants, mentre que la més baixa va ser a Lleida amb 2,68 morts RASUPSI per cada 100.000 habitants. Girona i Tarragona van resultar tenir valors molt semblants, 3,09 i 3,06 morts per cada 100.000 habitants respectivament. Conseqüentment, la taxa total de Catalunya es va situar en 3,52 morts per cada 100.000 habitants.

Taula 1. Taxa de mortalitat RASUPSI, per província (2023)


Província	Morts RASUPSI	Població	Morts per 100.000 habitants
Barcelona	215	5.797.356	3,71
Girona	25	808.672	3,09
Lleida	12	447.343	2,68
Tarragona	26	848.592	3,06
Catalunya	278	7.901.963	3,52

2.3 Sexe i edat de les persones mortes de les morts RASUPSI

A les figures 4 i 5 s’observa l’evolutiu del nombre absolut de morts RASUPSI estratificat per sexe i la distribució del percentatge de les morts segons sexe al llarg de tota la sèrie històrica. L’any 2023 va ser l’any amb major nombre absolut i relatiu de dones. Fet que podria estar relacionat, en part, amb l’eliminació del

criteri de límit d'edat, ja que entre les persones majors de 65 anys, la diferència de casos entre sexes no va ser tan diferent, 59% (n = 13) homes vs. 41% (n = 9) dones (figura 4).


Figura 4. Evolució del nombre de morts RASUPSI, per sexe (2017-2023)



El 2023 hi va haver 9 dones i 13 homes majors de 65 anys. Dades que han de ser considerades a l'hora de fer comparacions amb la sèrie històrica.


Pel que fa al sexe de les persones que han mort per RASUPSI (figura 5), de la mateixa manera que amb la resta d'indicadors relacionats amb substàncies, s'observa un important predomini de la presència dels homes (75,5%) respecte a les dones (24,5%).

Figura 5. Evolució del nombre de morts RASUPSI, per sexe (2017-2023)



L'edat mitjana de les persones ha estat de 48,8 anys (desviació estàndard de 12,2 anys; mediana de 49 anys). A la figura 6, es presenta una gràfica evolutiva de la distribució dels grups d'edat, la qual mostra un envelliment de les persones, que no només està explicat per l'eliminació del límit d'edat.


Figura 6. Evolució del nombre de morts RASUPSI, per grups d'edat (2017-2023)



El 2023 la mitjana d'edat en el cas de les dones va ser de 51,1 (desviació estàndard de 13,1 anys; mediana de 51 anys). Més del 54% (n = 37) de les dones tenien més de 50 anys. Concretament, un 31% tenia entre 50-59 anys, un 9% entre 60 i 65 anys i un 13% més de 65 anys. Per altra banda, un 7,5% (n = 5) de les dones eren menors de 30 anys.

En el cas dels homes, la mitjana d'edat va ser de 48,1 anys (desviació estàndard d'11,8 anys; mediana de 48 anys). El 56% eren menors de 50 anys, la gran majoria, més del 31%, tenien entre 40 i 49 anys, un 19% entre 30 i 39 anys i un 5% eren menors de 30 anys (figura 7).

Figura 7. Evolució del nombre de morts RASUPSI, per grups d'edat i sexe (2023)




Per interpretar els resultats és important considerar que només el 24,5% (n = 68) de les morts RASUPSI de l'any 2023 corresponen a dones.

2.4 Procedència del cadàver


Al llarg de la sèrie històrica de l'indicador, la procedència més freqüent del cadàver ha estat el domicili (figura 8), i concretament l'any 2023 es va assolir el major percentatge de morts amb aquesta procedència, amb un 71,8% (n = 199) del total. Si bé, des de l'any 2019 s'observava un increment del nombre de casos procedents del carrer, aquest últim any decreix el percentatge al 9% (n = 25). En la resta de casos, la procedència ha estat un hospital en el 7,2% (n = 20); només en el 3,6% (n = 10) la procedència ha estat un hotel i no hi ha hagut cap cas a les presons.

Figura 8. Evolució del nombre de morts RASUPSI, segons la procedència del cadàver (2017-2023)



Si s'analitza la procedència de les morts RASUPSI segons el sexe (figura 9), entre les dones s'observa un percentatge major de morts procedents del domicili, 80,6% (n = 54) vs. 69% (n = 145); i un percentatge menor de morts procedents del carrer, amb un 6% (n = 4) dels casos, enfront del 10% (n = 21) comptabilitzat entre els homes.

Figura 9. Nombre de morts RASUPSI segons la procedència del cadàver, per sexe (2023)



A continuació, es presenten un seguit de variables que podrien contribuir a explicar la causa i/o circumstància de la mort. Les variables que s'analitzen són: la presència de signes de venipunció recents, l'evidència de suïcidi, el diagnòstic de trastorns mentals i d'altres aspectes clínics com la patologia prèvia, la presència d'anticossos de VIH i VHC (taula 2). Disposar d'aquesta informació pot ser de gran utilitat per conèixer els factors de riscos i les circumstàncies associades amb les morts RASUPSI, la qual cosa pot permetre dissenyar programes i estratègies dirigides a les persones amb major risc de patir una mort RASUPSI, evitant així morts prevenibles.

No obstant això, cal assenyalar que són variables que molt sovint presenten valors desconeguts, perquè la seva recollida i notificació es veu condicionada per la falta d'informació que moltes vegades envolten a les morts RASUPSI. Per tant, són variables que presenten un nombre elevat de desconeguts.

2.5 Signes de venipunció

Pel que fa als signes de venipunció recents (menys d'una setmana), al llarg de la sèrie històrica se n'observa un descens (taula 2). Durant el 2023, hi apareixen en el 7,6% (n = 21) dels casos (8,1% homes; 5,9% dones). Entre les persones amb signes de venipunció, 5 d'elles van presentar anticossos pel VIH.

També s'observa que la gran majoria, concretament 17 dels 21 casos van ser a la província de Barcelona.

2.6 Morts RASUPSI identificades com a morts per a una patologia prèvia

Durant el 2023, un 23% (n = 64) de les morts RASUPSI van ser identificades com a morts per complicació d'una patologia prèvia. Entre les dones s'observa que el 8,8% (n = 6) presentava patologia prèvia a la mort, i, entre els homes, el 27,6% (n = 58). A la taula 2 es mostren els percentatges evolutius de la presència de patologia prèvia segons els diferents anys, i s'assenyala que el 2020, el 45% de les morts presentaven patologia prèvia.

2.7 Presència d'anticossos positius pel VIH

En un 6% (n = 18) (7,4% dones; 6,2% homes) constava la presència d'anticossos positius pel VIH (taula 2). Són les prevalences més baixes observades durant tota la sèrie històrica 2017-2023. La gran majoria dels casos amb antiVIH, concretament 14 casos, es van trobar a la província de Barcelona.

També resulta rellevant que d'aquestes 18 persones, 5 presentaven antecedents de venipunció.

2.8 Presència d'anticossos positius pel VHC

Per primera vegada, s'analitza la presència d'anticossos positius pel VHC. Un total de 19 persones (13 homes i 6 dones), és a dir un 7% (8,8% dones, 6,2% homes) presentaven anticossos positius pel VHC i un 37% d'aquests (n = 7) també presentaven anticossos positius pel VIH (taula 2).

2.9 Evidències de suïcidi

De tota la sèrie històrica, l'any 2023 és quan s'observa la major prevalença de morts amb evidències de suïcidi (vegeu la taula 2). No obstant això, durant l'històric de l'evolució hi hagi hagut canvis a l'hora de recollir aquesta variable i això ha pogut interferir amb la notificació de l'evidència de suïcidi.

Durant l'any 2023, una de cada 4 morts RASUPSI estaven relacionades amb el suïcidi, concretament un 25,9% (n = 72) de les morts. S'observen grans diferències segons el sexe. Un 50% (n = 34) de les dones van presentar evidències de suïcidi, mentre que, entre els homes, només va ser un 18% (n = 38). Els hipnosedants, els antidepressius i l'alcohol van ser les substàncies amb major presència.

Cal tenir en compte que aquest any a la ciutat de Barcelona i a les seves comarques el canvi en la metodologia de recollida pot haver influït en aquests resultats.

2.10 Trastorns mentals

Per primera vegada, es va recollir el diagnòstic de trastorns mentals. Més del 51% (n = 142) de les morts RASUPSI, presentaven diagnòstics associats amb una mala salut mental, i aquest percentatge va ser superior entre les dones, 60% (n = 41) vs. 48% (n = 101).

Un 37% (n = 53) de les persones amb morts RASUPSI amb presència de diagnòstics de salut van presentar grans evidències de suïcidi. Entre les dones aquest percentatge del 63% (n = 26) i entre els homes del 27% (n = 27).

Taula 2. Taula resum de les variables obtingudes en l'anàlisi de mortalitat RASUPSI (2017-2023)

Variables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre de defuncions	200	205	226	182	159	201	278
Evidències de consum recent (%)							
Sí	52	45,4	46,9	67,6	57,6	47,8	56,1
Signes de venipunció (%)							
Sí	15,5	12,2	17,3	10,4	10,6	7,7	7,6
Mort causada per patologia agreujada pel consum de substàncies (%)							
Sí	29	30,7	27	46,7	31,8	17,4	23
Anticossos contra el VIH (%)							
Positiu	8	7,3	6,6	7,7	10,0	7,7	6
Evidències de suïcidi (%)							
Sí	10	6,3	8,4	11	12,9	17,4	25,9

3 Descripció de les substàncies detectades a les toxicologies de les morts RASUPSI a Catalunya l'any 2023

3.1 Substàncies


A la figura 10 i la taula 3 es presenten les prevalences de les substàncies trobades a les anàlisis toxicològiques de les morts RASUPSI durant des del 2017 fins al 2023. Es van trobar un total de 74 substàncies diferents, que han estat categoritzades en els següents grans grups de substàncies: alcohol, cocaïna, estimulants (amfetamínics), cànnabis, opioides, hipnosedants, antidepressius i altres fàrmacs.

A la categoria d'opioïdes, a més d'incloure els casos amb presència d'opioïdes sense especificar i de metadona; també s'han inclòs fàrmacs opioïdes com la codeïna, la buprenorfina, el tapentadol, l'oxícodona i el fentanil. La categoria estimulants inclou la metamfetamina, l'MDMA, les amfetamines i els seus derivats. I per últim, la categoria d'altres, la qual inclou altres psicofàrmacs com són els antipsicòtics, anestèsics i antiepilèptics.

L'any 2023, les substàncies més freqüentment detectades en les morts RASUPSI a Catalunya van ser la cocaïna (55,8%, n=155) i els hipnosedants (53,6%, n=149). La tercera substància més present ha estat l'alcohol: en 1 de cada 2 morts es va detectar la seva presència. Per altra banda, els opioides, per segon any consecutiu, no es troben entre les tres substàncies amb major presència, un 41% (n = 115) van presentar presència d'opioïdes, i d'aquests, un 40% presentaven metadona. Respecte a l'evolució temporal destaca el percentatge de morts amb detecció de cocaïna, que és el més baix de la sèrie històrica i presenta una baixada del 16% respecte al 2022. Destaca també l'increment de la detecció d'antidepressius (32,4%), el valor més alt de la sèrie.

La resta de substàncies tenen una presència menor, tot i que un 25% (n = 70) presentaven presència d'altres fàrmacs psicofàrmacs. Un 17% (n = 47) presentaven cànnabis i només un 5% (n = 13) presentaven amfetamines o els seus derivats (estimulants).

Figura 10. Substàncies psicoactives trobades en les morts RASUPSI (2023)



N = 278. La categoria opiacis inclou: metadona (n = 46), tramadol (n = 37), opioides sense especificar (n = 34), fentanil (n = 15), heroïna (n = 5), tapentadol (n = 3), oxicodona (n = 2), buprenorfina i (n = 1). La categoria altres inclou fàrmacs antipsicòtics (n = 72), antiepilèptics (n = 3), ketamina (n = 2) i propofol (n = 2), PCP (n = 3) i lidocaina (n = 1). La categoria estimulants inclou: amfetamines (n = 10), metamfetamina (n = 7), MDMA (n = 6).


Taula 3. Evolució de les substàncies psicoactives trobades en les morts RASUPSI (2017-2023)

Droga (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cocaïna	63,1	67,0	69,2	62,6	62,4	66,0	55,8
Hipnosedants	58,1	55,0	53,1	48,4	52,7	51,9	53,6
Opioides	56,6	55,0	61,2	60,4	63,6	43,7	41,4
Alcohol	44,9	56,0	52,2	40,7	53,3	51,9	50,7
Antidepressiu	25,3	19,0	21,0	3,3	11,5	16,5	32,4
Estimulants / Amfetamínics	5,1	12,0	4,5	7,1	6,7	6,8	4,7
Cànnabis	16,2	28,5	25,0	16,5	18,8	10,2	16,9
Altres	27,3	27,5	22,3	4,4	16,4	18,0	25,2

Tal com passa amb la resta d'indicadors, s'observa un patró diferent de les substàncies trobades entre homes i dones (figura 11). Entre els homes, les drogues més presents han estat la cocaïna (63,3%), els hipnosedants (50%) i l'alcohol (51%). En canvi, entre les dones, les substàncies amb més presència han estat els hipnosedants (64,7%), els antidepressius (55,8%) i l'alcohol (50%). S'observen grans diferències en funció del sexe, la presència de cocaïna entre els homes, duplica la prevalença observada entre les dones (63,3% vs. 32,4). En

canvi, en el cas dels antidepressius s'observa el fenomen contrari, la prevalença de dones amb presència d'antidepressius, duplica la prevalença trobada entre els homes (55,9 vs. 24,8). En el cas dels hipnosedants també se n'observa una presència major entre les dones.

Figura 11. Substàncies psicoactives trobades en les morts RASUPSI segons sexe (2023)



3.2 Combinacions substàncies

Només en un 12% (n = 37) dels casos es va trobar una única substància a les anàlisis toxicològiques i entre aquests casos, la cocaïna era la substància amb major presència. A la resta de casos, és a dir, en més del 85% casos, es van trobar múltiples substàncies combinades. Concretament, tal com es pot observar a la taula A1 de l'annex, es van trobar 77 combinacions diferents de grans grups de substàncies (alcohol, cocaïna, cànnabis, hipnosedants, antidepressius, opioides, cànnabis, amfetamínics/estimulants i altres substàncies).

A més a més, gairebé la meitat dels casos, un 44%; presentaven la combinació de 4 o més grans grups de substàncies. Fet que assenyalava l'alta prevalença de policonsum entre les persones amb mort RASUPSI.

La taula A2 de l'annex recull la distribució, en termes absoluts i relatius, de les combinacions dels grans grups de substàncies segons sexe. Gairebé un 10% dels homes van presentar alcohol i cocaïna, sent la combinació més freqüent entre els homes. Entre les dones, en canvi, les combinacions més freqüents van ser antidepressius i hipnosedants, amb un 8,8%, i alcohol i hipnosedants, amb un 7,4%.

3.3 Metadona

La presència de metadona en els cossos es detecta a partir del metabòlit EDDP. Els resultats de l'any 2023 mostren que un 17% (n = 46) del total dels casos va donar positiu per a aquest metabòlit (figura 12). Si analitzem la presència d'EDDP entre les persones amb presència d'opioides (n = 115), s'observa que l'any 2023 va ser d'un 40%.

Dels casos que han presentat el metabòlit de la metadona a la sang, 41 eren homes (89%). Si fem l'anàlisi en funció del sexe (figura 13), s'observa que el 20% (n = 41) dels homes presentaven metabòlits de la metadona, mentre que en el cas de les dones, el percentatge baixava fins al 7,5% (n = 5).

Figura 12. Presència d'EDDP en mostres a Catalunya (2017-2023)





Figura 13. Presència d'EDDP en morts RASUPSI, per sexe (2023)



4 Annex

Taula A 1. Combinacions de grans grups de substàncies trobades als anàlisis toxicològics a l'any 2023.

Combinacions de grans grups de substàncies	N	%
Cocaïna	25	8,99
Alcohol, Cocaïna	23	8,27
Antidepressius, Hipnosedants	11	3,96
Alcohol, Hipnosedants	10	3,60
Hipnosedants, Cocaïna, Opioides	8	2,88
Alcohol, Altres, Antidepressius, Hipnosedants	7	2,52
Alcohol, Altres, Antidepressius, Hipnosedants, Opioides	7	2,52
Alcohol, Antidepressius, Hipnosedants	7	2,52
Alcohol, Cocaïna, Opioides	7	2,52
Cocaïna, Opioides	7	2,52
Cànnabis, Cocaïna	7	2,52
Alcohol, Antidepressius, Hipnosedants, Opioides	5	1,80
Alcohol, Hipnosedants, Cocaïna	6	2,16
Alcohol, Hipnosedants, Cocaïna, Opioides	6	2,16
Alcohol, Altres, Cocaïna	5	1,80
Altres, Antidepressius, Hipnosedants	5	1,80
Altres, Antidepressius, Hipnosedants, Opioides	5	1,80
Hipnosedants	5	1,80
Hipnosedants, Opioides	4	1,44
Cànnabis, Cocaïna, Opioides	5	1,80
Alcohol, Hipnosedants, Opioides	4	1,44
Alcohol, Opioides	4	1,44
Antidepressius, Hipnosedants, Opioides	4	1,44
Hipnosedants, Cocaïna	4	1,44
Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna, Opioides	4	1,44
Alcohol, Antidepressius, Hipnosedants, Cocaïna, Opioides	3	1,08
Alcohol, Antidepressius, Opioides	3	1,08
Alcohol, Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna	3	1,08
Alcohol, Cànnabis, Cocaïna	3	1,08

Combinacions de grans grups de substàncies	N	%
Altres, Hipnosedants	3	1,08
Altres, Hipnosedants, Cocaïna, Opioides	3	1,08
Opioides	3	1,08
Alcohol	2	0,72
Alcohol, Altres, Antidepressius	2	0,72
Alcohol, Altres, Antidepressius, Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna, Opioides	2	0,72
Alcohol, Altres, Antidepressius, Hipnosedants, Cànnabis, Opioides	2	0,72
Alcohol, Altres, Hipnosedants	2	0,72
Alcohol, Altres, Hipnosedants, Opioides	2	0,72
Alcohol, Altres, Opioides	2	0,72
Alcohol, Antidepressius, Cocaïna	2	0,72
Alcohol, Antidepressius, Cocaïna, Opioides	2	0,72
Alcohol, Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna, Opioides	2	0,72
Alcohol, Cànnabis, Opioides	2	0,72
Altres, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Cocaïna	2	0,72
Altres, Antidepressius, Hipnosedants, Cocaïna	2	0,72
Altres, Antidepressius, Hipnosedants, Cocaïna, Opioides	2	0,72
Altres, Antidepressius, Cocaïna	2	0,72
Altres, Hipnosedants, Opioides	2	0,72
Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants	2	0,72
Antidepressius, Cocaïna	2	0,72
Hipnosedants, Cànnabis, Opioides	2	0,72
Alcohol, Altres	1	0,36
Alcohol, Altres, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Cocaïna	1	0,36
Alcohol, Altres, Antidepressius, Hipnosedants, Cocaïna	1	0,36
Alcohol, Altres, Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Alcohol, Altres, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Alcohol, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants	1	0,36
Alcohol, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Cànnabis	1	0,36
Alcohol, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna	1	0,36
Alcohol, Antidepressius	1	0,36

Combinacions de grans grups de substàncies	N	%
Alcohol, Antidepressius, Hipnosedants, Cocaïna	1	0,36
Alcohol, Antidepressius, Hipnosedants, Cànnabis	1	0,36
Alcohol, Antidepressius, Cànnabis	1	0,36
Alcohol, Antidepressius, Cànnabis, Cocaïna	1	0,36
Alcohol, Hipnosedants, Cànnabis	1	0,36
Alcohol, Cànnabis	1	0,36
Altres, Antidepressius	1	0,36
Altres, Antidepressius, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Altres, Antidepressius, Cànnabis, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Altres, Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Altres, Cocaïna	1	0,36
Altres, Cànnabis, Cocaïna	1	0,36
Altres, Cànnabis, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Altres, Opioides	1	0,36
Amfetamina/Estimulants	1	0,36
Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Antidepressius	1	0,36
Antidepressius, Hipnosedants, Cocaïna	1	0,36
Antidepressius, Hipnosedants, Cocaïna, Opioides	1	0,36
Antidepressius, Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna	1	0,36
Antidepressius, Opioides	1	0,36
Hipnosedants, Cànnabis, Cocaïna	1	0,36
Cànnabis, Opioides	1	0,36

Taula A 2. Combinacions de grans grups de substàncies trobades als anàlisis toxicològics a l'any 2023 segons sexe.

Combinacions de grans grups de substàncies	Home (N)	Home (%)	Dona (N)	Dona (%)
Cocaïna	20	9.52	5	7.35
Alcohol, Cocaïna	20	9.52	3	4.41
Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	8	3.81	0	0.00
Alcohol, Altres, Antidepressiu, Hipnosedants, Opiacis	6	2.86	1	1.47

Combinacions de grans grups de substàncies	Home (N)	Home (%)	Dona (N)	Dona (%)
Alcohol, Cocaïna, Opiacis	6	2.86	1	1.47
Cànnabis, Cocaïna	6	2.86	1	1.47
Cocaïna, Opiacis	6	2.86	1	1.47
Alcohol, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	6	2.86	0	0.00
Antidepressiu, Hipnosedants	5	2.38	6	8.82
Alcohol, Hipnosedants	5	2.38	5	7.35
Alcohol, Altres, Cocaïna	5	2.38	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu, Hipnosedants	4	1.90	3	4.41
Alcohol, Cocaïna, Hipnosedants	4	1.90	2	2.94
Alcohol, Antidepressiu, Hipnosedants, Opiacis	4	1.90	1	1.47
Altres, Antidepressiu, Hipnosedants	4	1.90	1	1.47
Cànnabis, Cocaïna, Opiacis	4	1.90	1	1.47
Hipnosedants	4	1.90	1	1.47
Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	4	1.90	0	0.00
Cocaïna, Hipnosedants	4	1.90	0	0.00
Alcohol, Opiacis	3	1.43	1	1.47
Alcohol, Cànnabis, Cocaïna	3	1.43	0	0.00
Alcohol, Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants	3	1.43	0	0.00
Altres, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	3	1.43	0	0.00
Opiacis	3	1.43	0	0.00
Altres, Antidepressiu, Hipnosedants, Opiacis	2	0.95	3	4.41
Alcohol, Hipnosedants, Opiacis	2	0.95	2	2.94
Hipnosedants, Opiacis	2	0.95	2	2.94
Alcohol, Antidepressiu, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	2	0.95	1	1.47
Altres, Hipnosedants	2	0.95	1	1.47
Alcohol	2	0.95	0	0.00
Alcohol, Altres, Antidepressiu, Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	2	0.95	0	0.00
Alcohol, Altres, Hipnosedants	2	0.95	0	0.00
Alcohol, Altres, Opiacis	2	0.95	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu, Cocaïna	2	0.95	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu, Cocaïna, opiacis	2	0.95	0	0.00

Combinacions de grans grups de substàncies	Home (N)	Home (%)	Dona (N)	Dona (%)
Alcohol, Cànnabis, Amfetamina/Estimulants	2	0.95	0	0.00
Alcohol, Cànnabis, Opiacis	2	0.95	0	0.00
Altres, Antidepressiu, Cocaïna, Hipnosedants	2	0.95	0	0.00
Altres, Antidepressiu, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	2	0.95	0	0.00
Cànnabis, Hipnosedants, Opiacis	2	0.95	0	0.00
Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants	2	0.95	0	0.00
Alcohol, Altres, Antidepressiu, Hipnosedants	1	0.48	6	8.82
Antidepressiu, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	3	4.41
Alcohol, Antidepressiu, Opiacis	1	0.48	2	2.94
Alcohol, Altres, Antidepressiu	1	0.48	1	1.47
Alcohol, Altres, Antidepressiu, Cànnabis, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	1	1.47
Alcohol, Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	1	1.47
Altres, Antidepressiu, Cocaïna	1	0.48	1	1.47
Altres, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	1	1.47
Antidepressiu, Cocaïna	1	0.48	1	1.47
Alcohol, Altres	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Altres, Antidepressiu, Cocaïna, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Altres, Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Altres, Cocaïna, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Altres, Cocaïna, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu, Cànnabis	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu, Cànnabis, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu, Cocaïna, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Antidepressiu, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Cànnabis	1	0.48	0	0.00

Combinacions de grans grups de substàncies	Home (N)	Home (%)	Dona (N)	Dona (%)
Alcohol, Cànnabis, Cocaïna, Amfetamina/Estimulants	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Altres, Cànnabis, Cocaïna	1	0.48	0	0.00
Altres, Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Altres, Cànnabis, Cocaïna, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Altres, Cocaïna	1	0.48	0	0.00
Altres, Cocaïna, Amfetamina/Estimulants	1	0.48	0	0.00
Altres, Cocaïna, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Altres, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Antidepressiu, Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Antidepressiu, Cocaïna, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Cànnabis, Cocaïna, Hipnosedants	1	0.48	0	0.00
Cànnabis, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Cocaïna, Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Amfetamina/Estimulants	1	0.48	0	0.00
Amfetamina/Estimulants, Hipnosedants, Opiacis	1	0.48	0	0.00
Alcohol, Altres, Hipnosedants, Opiacis	0	0.00	2	2.94
Alcohol, Antidepressiu, Cànnabis, Cocaïna	0	0.00	1	1.47
Altres, Antidepressiu	0	0.00	1	1.47
Altres, Antidepressiu, Cànnabis, Cocaïna, Opiacis	0	0.00	1	1.47
Altres, Antidepressiu, Cocaïna, Opiacis	0	0.00	1	1.47
Antidepressiu	0	0.00	1	1.47
Antidepressiu, Cocaïna, Hipnosedants, Opiacis	0	0.00	1	1.47
Antidepressiu, Opiacis	0	0.00	1	1.47