

Registro

Análisis de los datos del Registro Español de Cirugía Cardíaca (RECC) 2021–2024[☆]

Lourdes Montero-Cruces^{a,*}, Rafael Rodríguez-Lecoq^b, José López-Menéndez^c, Fabrizio Sbraga^d, José C. Sureda-Barbosa^e, Juan J. Legarra-Calderón^f, Juan M. Gracia-Baena^g, Marta Matamala-Adell^h, José F. Valderrama-Marcosⁱ, Félix Gómez-Blasco^j, Nuria Arce-Ramos^k, Carlos E. Martín-López^l, Álvaro Pedraz-Prieto^m, Diego Macías-Rubioⁿ, Enrique Pérez-de la Sota^o, Alejandro Adsuar-Gómez^p, Mónica García-Bouza^q, Alejandro Crespo-de Hubsch^r, José A. Hernández-Campos^s, Jorge Rivas Oyarzabal^t, Pedro Lima-Cañadas^u, Stefano Urso^v, Carlota Salmerón-Menéndez^w, Pilar Gascón-García-Verdugo^x y Manuel Carnero-Alcázar^a

^a Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

^b Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España

^c Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España

^d Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

^e Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España

^f Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, España

^g Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España

^h Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España

ⁱ Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España

^j Servicio de Cirugía Cardíaca, Complejo Hospitalario de Navarra/Hospital San Pedro de Logroño, Navarra/La Rioja, España

^k Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España

^l Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, España

^m Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital General Gregorio Marañón, Madrid, España

ⁿ Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

^o Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

^p Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

^q Servicio de Cirugía Cardíaca, Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, España

^r Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España

^s Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario Hospiten Rambla, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, España

^t Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Quirón y Hospital Universitario La Luz, Madrid, España

^u Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo, España

^v Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España

^w Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España

^x Directora de Programas de la SECCE

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 8 de julio de 2025

Aceptado el 7 de agosto de 2025

On-line el 12 de septiembre de 2025

Palabras clave:

Cirugía cardiovascular

Cardiopatías adquiridas

Cirugía aorta

Cirugía valvular

Cirugía bypass coronario

RESUMEN

El Registro Español de Cirugía Cardíaca (RECC) constituye una herramienta esencial para la monitorización y el análisis de la práctica quirúrgica cardiovascular en España. Desde su implementación en 2021 hasta finales de 2024, se han incluido un total de 16.631 procedimientos, de los cuales 14.048 fueron cirugías cardíacas mayores. El análisis actual incluye datos de 23 centros con al menos 40 procedimientos registrados, lo que representa una muestra significativa, aunque no exhaustiva, de la actividad nacional. Durante 2024 se incrementó en un 81,7% el número de intervenciones incluidas en el RECC respecto al año previo. El EuroSCORE II, con una media del 5,4%, fue empleado como herramienta de estratificación del riesgo quirúrgico. Globalmente, mostró una buena capacidad discriminativa (área bajo la curva [AUC]: 0,787) en los pacientes de bajo riesgo, aunque su rendimiento fue limitado en subgrupos específicos como cirugía coronaria, sustitución valvular mitral, tricúspide y afección de la aorta. En términos de distribución, la cirugía valvular fue la más frecuente (53,0%), seguida de la coronaria aislada (25,4%) y la cirugía de la aorta (15,4%). La mortalidad global observada fue del 5,1% (índice de mortalidad ajustada al riesgo [IMAR]: 0,94), aunque se mantuvo por debajo de la estimada por EuroSCORE II en la mayoría de las categorías.

© 2025 Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la CC BY-NC-ND licencia (<http://creativecommons.org/licencias/by-nc-nd/4.0/>).

Abreviaturas: ACV, Accidente cerebrovascular; AKIN, Insuficiencia renal aguda; CABG, Cirugía de revascularización miocárdica; CEC, Circulación extracorpórea; CIV, Comunicación interventricular; EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ERC, Enfermedad renal crónica; HTA, Hipertensión arterial; IAM, Infarto agudo de miocardio; IMAR, Índice de mortalidad ajustada al riesgo; MIDCAB, Revascularización coronaria quirúrgica mínimamente invasiva; RECC, Registro Español de Cirugía Cardíaca; SECCE, Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular; TAVI, Implante transcáteter valvular aórtico; TCL, Tronco coronario izquierdo; UCI, Unidad de cuidados intensivos; VI, Ventrículo izquierdo.

[☆] El presente artículo ha sido realizado por el comité científico del RECC y validado por la SECCE para su publicación.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: l.monterocr@gmail.com (L. Montero-Cruces).

<https://doi.org/10.1016/j.circv.2025.08.002>

1134-0096/© 2025 Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la CC BY-NC-ND licencia (<http://creativecommons.org/licencias/by-nc-nd/4.0/>).

Data analysis from the Spanish Registry of Cardiac Surgery (RECC) 2021–2024

A B S T R A C T

Keywords:

Cardiovascular surgery
Acquired heart diseases
Aortic surgery
Valve surgery
Coronary artery bypass surgery

The Spanish Cardiac Surgery Registry (RECC) is an essential tool for monitoring and analyzing cardiovascular surgical practice in Spain. Since its implementation in 2021 through the end of 2024, a total of 16631 procedures have been recorded, of which 14048 were major cardiac surgeries. The current analysis includes data from 23 centers that reported at least 40 procedures, representing a significant –though not exhaustive– sample of national activity. During 2024, the number of interventions included in the RECC increased by 81,7% compared to the previous year. The EuroSCORE II, with a mean of 5,4%, was used as a tool for preoperative risk stratification. Overall, it demonstrated good discriminative ability (AUC 0,787) in low-risk patients, although its performance was limited in specific subgroups such as coronary surgery, mitral valve replacement, tricuspid valve surgery, and aortic pathology. In terms of procedure distribution, valve surgery was the most common (53,0%), followed by isolated coronary surgery (25,4%) and aortic surgery (15,4%). The overall observed mortality was 5,1% (risk-adjusted mortality ratio, IMAR 0,94), rising slightly to 5,5% in 2024 (IMAR 1,08), although it remained below the mortality predicted by EuroSCORE II in most categories.

© 2025 Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introducción

El presente artículo resume los datos introducidos en el Registro Español de Cirugía Cardíaca (RECC)¹ desde su implementación en 2021 hasta finales de 2024. Este registro representa una iniciativa fundamental para el análisis detallado de la actividad quirúrgica en nuestro país, permitiendo la evaluación de indicadores clave en términos de seguridad, efectividad y calidad asistencial.

Desde hace más de 34 años, la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular ha llevado a cabo un registro de intervenciones quirúrgicas, proporcionando datos valiosos sobre la actividad a nivel nacional². No obstante, es importante destacar que dicho registro se basa en datos agregados de hospitales de toda España de manera anónima y voluntaria.

El RECC representa un avance sustancial al proporcionar una plataforma moderna y accesible, sustentada en la recopilación de datos a nivel individual por el paciente, en lugar de datos agregados. Esta característica permite mejorar notablemente la calidad de la información recopilada, así como ampliar las posibilidades de análisis y explotación de los datos para investigación y mejora asistencial. Actualmente, más de 40 hospitales disponen de acceso a esta herramienta, facilitando el seguimiento y la comparación de resultados en cirugía cardíaca.

El valor de estos registros radica en su capacidad para identificar tendencias, mejorar la calidad asistencial y establecer estrategias basadas en la evidencia para optimizar la práctica quirúrgica. Es fundamental que más centros hospitalarios se unan a esta iniciativa, fortaleciendo así el análisis de la cirugía cardíaca en España y contribuyendo al desarrollo de una especialidad cada vez más segura y eficiente.

El RECC se presenta, por tanto, como un recurso indispensable para la comunidad quirúrgica, promoviendo una mayor transparencia, aprendizaje y mejora continua en beneficio de nuestros pacientes. Desde su implementación en el 2021, se ha realizado un informe anual con el análisis de los datos obtenidos^{3,4}.

Material y métodos

Se ha realizado un análisis de los datos de RECC en el periodo comprendido entre el 8 de febrero del 2021 y el 31 de diciembre del 2024 de todos los centros participantes que han aportado datos, de al menos 40 intervenciones (23 centros incluidos).

Consideraciones éticas

Los datos extraídos fueron totalmente anonimizados a nivel de paciente, hospital, provincia y comunidad autónoma. La solicitud de información del RECC fue aprobado por la Comisión del Registro y ha seguido la política de gestión de datos expuesta en las bases del registro (<https://secce.es/recc-bases/>).

Análisis de los datos

Para el análisis global de los datos se utilizaron los datos de las cirugías cardíacas mayores. Se evaluó el perfil de riesgo de los pacientes según el EuroSCORE II⁵. La muerte de los pacientes se definió como mortalidad hospitalaria. Se analizó la mortalidad observada y la mortalidad ajustada al riesgo empleando el índice de mortalidad ajustada al riesgo (IMAR), como el cociente entre la mortalidad observada y la estimada por EuroSCORE II. Una cifra inferior a uno de este índice representa resultados mejores de los esperados por el EuroSCORE II.

Se analizó la incidencia de las principales complicaciones perioratorias como son la reintervención por sangrado, el accidente cerebrovascular mayor, el infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular postquirúrgica, sangrado postquirúrgico, mediastinitis, endocarditis y el daño renal AKIN III. Todas estas definiciones están incluidas en el RECC siguiendo las definiciones VARC^{6,7}.

Se realizó un análisis global de los procedimientos cardíacos mayores y otro estratificado por tipo de intervención, además de un análisis de tendencias por año desde el 2021 al 2024. La estratificación por tipo de intervención se realizó en los siguientes subgrupos:

- Cirugía de revascularización miocárdica (CABG, de «coronary artery bypass grafting»): con y sin CEC.
- Cirugía valvular: todo procedimiento valvular aislado, así como cirugía combinada o mixta en la que se asocia cirugía valvular y coronaria.
- Cirugía de aorta: toda cirugía que implique la intervención en algún segmento de la aorta torácica.
- Otros procedimientos: tumores cardíacos benignos y malignos, miectomía ventricular, cirugía de las complicaciones del infarto agudo de miocardio, implante de dispositivos de soporte circulatorio mecánico, trasplante cardíaco y otros procedimientos no incluidos en las categorías previas.




Figura 1. Número de procedimientos por año de intervención.

Análisis estadístico

En cada subgrupo de afecciones se indicó el recuento de procedimientos y la mortalidad. La mortalidad observada en cada subgrupo de afecciones se calculó como el porcentaje de fallecimientos respecto al total del subgrupo. Las variables categóricas se representan como frecuencias absolutas y porcentajes, y las variables cuantitativas mediante medias y desviaciones estándar/medianas e IQR. Para el análisis de tendencia se utilizó Chi-cuadrado de tendencia. La mortalidad esperada se calculó mediante el riesgo estimado preoperatorio a través de la escala EuroSCORE II. Este valor se obtuvo en cada subgrupo a través de la media de los valores aportados en el grupo analizado. Se ha calculado el IMAR como reflejo de la mortalidad observada en relación con la esperada. Se realizó un análisis del rendimiento del EuroSCORE II, evaluando la discriminación mediante el cálculo del área bajo la curva y la calibración mediante la evaluación de la pendiente de calibración y punto de corte de calibración. El análisis estadístico se realizó empleando el programa STATA®/BE v.17.0 (StataCorp LP, College Station, TX, EE. UU.).

Resultados

Desde el 8 de febrero del 2021 al 31 de diciembre del 2024 se incluyeron en el RECC un total de 16.631 procedimientos, de los cuales 14.048 fueron cirugías cardíacas mayores. En el año 2024 se introdujeron un total de 6.337 procedimientos, de los cuáles, 5.054 se trataban de cirugías cardíacas mayores (fig. 1).

Análisis global de los datos

La mediana de edad de los procedimientos mayores fue de 68,1 años (IQR: 59,5-75,2) y el 75,7% eran varones (tabla 1). La figura 2 representa la edad y el sexo por tipo de intervención. La media del EuroSCORE II fue del 5,4% (DE: 8,5) y la del EuroSCORE I del 8,9% (DE: 11,7) (fig. 3). De los procedimientos mayores,

Tabla 1
Características basales de los pacientes

	N = 14.048
Edad (años)	68,1 (IQR: 59,5-75,2)
Sexo masculino	75,7% (10.635)
Hipertensión	51,0% (7.163)
Dislipemia	46,5% (6.527)
Diabetes	29,6% (4.159)
Fumador activo	13,1% (1.847)
EPOC	10,7% (1.497)
ACV previo	7,3% (1.028)
NYHA III-IV	30,0% (4.213)
Enfermedad renal crónica	
KIDGO 3	9,5% (1.329)
KIDGO 4	1,4% (199)
KIDGO 5	1,8% (247)
Arteriopatía periférica	9,7% (1.367)
Cirugía cardíaca previa	9,7% (1.362)
Fibrilación auricular preoperatoria	13,6% (1.907)
FEVI %	
Disfunción leve (51-60%)	6,3% (887)
Disfunción moderada (31-50%)	10,1% (1.413)
Disfunción severa (< 30%)	4,5% (637)

ACV: accidente cerebrovascular; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IQR: rango intercuartílico.

el 53,0% (n = 7.447) fueron cirugías valvulares, el 25,4% (n = 3.563) cirugía coronaria aislada, el 15,4% (n = 2.169) cirugías de aorta y el 6,2% (n = 869) otros procedimientos (fig. 4). El 69,1% (n = 9.711) se realizaron de manera electiva, el 25,0% (n = 3.508) urgente, el 5,6% (n = 767) emergente y en el 0,3% (n = 42) en parada cardiorrespiratoria. La figura 5 representa la prioridad por procedimiento mayor realizado por año de intervención. De las cirugías cardíacas mayores, 536 (3,8%) se realizaron por miniesternotomía media, 416 (3,0%) por minitoracotomía, y en 187 (1,3%) se utilizó un acceso periférico o percutáneo. En un 8,3% (n = 1.170) se realizó una extubación precoz en el propio quirófano. La mediana de estancia en la UCI global fue de 2 días (IRQ: 2-4) y la de estancia global postoperatoria de 8 días (IQR: 6-13).

Distribución de edad y sexo en procedimientos de cirugía cardíaca




Figura 2. Edad y sexo por tipo de procedimiento.




Figura 3. Distribución del EuroSCORE II.

La mortalidad global observada fue del 5,1% con un IMAR global del 0,94. La [tabla 2](#) resume los principales procedimientos realizados, con la mortalidad observada y el IMAR asociado. En el 2024, la mortalidad global observada fue del 5,5 con un IMAR del 1,08 ([tabla 3](#)).

En el análisis de discriminación y calibración del EuroSCORE II de la cohorte global ([fig. 6](#)) el área bajo la curva (AUC) fue del 0,787 (IQR: 0,77-0,80) y se observó una buena calibración de los pacientes de bajo riesgo.

Cirugía de revascularización miocárdica 2021-2024

Del 2021 al 2024 se incluyeron un total de 3.563 cirugías de revascularización miocárdica ([fig. 7](#)). La mediana de edad fueron los 67,2 años (IQR: 60,2-73,7) y el 84,9% (n=3.027) fueron varones.

El 50,9% de las intervenciones se realizaron de manera electiva, el 45,7% urgente, el 3,4% emergente y el 0,1% en parada cardiorrespiratoria. La [figura 8](#) representa la prioridad por año de intervención.




Figura 4. Evolución de las intervenciones cardíacas mayores por año.




Figura 5. Prioridad por procedimiento y año de intervención.

Tabla 2
Resumen de las intervenciones de cirugía cardíaca mayor, mortalidad observada, e IMAR

	Casos (n)	Mortalidad observada (%)	ES II (%)	ES I (%)	IMAR
Procedimientos globales mayores	14.048	5,1	5,4	8,9	0,94
Cirugía valvular	7.447	4,8	5,0	8,4	0,96
SVAo	3.224	2,5	3,6	6,8	0,69
TAVI	293	3,6	5,3	13,3	0,68
SVMi	1.243	7,4	5,7	10,7	1,30
RVMi	683	2,4	4,4	2,1	0,88
Cirugía tricúspide aislada	190	6,8	5,2	7,3	1,30
Polivalvular	1.606	8,0	8,5	11,0	0,94
Cirugía coronaria aislada	3.563	2,8	3,0	4,1	0,93
Cirugía de aorta	2.169	8,5	9,2	17,8	0,92
Sin SAA	1.734	5,7	8,4	16,2	0,68
Con SAA	435	20,0	12,4	23,8	1,65

ES: EuroSCORE; IMAR: índice de mortalidad ajustada al riesgo; RVMi: reparación valvular mitral; SAA: síndrome aórtico agudo; SVAo: sustitución valvular aórtica; SVMi: sustitución valvular mitral; TAVI: prótesis aórtica transcatheter.

Tabla 3
Resumen de las intervenciones de cirugía cardiaca mayor, mortalidad observada, e IMAR en 2024

	Casos (n)	Mortalidad observada (%)	ES II (%)	IMAR
Procedimientos globales mayores	6.337	5,5	5,1	1,08
Cirugía valvular	2.552	5,2	4,9	1,06
SVAo	1.053	3,1	3,3	0,94
TAVI	120	3,3	4,8	0,69
SVMi	448	9,4	5,9	1,42
RVMi	260	1,2	2,5	0,48
Cirugía tricúspide aislada	60	3,3	4,5	0,73
Polivalvular	589	8,8	8,5	1,05
Cirugía coronaria aislada	1.251	2,8	3,0	0,93
Cirugía de aorta	811	7,8	8,5	0,91
Sin SAA	661	6,0	7,8	0,76
Con SAA	150	15,3	11,5	1,33

ES: EuroSCORE; IMAR: índice de mortalidad ajustada al riesgo; RVMi: reparación valvular mitral; SAA: síndrome aórtico agudo; SVAo: sustitución valvular aórtica; SVMi: sustitución valvular mitral; TAVI: prótesis aórtica transcáteter.




Figura 6. Ajuste del EuroSCORE II en procedimientos mayores en la cohorte global.

Se observó un aumento de la cirugía electiva a lo largo de los años (pTL < 0,001). Del total de intervenciones el 37,9% (n = 1.350) se realizaron sin circulación extracorpórea (fig. 9). En 37 pacientes se realizó una revascularización coronaria mínimamente invasiva por minitoracotomía anterolateral izquierda (MIDCAB). Se realizó una revascularización completa en un 76,9% de los pacientes, con una tendencia creciente en los últimos años (pTL = 0,002) (fig. 10). En el 98,4% (n = 3.506) se utilizó al menos un injerto arterial, y en el 52,3% (n = 1862) un doble injerto arterial (56,2% cirugía coronaria

sin CEC vs. 49,8% cirugía coronaria con CEC; p < 0,001). Se observó una disminución de la utilización de un doble injerto arterial en los últimos años (pT < 0,001). En un 60,3% (n = 2.147) se realizaron 3 o más injertos coronarios. Se utilizó la arteria radial en un 15,6% de los pacientes y la arteria mamaria interna derecha en un 39,0% (fig. 10). La mediana de estancia en la UCI fue de 2 días (IQR: 1-3) y la de estancia global postoperatoria de 7 días (IQR: 6-10). La media del EuroSCORE II fue del 3,0% (DE: 4,4) y la del EuroSCORE I del 4,1% (DE: 6,3). La mortalidad observada global de los pacientes coronarios fue del 2,8% con un IMAR del 0,93. La mortalidad observada de los




Figura 7. Procedimientos de revascularización miocárdica aislada por año.




Figura 8. Prioridad cirugía revascularización miocárdica por año de intervención.

pacientes sometidos a cirugía coronaria ha ido aumentando a lo largo de los últimos 4 años ($p_{TL}=0,013$) (fig. 11).

En el análisis de calibración y discriminación del EuroSCORE II de la muestra global de coronarios aislados el AUC fue de 0,74 (IC 95%: 0,68-0,80). El EuroSCORE II presentó una buena calibración de los pacientes de riesgo medio y bajo, y sobreestimó la mortalidad de los pacientes de alto riesgo. En el 2024, el EuroSCORE II no calibró bien e infraestimó a los pacientes de riesgo medio/alto (fig. 12).

Se realizó también un análisis estratificando la cirugía de revascularización miocárdica en cirugía con o sin circulación extracorpórea. La media del EuroSCORE II de los pacientes sometidos a cirugía coronaria con circulación extracorpórea fue del 3,2% (DE: 5,1) y del 2,7% (DE: 3,2) en los pacientes sin circulación extracorpórea. La mortalidad observada para el grupo con CEC fue del 3,7% con un IMAR del 1,15 y la del grupo sin CEC del 1,3% con un IMAR del 0,48.

Cirugía valvular 2021-2024

Del 2021 al 2024 se incluyeron un total de 7.447 cirugías valvulares. La mediana de edad fue de 69,3 años (IQR: 61,0-75,3) y un 60,4% ($n=4.495$) fueron varones. La media del EuroSCORE II fue del 5,0% (DE: 7,7) y la del EuroSCORE I del 8,4% (DE: 10,4). El 80,2% de las intervenciones se realizaron de manera electiva, y en 17,6% de manera urgente (fig. 13).

La mediana de estancia en la UCI fue de 2 días (IQR: 2-4) y la de estancia global postoperatoria de 8 días (6-13).

De manera global, en el 48,3% ($n=3.595$) se realizó una cirugía valvular aórtica aislada, en el 27,0% ($n=2.010$) cirugía mitral aislada, en el 21,6% ($n=1.606$) cirugía polivalvular, en el 2,6% ($n=190$) cirugía tricúspide aislada y en un 0,6% ($n=46$) cirugía pulmonar aislada (fig. 14). En un 24,3% ($n=1.200$) se realizó cirugía de revascularización miocárdica concomitante.




Figura 9. Tipo de procedimientos de revascularización miocárdica por año de intervención.




Figura 10. Características revascularización miocárdica.

Cirugía valvular aórtica

En 3.595 pacientes se realizó un procedimiento aislado sobre la válvula aórtica con un incremento del número de pacientes en el último año (fig. 15). En un 89,7% (n = 3.224) se realizó una sustitución valvular aórtica, en un 8,3% (n = 293) se realizó un implante de una prótesis transcáteter, y en un 1,5% (n = 52) una plastia aórtica. Ciento noventa y cinco pacientes presentaban una cirugía válvula aórtica previa, y en un 20,7% (n = 743) se realizó una revascularización coronaria concomitante.

Sustitución valvular aórtica

La mediana de edad de los pacientes a los que se les realizó una sustitución valvular aórtica quirúrgica fue de 69,1 años (IQR:

61,2–74,4) y el 69,9% eran mujeres. La media del EuroSCORE II fue del 3,6% (DE: 5,9) y la del EuroSCORE I del 6,8% (DE: 8,9). En un 75,3% se implantó una prótesis biológica (fig. 16) con una tendencia en aumento del uso de prótesis mecánicas en los últimos años ($pT < 0,001$).

La mortalidad global observada en este grupo fue del 2,5% con un IMAR global del 0,69 (fig. 17). El EuroSCORE II sobreestimó el riesgo global de este grupo de pacientes (fig. 18).

TAVI

Los pacientes a los que se les implantó una TAVI fueron mayores, con una mediana de edad de 79,4 años (74,8–83,4%), el 69% (n = 209) fueron mujeres, y presentaban un mayor riesgo quirúrgico (media del EuroSCORE II del 5,3% (DE: 6,7) y del EuroSCORE I del 13,3% (DE: 10,8). Todas fueron implantadas por vía transaxilar.




Figura 11. EuroSCORE II, mortalidad observada e IMAR en cirugía de revascularización miocárdica aislada por año de intervención.




Figura 12. Ajuste del EuroSCORE II en cirugía de revascularización miocárdica aislada. A: Global; B: 2024.

La mortalidad observada fue del 3,6%, con un IMAR del 0,68 (fig. 19).

Cirugía valvular mitral

En 2.010 pacientes se realizó una cirugía valvular mitral aislada. La mediana de edad fue de 67,4 años (IQR: 58,8-74,6) y el 55,3%

(n = 1.112) fueron varones. La media del EuroSCORE II fue del 4,6% (DE: 6,6) y del EuroSCORE I del 8,5% (DE: 10,7). Se realizó sustitución valvular mitral en un 61,8% (n = 1.243), reparación valvular mitral en un 34,0% (n = 683) e implante percutáneo de la válvula mitral (TMVR) en un 0,9% (n = 19). La figura 20 representa los diferentes procedimientos por año de intervención. Se observa un aumento de la reparación valvular mitral desde el 2021 (pTL = 0,007).




Figura 13. Prioridad cirugía valvular por año de intervención.




Figura 14. Tipo valvular por año de intervención.

En un 12,5% (n=252) se realizó un procedimiento de ablación de la fibrilación auricular asociado, en un 11,8% (n=238) se realizó una exclusión de la orejuela izquierda y en un 14,5% (n=292) una revascularización coronaria concomitante.

Sustitución valvular mitral

La mediana de edad fue de 69,5 años (IQR: 61,3–75,8) y el 52,7% eran mujeres. La media del EuroSCORE II fue del 5,7% (DE: 7,6%) y del EuroSCORE I del 10,7% (DE: 12,2). En el 15,8% (n=196) se trataban de reintervenciones sobre la válvula mitral y en un 50,5% se implantó una prótesis biológica. La mortalidad observada fue del 7,4% con un IMAR global del 1,30. La figura 21 representa el IMAR por año de intervención. El EuroSCORE II discrimina y calibra mal en este grupo (fig. 22A).

Analizamos los pacientes a los que se les realizó una cirugía mixta de sustitución valvular mitral y de revascularización coro-

naria. La media del EuroSCORE II en el 2024 fue del 7,0% (DE: 8,0), con una mortalidad observada del 20,6% (IMAR: 2,9) frente a aquellos pacientes a los que no se les realizó un procedimiento coronario concomitante que presentaron una media del EuroSCORE II del 5,7% (DE: 8,3), con una mortalidad observada del 6,4% (IMAR: 1,12).

Reparación valvular mitral

La mediana de edad fue de 63,5 años (IQR: 54,5–70,6) y la mayoría eran varones (68,8%). La media del EuroSCORE II fue del 2,4% (DE: 2,8) y la del EuroSCORE I del 4,4% (DE: 4,5). En un 89,0% (n=608) se realizó una reparación mitral con anillo, en un 54,6% (n=373) implante de neocuerdas, y en un 23,6% (n=161) una resección del velo posterior. En 27 pacientes se realizó una reparación valvular mitral por minitoracotomía anterolateral izquierda sin circulación extracorpórea (TOP-MINI), de los cuáles 4 de ellos se realizaron en el 2024. La mortalidad observada fue del 2,1% y el IMAR del 0,88. La




Figura 15. Procedimientos sobre la válvula aórtica aislada por año de intervención.




Figura 16. Tipo prótesis aórtica por año de intervención.




Figura 17. EuroSCORE II, mortalidad observada e IMAR en cirugía de sustitución valvular aórtica aislada por año de intervención.




Figura 18. Ajuste del EuroSCORE II en cirugía de sustitución valvular aórtica aislada. A: Global. B: 2024.




Figura 19. EuroSCORE II, mortalidad observada e IMAR en los pacientes a los que se les implantó una TAVI por año de intervención.

figura 23 representa el IMAR por año de intervención. El EuroSCORE II en este caso tampoco discrimina ni calibra bien (fig. 22B).

En este grupo también se analizaron los pacientes a los que se les realizó una cirugía mixta de reparación valvular mitral y de revascularización coronaria. La media del EuroSCORE II en el 2024 fue del 6,4% (DE 5,7), con una mortalidad observada del 5,7% (IMAR: 0,89) frente a aquellos pacientes a los que no se les realizó un procedimiento coronario concomitante que presentaron una media del

EuroSCORE II del 1,9% (DE 2,4), con una mortalidad observada del 0,5% (IMAR: 0,26).

TMVR

Los pacientes sometidos a TMVR fueron mayores, con una mediana de edad de 79,2 años (IQR: 74,5-81,1), y el 57,9% (n=11) fueron mujeres. La media el EuroSCORE II fue del 5,8% (DE: 3,3) y




Figura 20. Procedimientos sobre la válvula mitral por año de intervención.




Figura 21. EuroSCORE II, mortalidad observada e IMAR en cirugía de sustitución valvular mitral aislada por año de intervención.

del EuroSCORE I del 14,6% (DE: 8,7). La mortalidad observada de este grupo fue del 10,5%, con un IMAR del 1,81.

Cirugía valvular tricúspide aislada

Se realizó un procedimiento aislado sobre la válvula tricúspide en 190 pacientes. La mediana de edad fue de 63,5 años (IQR: 50,5–69,9) y el 54,2% (n = 103) eran mujeres. La media del EuroSCORE II fue del 5,2% (DE: 7,8) y del EuroSCORE I del 7,3% (DE: 7,9). En un 53,2% (n = 101) se realizó una sustitución de la válvula tricúspide, en un 46,3% (n = 88) una reparación de la valvular, y en un paciente una reparación de una fuga periprotésica. En 77 pacientes se realizó una anuloplastia con anillo y en 3 pacientes una anuloplastia con sutura. La mortalidad observada fue del 6,8% con un IMAR del 1,3.

Cirugía polivalvular

En 1.606 pacientes se realizó una cirugía polivalvular. La mediana de edad de estos pacientes fue del 71,6 años (IQR: 64,3–

76,3) y el 54,9% (n = 881) eran mujeres. La media del EuroSCORE II fue del 8,5% (DE: 10,7) y la del EuroSCORE I del 11,0% (DE: 12,4). En un 9,8% (n = 157) se realizó una revascularización coronaria concomitante. El procedimiento más realizado fue el mitro-tricúspide en un 42,0% (n = 673), seguido del mitro-aórtico en un 39,2% (n = 628) (fig. 24). La mortalidad observada fue del 8,0% con un IMAR del 0,94 (fig. 25). El AUC fue de 0,657 (IC 95%: 0,60–0,72) presentando en este grupo el EuroSCORE II una mala calibración y discriminación (fig. 26).

Cirugía de la aorta 2021-2024

Se realizaron un total de 2.169 intervenciones sobre la aorta. La mediana de edad fue de 65,0 años (IQR: 54,7–73,1) y el 59,4% (n = 1.288) eran mujeres. La mediana del EuroSCORE II fue del 9,2% (DE: 11,6) y la del EuroSCORE I del 17,8% (DE: 15,9). El 67,6% de las intervenciones se realizaron de manera electiva (fig. 27).

En un 20,1% (n = 435) presentaban algún tipo de síndrome aórtico (14,1% disección aguda tipo A, 2,8% disección crónica tipo A, 0,9% disección aguda tipo B, 1,9% disección crónica tipo B y 0,4%




Figura 22. Ajuste del EuroSCORE II en cirugía de sustitución valvular mitral (A) y reparación valvular (B).




Figura 23. EuroSCORE II, mortalidad observada e IMAR en cirugía de reparación valvular mitral aislada por año de intervención.

disección no A no B). En la raíz y aorta ascendente la afección más frecuente es la afección aneurismática sin ruptura (61,5 y 65,3%, respectivamente), mientras que en el cayado y aorta descendente es el síndrome aórtico agudo (48,0 y 28,8%, respectivamente) (fig. 28).

La figura 29 resume los principales procedimientos realizados por año de intervención. Se realizó una cirugía compleja del arco aórtico con implante de prótesis híbrida trompa de elefante en 173 pacientes, de las cuáles, 65 se realizaron en 2024.




Figura 24. Procedimientos polivalvulares.




Figura 25. EuroSCORE II, mortalidad observada e IMAR en cirugía polivalvular por año de intervención.

La media del EuroSCORE II de los pacientes con algún tipo de síndrome aórtico fue del 12,1% (DE: 12,4), mientras que para el resto de los pacientes fue del 8,4% (DE: 11,2). La mediana de estancia en la UCI para los pacientes sin síndrome aórtico agudo fue de 3 días (IQR: 2-5) y la de estancia global de 8 días (IQR: 6-14). La mediana de estancia en la UCI para los pacientes con síndrome aórtico agudo fue de 5 días (IQR: 2-12) y la de estancia global de 13 días (IQR: 7-26).

La mortalidad global observada de este grupo fue del 8,5% (n = 185) con un IMAR del 0,92. La mortalidad de los pacientes con síndrome aórtico agudo fue del 20% (n = 87), con un IMAR del 1,65, y para el resto de los pacientes la mortalidad fue del 5,7%, con un IMAR del 0,68 (fig. 30). El AUC para los pacientes con procedimientos sobre la aorta (excluidos los pacientes con SAA) fue de 0,725 (IC 95%: 0,66-0,79). El EuroSCORE II en este grupo sobreestima a los pacientes de alto riesgo (fig. 31).

Otros procedimientos

La [tabla 4](#) resume otros procedimientos realizados de manera global y en el 2024. En la [tabla 5](#) se incluyen los trasplantes realizados por año de intervención y mortalidad. En total se han incluido 143 trasplantes cardíacos y un cardiopulmonar. La mortalidad global observada en los pacientes trasplantados fue del 6,3%.

La [figura 32](#) resume las principales complicaciones postoperatorias por tipo de intervención. La cirugía de aorta se asocia a una mayor incidencia de ACV mayor, sangrado postquirúrgico y fibrilación auricular postquirúrgica. El IAM perioperatorio es más frecuente en los pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica.

Discusión

Los resultados presentados por el Registro Español de Cirugía Cardíaca (RECC) entre los años 2021 y 2024 constituyen una fuente




Figura 26. Ajuste del EuroSCORE II en cirugía polivalvular.




Figura 27. Prioridad cirugía de aorta por año de intervención.




Figura 28. Afección de la aorta por segmentos.




Figura 29. Procedimientos realizados por año de intervención.




Figura 30. EuroSCORE II, mortalidad observada e IMAR en cirugía de la aorta por año de intervención (con y sin síndrome aórtico).




Figura 31. Ajuste del EuroSCORE II en cirugía de aorta (excluidos pacientes con SAA). A: Global; B: 2024.

Tabla 4
Otros procedimientos

	Casos global (n)	Mortalidad observada global (%)	Casos en 2024 (n)	Mortalidad observada en 2024 (%)
Tumor cardíaco benigno	152	0,0	52	0,0
Tumor cardíaco maligno	15	6,7	5	0,0
Miectomía	108	5,6	41	4,9
Reconstrucción ventricular	15	40,0	6	66,7
Asistencia ventricular izquierda	156	25,6	84	25
Asistencia ventricular derecha	35	54,3	11	63,6
ECMO	211	40,3	125	37,6
Rotura de la pared libre del VI (sin CEC)	22	45,5	11	36,4
Rotura de la pared libre del VI (con CEC)	11	45,5	5	60,0
Aneurisma ventricular postinfarto	16	12,5	4	25,0
CIV postinfarto	29	44,8	8	62,5
Cirugía asilada de ablación de la FA	33	3,0	13	0,0
Pericardiectomías	53	5,7	14	0,0

CEC: circulación extracorpórea; CIV: comunicación interventricular; ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; FA: fibrilación auricular; VI: ventrículo izquierdo.

Tabla 5
Trasplante cardíaco

	Casos global (n)	Mortalidad observada global (%)	Casos en 2024 (n)	Mortalidad observada en 2024 (%)
Trasplante cardíaco ortotópico, técnica biatrial	30	13,3	11	9,1
Trasplante cardíaco ortotópico, técnica bicava	104	4,8	54	5,5
Trasplante cardiopulmonar	1	0,0	1	0,0
Otras configuraciones	9	0,0	8	0,0

de información de alto valor para la evaluación sistemática de la actividad quirúrgica y los resultados en el ámbito de nuestra especialidad en España. Desde su creación en el 2021, el RECC se ha consolidado como una herramienta fundamental para el análisis

de tendencias, la caracterización de perfiles de riesgo y la monitorización de resultados asistenciales.

Un aspecto especialmente relevante es el crecimiento sostenido en la participación de centros quirúrgicos, lo cual ha contribuido




Figura 32. Eventos postoperatorios.

a aumentar la representatividad y robustez de los datos. Actualmente, más de 40 centros disponen de acceso al RECC; no obstante, el análisis actual se centra en los 23 centros que han aportado más de 40 procedimientos, una cifra inferior a los 59 centros incluidos en el último Registro de intervenciones de la SECCE, lo que limita parcialmente la generalización de los hallazgos². Pese a ello, el aumento del volumen de procedimientos incluidos en 2024 refleja un compromiso creciente por parte de los servicios de cirugía cardíaca en la mejora de la calidad asistencial y la transparencia de resultados.

Durante el periodo analizado, se registraron 16.631 procedimientos, de los cuales 14.048 fueron cirugías cardíacas mayores. En 2024 se observó un incremento del 81,7% respecto al año anterior, con aumentos significativos en la cirugía de aorta (+75,9%), cirugía valvular (+57,5%) y cirugía de revascularización miocárdica (+55,8%).

La población intervenida presenta una edad media elevada (68,1 años), con una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes de mayor edad fueron aquellos sometidos a procedimientos transcáteter (TAVI y TMVR), mientras que los más jóvenes correspondieron a intervenciones sobre la válvula tricúspide y reparación mitral. Predominó el sexo masculino (75,7%), especialmente en la cirugía coronaria (85%) y reparación mitral (68,8%).

La utilización del EuroSCORE II ha permitido ajustar los resultados en función del riesgo, con una media del 5,4% (DE: 8,5). A nivel global, el índice mostró una adecuada discriminación (AUC: 0,787 [IQR: 0,77-0,80]) y calibración en los pacientes de bajo riesgo; sin embargo, su rendimiento fue subóptimo al analizar subgrupos específicos, tendiendo a sobreestimar la mortalidad en cirugía coronaria, sustitución valvular aórtica, cirugía polivalvular y cirugía de aorta.

En cuanto al tipo de intervenciones, la cirugía valvular fue la más frecuente (53,0%), seguida de la cirugía de revascularización coronaria aislada en un tercio de los pacientes. Estos datos son consistentes con los reportados por la SECCE². La mayoría de los procedimientos fueron programados (69,1%), y solo el 5,9% correspondió a situaciones emergentes o en parada cardiorrespiratoria.

En cirugía de revascularización miocárdica, se evidenció una mayor proporción de casos electivos en los últimos años, representando hasta la mitad de los procedimientos de cirugía de revascularización miocárdica aislada. Se realizó una revasculariza-

ción sin circulación extracorpórea (CEC) en el 37,9% de los pacientes y se observó una tendencia creciente hacia la revascularización completa (79,8% en 2024). El uso de doble injerto arterial fue mayor en la cirugía sin CEC (56,2%) que con CEC (49,8%), con diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,001$). Predomina el uso de la arteria mamaria interna derecha en un 39,0% frente a la arteria radial en un 15,6%. La mortalidad observada para los pacientes sometidos a revascularización miocárdica con CEC fue mayor a la esperada por el EuroSCORE II, mientras que para los pacientes sometidos a cirugía de revascularización sin circulación extracorpórea fue menor con un IMAR del 0,48.

La cirugía valvular aórtica fue la más prevalente dentro de la afección valvular (48,3%), con una revascularización miocárdica concomitante en casi un tercio de los casos. A pesar del predominio de prótesis biológicas, se observó un aumento progresivo del uso de prótesis mecánicas (del 20,5% en 2021 al 28,8% en 2024). Esto puede ser debido a la disminución de la edad de los pacientes sometidos a cirugía de sustitución valvular aórtica por el incremento del implante de TAVI, como se puede ver reflejado en el último año donde se introdujeron 120 procedimientos tipo TAVI frente a los 59 en el 2023, con preferencia por el acceso transaxilar desde 2022.

La reparación mitral ha ganado protagonismo (del 28,8% en 2021 al 36,7% en 2024). Sin embargo, la ablación concomitante de fibrilación auricular se aplicó en solo el 12,5% de los casos, a pesar de las recomendaciones actuales de las últimas guías clínicas⁸. En la sustitución valvular mitral, la distribución entre prótesis biológicas y mecánicas fue casi equitativa (50,5% biológicas vs. 49,5% mecánicas). En cirugía tricúspide aislada, se realizó sustitución en el 53,2% y reparación en el 46,3%. Entre las cirugías polivalvulares, predominaron las combinaciones mitro-tricúspide (42,0%) y mitro-aórtica (39,2%).

En el tratamiento de la afección aórtica, se diferenciaron claramente los pacientes con síndrome aórtico agudo (SAA), quienes presentaron mayor riesgo y mortalidad (IMAR: 1,65) respecto al otro subgrupo sin afección aórtica aguda (IMAR: 0,68). Destaca el aumento en el uso de prótesis híbridas tipo «trompa de elefante» para la afección compleja del cayado aórtico (65 implantes en 2024).

Las intervenciones asociadas a complicaciones mecánicas del infarto y a dispositivos de soporte circulatorio mostraron una mortalidad especialmente elevada, lo que subraya la gravedad de estos

escenarios clínicos. En 33 pacientes se realizó una ablación aislada de la fibrilación auricular, de los cuáles, 13 fueron en el 2024.

La mortalidad observada en la cohorte global fue del 5,1%, disminuyendo al 3,4% en el 2024. Globalmente, el IMAR fue inferior a 1 en la mayoría de las afecciones, excepto en la sustitución mitral (IMAR: 1,30), cirugía tricúspide aislada (IMAR: 1,30) y SAA (IMAR: 1,65). Estos hallazgos se mantienen al analizar los datos de 2024, donde el IMAR global fue de 1,08. Resultados similares se reflejan en el registro nacional de la SECCE².

Otro valor diferencial del RECC es su capacidad para el seguimiento longitudinal, permitiendo evaluar la supervivencia y la efectividad de los tratamientos a largo plazo. La integración con registros poblacionales como el INDEF facilita el acceso a datos de mortalidad y abre nuevas oportunidades para el análisis de resultados clínicos sostenidos en el tiempo.

En términos generales, los datos del RECC confirman que la cirugía cardíaca en España mantiene estándares de calidad comparables a los de otros países europeos. No obstante, persisten desafíos relevantes como el relevo generacional, la creciente presión asistencial, la optimización de recursos y la incorporación progresiva de tecnologías emergentes como la cirugía robótica o la inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas.

En conclusión, el RECC constituye una herramienta esencial para el análisis y la mejora de la cirugía cardíaca en España. La consolidación de este registro, su ampliación en términos de cobertura y variables recogidas, y su utilización sistemática como instrumento de evaluación y planificación sanitaria son pasos fundamentales para garantizar una atención de calidad, eficiente y equitativa a los pacientes con afección cardiovascular.

Financiación

Los autores de este artículo declaran no haber recibido financiación para la elaboración del mismo.

Consideraciones éticas

El presente trabajo no comporta experimentación en animales, no se trata de un ensayo clínico, y los datos mostrados en las tablas y figuras se recogen en el apartado de resultados y conclusiones.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés relacionados con el contenido del manuscrito.

Bibliografía

1. Registro Español de Cirugía Cardiovascular [consultado 1 Abr 2025] Disponible en: <https://secce.es/registro-espanol-de-cirugia-cardiovascular/>
2. Monguió E, Martín E, Cuerpo G, Centella T, Polo L, García R, et al. Cirugía cardiovascular en España en el año 2023. Registro de intervenciones de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. *Cir Cardiov.* 2025;32:151–65.
3. Montero L, Carnero M, Rodríguez R, Sureda J, Rodríguez J, Sbraga F, et al. Análisis de los datos del Registro Español de Cirugía Cardíaca (RECC) 2021–2022. *Cir Cardiov.* 2024;30:335–47.
4. Montero L, Carnero M, Rodríguez R, Sureda J, Rodríguez J, Sbraga F, et al. Análisis de los datos del Registro Español de Cirugía Cardíaca (RECC) 2021–2023. *Cir Cardiov.* 2025;32:34–50.
5. Niv A, Sari D, Jay P, Pritchard G, Shuman D, Halpin L. Comparison of EuroSCORE II, Original EuroSCORE, and The Society of Thoracic Surgeons Risk Score in Cardiac-Surgery Patients. *Ann Thorac Surg.* 2016;102:573–9.
6. Kappetein A, Head S, Généreux P, Piazza N, van Mieghem N, Blackstone E, et al. Updated standardized endpoint definitions for transcatheter aortic valve implantation: The Valve Academic Research Consortium-2 consensus document (VARC-2). *Eur J Cardiothorac Surg.* 2012;42:S45–60.
7. Généreux P, Piazza N, Alu M, Nazif T, Hahn R, Pibarot P, et al. Valve Academic Research Consortium 3: Updated endpoint definitions for aortic valve clinical research. *Eur Heart J.* 2021;42:1825–957.
8. Van Gelder I, Rienstra M, Bunting K, Casado-Arroyo R, Caso V, Crijns H, et al., ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J.* 2024;45:3314–414.