

**El càncer de coll
uterí es pot
prevenir.**

**Amb una citologia
cervicovaginal
cada tres anys,
n'hi ha prou.**


**On puc trobar més informació
sobre la detecció precoç de
càncer de coll uterí o cèrvix?**

**Si vols tenir informació addicional,
la trobaràs a la pàgina Web:**

<http://www.gencat.net/salut>

També pots trucar a:

**Sanitat Respon 24 hores
902 111 444**



**El diagnòstic precoç
del càncer de coll uterí
depèn de**

tu

On és el coll uterí?

El coll uterí és la part més baixa de la matriu i enllaça amb la part superior de la vagina.

Per això, el ginecòleg, la llevadora o el professional sanitari correctament entrenat el poden veure i accedir-hi fàcilment mitjançant una exploració vaginal.

Quines són les causes del càncer de coll uterí ?

Tot i que el càncer de coll uterí és un càncer poc freqüent, recentment s'ha comprovat que la causa principal del càncer de coll uterí és un tipus de virus, anomenat virus del papil·loma humà. Aquest virus es pot transmetre per contacte sexual.

Per tant, el risc de tenir el virus augmenta amb el nombre de parelles sexuals que la dona i el seu company han tingut.

Es pot curar aquesta malaltia?

El càncer de coll uterí acostuma a tenir una evolució lenta, la qual cosa permet el seu diagnòstic, tractament i curació en la majoria de casos.

Es pot prevenir?

Un mitjà molt eficaç de prevenció és fer-se una simple prova, coneguda amb el nom de citologia cervicovaginal o prova de Papanicolaou.

Aquesta prova és força segur i detecta precoçment els canvis anormals que es puguin produir en les cèl·lules que estan a la superfície del coll uterí.

Això permet tractar fàcilment lesions, que encara no són canceroses, anomenades displàsies, però que algunes vegades es transformen en càncer, si no es tracten.

La utilització del preservatiu és una forma de prevenir algunes malalties de transmissió sexual, tot i que la seva eficàcia per prevenir el càncer de coll uterí no està demostrada.



Qui s'ha de fer la citologia cervicovaginal?

Totes les dones de 25 a 65 anys que han tingut o que mantenen relacions sexuals.

Cada quan s'ha de fer aquesta prova?

Fins fa poc es recomanava realitzar aquesta prova un cop a l'any. No obstant això, avui dia se sap que si els resultats de les dues últimes citologies són normals, la citologia cervicovaginal practica cada 3 anys ofereix el mateix nivell de seguretat en la prevenció que la realitzada cada any.

En què consisteix la citologia cervicovaginal?

Les cèl·lules de les parets del coll uterí es descamen i poden recollir-se amb una petita espàtula.

Per tant, la prova es realitza ràpidament agafant una mostra de les cèl·lules a través de la vagina, sense dolor i sense causar molèsties.

Per millorar el resultat de la prova, s'aconsella que no es faci la citologia cervicovaginal en els dies de la menstruació i evitar medicaments per via vaginal en els tres dies anteriors.