



Què cal saber
sobre la vacunació
contra la
pneumònia
pneumocòccica

Sanitat Respon 24 hores
902 111 444



www.gencat.net/salut

© Generalitat de Catalunya D.L. B-43.490-2004



Generalitat de Catalunya
**Departament
de Salut**

Què és la pneumònia pneumocòccica?

Les pneumònies, conegudes popularment com a pulmonies, són malalties infeccioses que afecten els pulmons i que estan causades per determinats gèrmens. La més freqüent és la produïda per un bacteri anomenat pneumococ.

De quants tipus n'hi ha?

En l'actualitat s'han aïllat 90 tipus diferents de pneumococs. De tota manera, només una part són responsables d'aquestes pneumònies, la resta són poc freqüents o gairebé mai causen la malaltia.

Quan una persona pateix una infecció d'un tipus concret de pneumococ, no queda protegida enfront de la resta de tipus. Per aquest motiu, al llarg de la vida es pot patir més d'una pneumònia pneumocòccica.

Com es poden prevenir?

Actualment es disposa d'una vacuna amb capacitat de protegir enfront de 23 tipus diferents de pneumococs, que són els responsables de la pràctica totalitat de les pneumònies més greus del nostre medi.

Qui s'ha de vacunar?

Si bé tothom pot patir la pneumònia pneumocòccica, aquesta és més freqüent i greu en les persones de 60 anys o més, les persones amb malalties pulmonars i cardíaques cròniques i les que pateixen insuficiència renal, diabetis i malalties que produeixen immuno-deficiències (sida, etc.).

Com s'administra la vacuna?

La vacunació contra el pneumococ requereix una sola dosi. Es posa al braç en la zona deltoïdal, amb agulles indolores.

És segura la vacuna?

D'acord amb l'experiència assolida, la vacuna contra la pneumònia és segura.

Com totes les vacunes, però, pot produir alguns efectes secundaris de tipus local (envermelliment, dolor, inflamació) que desapareixen al cap d'uns dies.

On és possible vacunar-se?

En l'àmbit de l'assistència pública o privada, després que el metge de capçalera hagi considerat la indicació de la vacuna.