

Què t'interessa saber de la vacuna contra la tos ferina?

Què és la tos ferina?

És una malaltia molt contagiosa causada per un bacteri que provoca una infecció respiratòria. Principalment, són les persones que conviuen i cuiden el nadó les que poden contagiar-lo a través de la tos i els esternuts durant els primers mesos de vida, mentre encara no està vacunat.

Durant els primers mesos de vida és quan la malaltia pot ser més greu, i pot ser necessari hospitalitzar el nadó. En alguns casos, fins i tot es pot produir la mort.

Com es pot prevenir?

Mitjançant una vacuna anomenada dTpa que protegeix contra la tos ferina, així com contra el tètanus i la diftèria.

Durant l'embaràs, quan està indicada la vacuna dTpa?

Es recomana vacunar amb dTpa totes les dones embarassades, preferentment entre les 27 i les 36 setmanes de gestació; tot i que es pot administrar en qualsevol moment de l'embaràs. Cal que et vacunis en cada nou embaràs, independentment de quan hagis rebut l'última dosi de vacuna del tètanus i de si t'has vacunat en un embaràs anterior.

Quan no està indicada?

En el cas de dones al·lèrgiques a algun dels seus components; tot i que aquesta situació és molt poc freqüent.

És segura?

Es tracta d'una vacuna que no pot produir la malaltia i que és segura durant l'embaràs.

Tot i així, les vacunes, com qualsevol altre fàrmac, poden tenir efectes adversos, els quals són molt poc freqüents i solen ser lleus (molèsties al lloc de la punxada).

És possible vacunar-se contra la grip i la tos ferina el mateix dia?

Sí, totes dues vacunes es poden administrar a la mateixa visita de seguiment de l'embaràs al teu centre sanitari.

Quan es vacunarà al nadó?

D'acord amb el calendari de vacunes sistemàtiques de Catalunya, la primera dosi de la vacuna contra la tos ferina se li ha d'administrar als dos mesos de vida

Vacunar-se contra la tos ferina durant l'embaràs...

- Protegeix la mare contra la tos ferina, així s'evita el contagi al nadó.
- Protegeix el nadó
 els primers mesos de vida,
 gràcies al pas d'anticossos
 materns contra la tos
 ferina a través de
 la placenta.

es vacunarà



dosi de la vacuna contra la tos ferina se li ha d'administrar als dos mesos de vida.



primeros meses de vida.

¿Qué te interesa saber de la vacuna contra la tos ferina?

Generalitat de Catalunya **Agència de Salut Pública**

¿Qué es la tos ferina?

Es una enfermedad muy contagiosa causada por una bacteria que provoca una infección respiratoria. Principalmente, las personas que conviven y cuidan al bebé son las que pueden contagiarlo a través de la tos y los estornudos durante los primeros meses de vida, mientras no está vacunado.

Durante los primeros meses de vida es cuando la enfermedad puede ser más grave y puede ser necesaria la hospitalización del bebé. En algunos casos, hasta puede producir la muerte.

¿Cómo se puede prevenir?

Mediante una vacuna denominada dTpa, que protege contra la tos ferina, así como contra la difteria y el tétanos.

Durante el embarazo, ¿Cuándo está indicada la vacuna dTpa?

Se recomienda vacunar con dTpa a todas las mujeres embarazadas, preferentemente entre las 27 y las 36 semanas de gestación, aunque se puede administrar en cualquier momento del embarazo. Te debes vacunar en cada nuevo embarazo, independientemente de cuando hayas recibido la última dosis de vacuna del tétanos y de si te has vacunado en un embarazo anterior.

¿Cuándo no está indicada?

En el caso de mujeres alérgicas a alguno de sus componentes; aunque esta situación es muy poco frecuente.

¿Es segura?

Se trata de una vacuna que no puede producir la enfermedad y que es segura durante el embarazo.

Aun así, las vacunas, como cualquier otro fármaco, pueden tener efectos adversos, los cuales son muy poco frecuentes y suelen ser leves (molestias en la zona del pinchazo).

¿Es posible vacunarse contra la gripe y la tos ferina el mismo día?

Sí, ambas vacunas se pueden administrar en la misma visita de seguimiento del embarazo en tu centro sanitario.

Cuándo se vacunará

De acuerdo con el calendario de vacunas sistemáticas de Cataluña, la primera dosis de la vacuna contra la tos ferina se debe administrar a los dos meses de vida.

Vacunarse contra

• Protege a la madre contra la tos ferina, así se evita el contagio al bebé.

Los bebés que padezcan la tos ferina pueden necesitar ser hospitalizados.

los primeros meses de vida, gracias al paso de anticuerpos maternos contra la tos ferina a través de la placenta.

la tos ferina durante el embarazo...

Protege al bebé



¡Consúltalo con los profesionales sanitarios!