

La salmonel·la és un bacteri que viu principalment al tracte intestinal dels animals i és el causant de la salmonel·losi. Té una gran capacitat d'adaptació: es pot localitzar a les restes de purins i de pols en corrals buits, equipaments i sistemes de ventilació de les explotacions.

Per què és important controlar-la?


- Segons dades epidemiològiques, la salmonel·la causa un terç de les toxiinfeccions alimentàries que es produeixen a Catalunya. La carn de porc n'és la principal font després dels ous i la carn d'aviram.
 - És també un trastorn per a la producció porcina perquè causa febre, diarrea i retard en el creixement, sobretot en els porcs de transició i d'engreix.
 - El problema principal són els animals portadors, que sense manifestar signes clínics, poden propagar la salmonel·la a través de les femtes.
- En col·laboració amb:
- Universitat Autònoma de Barcelona
 - CReSA
- Amb la participació de:
- ADS Bages
 - ADS Baix Ebre
 - ADS Bellpuig
 - ADS ADARCO
 - ADS Les Garrigues 2002
 - ADS Montsià
 - ADS Pla Urgell
 - ADS TAREP
 - ANAFRIC
 - ASAJA-AEALL
 - ASBAPORC
 - ASBEPORC
 - ASFAC
 - ASSAPORC
 - Associació Catalana porcí Selecte
 - FCAC
 - Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
 - GSP de Girona
 - GSP de Lleida
 - JARC
 - JARC -Girona
 - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
 - TAREP
 - Unió de Pagesos

PORCS LLIURES DE SALMONEL·LA: UN OBJECTIU ASSOLIBLE



© Generalitat de Catalunya. D.L.: B-xxxxx

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 www.gencat.cat/salut

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

 Generalitat de Catalunya
Agència Catalana
de Seguretat Alimentària



Es tracta d'un **problema de salut pública i de sanitat animal** que pot afectar a mitjà termini la projecció comercial del porc i dels seus productes tant en mercats nacionals com internacionals.



Eviteu que entri a la granja

- Assegureu el bon estat sanitari de la reposició que entreu a l'explotació i poseu els animals en quarantena ja que l'estrès del transport els fa més vulnerables al contagi.
- Utilitzeu aigua potable o cloreu l'aigua de pou.
- Sol·liciteu als vostres proveïdors de pinso que facin autocontrols per garantir l'absència de salmonel·la.
- No permeteu l'entrada de rosegadors, ocells i altres animals indesitjables perquè poden actuar com a vectors de transmissió de la salmonel·la als porcs:
 - Mantingueu en bon estat les naus, les teles de mosquitera de les finestres i les cortines de les portes.
 - Assegureu l'eficàcia del Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
- Adeqüeu els vestidors per als treballadors i els visitants per facilitar la higiene personal, el canvi de roba i la desinfecció del calçat i els estris de treball.
- Eviteu l'entrada de vehicles (càrrega i descàrrega d'animals, pinso, recollida de cadàvers, visites, etc.) dins l'explotació. En cas necessari, prengueu cura especial del següent:
 - La desinfecció de les rodes dels vehicles
 - La neteja de restes de fems, pinso o altres materials que caiguin dels camions.

Eviteu que es transmeti

- Utilitzeu sistemes tot dins-tot fora, netegeu i desinfecteu entre lots.
- Tingueu en compte que la presència de malalties a la granja (Aujeszky, PRSS, disenteria o parasitosis intestinals) poden afavorir la propagació i el contagi de la salmonel·la.
- Les situacions d'estrès (alta densitat, mal maneig en l'engreix o en el transport) afavoreixen que animals portadors excretin salmonel·les per les femtes. Per evitar-ho, mantingueu un elevat grau de benestar dels animals.
- Disposeu d'instal·lacions adequades per facilitar l'evacuació de purins i la neteja periòdica de la nau.



Formeu els treballadors

- Doneu-los la capacitat necessària i consciencieu-los de la importància de seguir unes pràctiques correctes per prevenir la transmissió de salmonel·la.
- Al principi de cada jornada, el personal ha de fer servir roba neta i calçat desinfectat i d'ús exclusiu de la granja.
- Assegureu-vos que segueixin mesures d'higiene personal.
- Comenceu a treballar per la nau dels animals més joves i, quan canvieu de nau, desinfecteu el calçat.

No hi ha una estratègia de control única, cal combinar mesures pràctiques en funció de cada granja. Aquestes mesures són vàlides per al manteniment de l'estat sanitari general i es poden integrar en el Codi de pràctiques correctes.