

Qu'est-ce qu'on doit faire quand ton partenaire ne veut pas utiliser le préservatif?

Il est convenable d'en parler, négocier, apprendre à jouer avec le préservatif (aussi bien le masculin que le féminin).

Et si, malgré tout, ton partenaire n'accepte pas d'utiliser le préservatif? Est-ce que cela en vaut la peine de courir le risque?

On peut toujours stimuler l'imagination et jouir du sexe par des caresses et sans pénétration.



**Jamais cela n'en vaut la peine de courir le risque.
Peut-être faut-il dire: NON!**

Pour avoir plus d'information, on peut se rendre au:

- Centre d'assistance primaire:
Programme d'Attention à la Femme
- Gynécologue
- Médecin traitant

Souviens-toi:

- Une personne peut être infectée et ne pas le savoir.
- Si on a des doutes il faut se rendre dans un centre de santé.
- L'utilisation correcte du préservatif est la méthode la plus efficace pour éviter la transmission.
- Les M.S.T. peuvent être prévenues.



Les femmes et les maladies sexuellement transmissibles (M.S.T.)

Que sont les M.S.T.?

Les M.S.T. sont des infections provoquées par des micro-organismes (microbes) qui sont transmis par les rapports sexuels. Autrefois on les appelait maladies vénériennes.

Qui en est affecté?


Particulièrement toute personne qui ait des rapports sexuels sans préservatif (condom, capote) avec une personne infectée par ces maladies. Il est plus facile de s'infecter si on change souvent de partenaire (plus on a des partenaires, plus on a de risque) ou lorsque le partenaire habituel a, de sa part, d'autres rapports sexuels.

Et si on n'a des rapports qu'avec des gens sains?

On ne doit pas se fier aux apparences. Il y a des personnes qui sont infectées et ne le savent pas, et c'est de cette façon que les M.S.T. sont transmises habituellement. C'est pourquoi, si on fait régulièrement des examens gynécologiques, il est plus facile de détecter des troubles et prévenir des complications plus graves, telles que stérilité, grossesses ectopiques (extra-utérines), et même cancers génitaux.

Comment est-ce que les M.S.T. sont transmises?

Ça dépend des différentes pratiques sexuelles. Mais surtout elles sont transmises par les muqueuses (vagin, anus, bouche) et par le sang (blessures ou menstrues).



Quelles sont les M.S.T.?

Les plus connues sont les chlamydia, la gonococcie, les trichomonas, le syphilis, ainsi que les condylomes acuminés (verrues génitales), l'herpès génital, l'hépatite B et le sida.

Quand est-ce qu'on doit aller dans un centre de santé?

Quand on a des douleurs ou des démangeaisons à la zone génitale, et aussi quand on a des plaies, des ampoules ou des suppurations.

Si on a eu des rapports sexuels sans protection (c'est-à-dire, sans utiliser le préservatif) et on n'a pas de partenaire stable, il est convenable de consulter des professionnels, bien qu'on n'ait pas de symptômes.

Est-ce qu'on peut éviter la transmission des M.S.T.?

Oui, bien sûr, pourvu qu'on évite les rapports sexuels avec une personne infectée.

Si on a des rapports avec une personne et on ignore si elle est infectée, il faut utiliser le préservatif masculin ou féminin (tous les deux peuvent être utilisés). Si on l'utilise correctement, le préservatif aide à éviter la transmission des M.S.T., le sida y compris.

Il n'y a que deux maladies qui peuvent être prévenues par le vaccin: l'hépatite A et l'hépatite B.


Si on utilise une autre méthode, il faut utiliser le préservatif?

Oui, bien qu'on utilise une autre méthode contraceptive, ou qu'on soit arrivée à la ménopause, il faut utiliser le préservatif si on veut éviter la transmission des M.S.T. Outre la méthode contraceptive habituelle il faut utiliser le préservatif. Si on ne veut utiliser qu'une méthode, c'est le préservatif qu'il faut utiliser.


Si on est déjà infectée, il faut suivre quelque traitement?

Oui, c'est probable. Beaucoup de M.S.T. diagnostiquées et traitées précocement ne provoquent plus jamais de problèmes. Au contraire, si les M.S.T. sont diagnostiquées trop tard ou le traitement n'est pas correcte, il est plus difficile de les guérir et elles peuvent aboutir à des complications graves, telles que stérilité et cancers génitaux.


Si on est déjà infectée, il faut se protéger?



Oui, bien sûr, pour éviter des réinfections qui peuvent causer des troubles ou aggraver la situation.



Si on est enceinte, il faut se protéger?



Oui, parce que le fait d'être enceinte ne veut pas dire qu'on ne doit pas se protéger si on a des relations avec une personne infectée.

Et dans le cas où on serait infectée, le traitement est encore plus important pour éviter que la maladie affecte le fœtus pendant son développement, ou le nouveau-né pendant l'accouchement ou l'allaitement.

