


Recomanacions per disminuir els esdeveniments adversos en la prescripció d'anticoagulants orals d'acció directa (ACOD)

1 Apreneu els noms dels ACOD.



2 Recordeu que el tractament de les hemorràgies dels pacients tractats amb ACOD és diferent del dels pacients tractats amb warfarina i heparina.

3 Els agents reversors dels ACOD no són tan coneguts i és possible que no estiguin disponibles en tots els centres de salut.



4 Alguns ACOD no tenen agent reversor, per la qual cosa els pacients que estiguin tractats amb aquests anticoagulants han de seguir estrictament les pautes establertes.



5 Eviteu la duplicació terapèutica: no tots els professionals estan familiaritzats amb els ACOD i els pacients poden no reconèixer els seus medicaments com anticoagulants quan se'ls pregunta.

6 Avalueu el risc d'hemorràgia abans de dur a terme una cirurgia i en segons quins procediments ambulatoris.



7 Quan es realitzi una transició d'un pacient tractat amb ACOD, comuniqueu tots els detalls del tractament amb ACOD.

8 Tingueu protocol·litzades les proves de laboratori basals i de seguiment amb ACOD perquè els pacients rebin la dosi i el control adequats.



9 Indiqueu per escrit les instruccions del tractament al pacient i afegiu-les a la recepta i la seva història clínica electrònica.

10 Informeu els pacients i els familiars sobre els ACOD. Assegureu-vos que entenen:

- Quina dosi i quan han de prendre la medicació.
- La importància de les visites de seguiment i de les proves que se'ls demani.
- Les possibles interaccions amb altres medicaments i aliments.
- Les possibles reaccions adverses al medicament.
- Quan cal contactar el personal mèdic i anar a urgències.