

**Drenatges**

**Drenatge tipus Penrose**



<b>Descripció</b>	<input type="checkbox"/> Tub de làtex o silicona, elàstic i radioopac disponible en diferents diàmetres que drena líquids biològics d'una cavitat per capil·laritat a través d'una obertura cutània practicada prop de la incisió principal, inclòs en la mateixa incisió.	
<b>Objectius</b>	<input type="checkbox"/> Estandarditzar les cures d'infermeria del drenatge tipus Penrose. <input type="checkbox"/> Garantir el drenatge per afavorir la cicatrització.	
<b>Material</b>	<input type="checkbox"/> Gel hidroalcohòlic <input type="checkbox"/> Guants de nitril o làtex d'un sol ús, no estèrils <input type="checkbox"/> Guants de nitril o làtex estèrils <input type="checkbox"/> Gases i apòsit estèril <input type="checkbox"/> Talla estèril <input type="checkbox"/> Xopador <input type="checkbox"/> Contenidor de residus del grup II i III	<input type="checkbox"/> Sèrum fisiològic <input type="checkbox"/> Xeringa 10 cc per a rentats <input type="checkbox"/> Bisturí de seguretat d'un sol ús <input type="checkbox"/> Esparadrap hipoal·lèrgic <input type="checkbox"/> Povidona iodada aquosa <input type="checkbox"/> Instrumental necessari: pinces kocher, tisores, pinces de dissecció

**Procediment i tècnica**

- **Recomanacions generals:**
  - ✓ Presentar-se amb nom i categoria professional.
  - ✓ Informar el pacient i/o família del procediment i la seva finalitat.
  - ✓ Acomodar el pacient i respectar la seva intimitat en tot moment.
  - ✓ Preparar el material necessari.
  - ✓ Seguir les mesures generals d'asèpsia.
  - ✓ Realitzar el procediment segons els protocols establerts.
  - ✓ Recollir el material utilitzat i rebutjar els residus als contenidors específics.
  - ✓ Enregistrar el procediment i les incidències a la història clínica d'atenció primària (ECAP).
- **Tècnica**
  - ✓ Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic.
  - ✓ Col·locar-se els guants de nitril o làtex, d'un sol ús.
  - ✓ Retirar l'apòsit utilitzant sèrum fisiològic en cas que aquest estigui molt adherit a la pell.
  - ✓ Observar l'aspecte de la ferida, punt de sortida del drenatge, aspecte i quantitat d'exsudat i permeabilitat.
  - ✓ Retirar guants i fer higiene de mans.
  - ✓ Preparar el camp estèril i col·locar-se els guants estèrils.
  - ✓ Netejar la pell circumdant del punt d'inserció des de dins a fora amb gases estèrils i sèrum fisiològic, assecat i aplicar povidona iodada.
  - ✓ Realitzar rentats a través del punt d'entrada del drenatge amb sèrum fisiològic o povidona iodada.
  - ✓ Mobilitzar el Penrose cap enfora i cap endins amb cura de no retirar-lo.
  - ✓ Col·locar una gasa entre pell i drenatge i tapar la ferida amb les gases suficients per absorbir l'exsudat i fixar-les a la pell. Canviar apòsit sempre que estigui brut, desenganxat o cada 24 hores.
  - ✓ Rebutjar tot el material en el contenidor de residus corresponents.
  - ✓ Retirar-se el guants i procedir a la desinfecció de les mans.

**Annex 1.**  
**Drenatge tipus Penrose**

ICS\_INF\_PID\_A\_001  
Data de revisió: 10/2020  
Versió: 01

**Retirada del drenatge**

- Higiene de mans
- Col·locar un xopador
- Col·locar-se els guants de nitril o làtex, d'un sol ús
- Retirar l'apòsit.
- Retirar-se els guants i fer higiene de mans.
- Preparar camp estèril.
- Col·locar-se els guants estèrils.
- Desinfectar la zona amb povidona iodada aquosa.
- Retirar el punt d'inserció amb el bisturí, en cas que n'hi hagi, i rebutjar-lo immediatament en contenidor de residus del grup III.
- Retirar, amb suavitat, el drenatge i rebutjar-lo en el contenidor de residus del grup II.
- Valorar si encara hi ha algun tipus d'exsudat.
- Netejar la zona amb l'antisèptic.
- Col·locar l'apòsit amb gases estèrils.
- Recollir el material i rebutjar-lo en el contenidor de residus corresponent.
- Retirar-se els guants.
- Desinfectar-se les mans.

**Vigilància**

- Signes i símptomes que puguin indicar complicacions.
- Valorar el punt d'inserció del drenatge.
- Observar l'aparició d'envermelliment de la pell.
- Controlar l'aparició de febre o dolor abdominal.
- Valorar si augmenta el debit del drenatge.

**Complicacions**

- Infecció del punt d'entrada
- Desplaçament del drenatge
- Distensió o dolor abdominal
- Febre
- Punxada accidental, si s'utilitza bisturí (en aquest cas, seguir el procediment corresponent: PO/VS/02:  
[http://portal.ics.intranet.gencat.cat/intranet\\_ics/media/upload/arxius/PRL/PO\\_VS\\_02\\_a\\_ccio\\_biologics\\_primaria\\_v3.pdf](http://portal.ics.intranet.gencat.cat/intranet_ics/media/upload/arxius/PRL/PO_VS_02_a_ccio_biologics_primaria_v3.pdf))

**Tractament de material i residus**

- Llençar tot el material d'un sol ús a la bossa de residus sanitaris del grup II.
- Rebutjar tot el material punxant en el contenidor de residus del grup III.