

Entà pr'amor qu'eth mainatge age un desvolopament globau e deth lenguatge corrècte, ei fòrça important detectar-li precoçament era sordesa.

### **Cau avalorar era audicion deth vòste mainatjon?**

Abans dera nauta, ena vòsta maternitat se harà era pròva d'audicion ath mainatjon, que servirà entà saber se i sent corrèctaments.

### **Per qué se hè era pròva d'audicion?**

Un de cada mil mainatjons aurà ua sordesa que calerà tractar entà qu'eth mainatge pogue auer un corrècte desvolopament globau.

Eth Programa deth cribratge dera ipoacúsia darà un diagnostic en edats precoces.

### **Per qué ei important avalorar era audicion deth mainatge?**

Era sordesa a ues conseqüències importants ena parla e en desvolopament emocionau, escolar, motor e sociu des mainatges.

### **Qué son es factors de risc?**

Son es causes que pòden favorir era preséncia o era aparicion posteriora d'un deficit auditiu en mainatge.

Es professionaus sanitaris vos dideràn se qué cau hèr en cas qu'existisquen factors de risc.

### **Com se hè era pròva d'audicion?**

Era tecnica des potències evocadi auditius automatizadi ei ua pròva fòrça simpla que consistís ena col·locacion d'uns auriculars —pes quaus s'envie ues estimulacions sonores— e uns electròdes que mos permeten enregistrar era resposta auditiva.

### **Pòt produir bèra incomoditat ath vòste mainatjon?**

Non li compòrte cap tipe d'incomoditat.

### **Quan vos daràn es resultats de la pròva d'audicion?**

Dempús d'amiar a tèrme era pròva d'audicion, es professionaus sanitaris responsables vos informaran des resultats e les anotaràn en caièr de salut infantila deth mainatjon.

### **Qué vòlen díder aguesti resultats?**

**S'eth mainatge passe eth tèst**, ei fòrça pòc probable qu'age ua deficiència auditiva. Ei important observar tostemp era audicion deth mainatjon pendent es primèrs ans.

**S'eth mainatge non passe eth tèst**, ei essenciau repetir era pròva tath torn deth primèr mes de vida entà verificar-ne es resultats, pr'amor que i a factors transitòris que dificulten era avaloracion corrècta dera audicion deth mainatjon pendent es primèrs dies.

Un còp hèta aguesta dusau pròva, s'eth mainatge non la passe, eth professionau sanitari vos derivarà tara unitat de referéncia entath diagnostic dera ipoacúsia entà pr'amor que li hèsqen es pròves diagnostiques pertinentes (tath torn deth tresau mes de vida).

Un còp obtengudi es resultats, se vos darà tota era informacion de besonh entà conselhar-vos sus es passi que cau seguir.



Per qué cau hèr era deteccion precòça dera ipoacúsia ath vòste mainatge?

Eth Programa de deteccion precòça dera ipoacúsia servirà entà detectar s'eth mainatge i sent corrèctaments. Ei important hèr eth cribratge a toti es mainatges.

Deuant de quinsevolh dobte o sospeita de deficit auditiu, consultatz as professionaus sanitaris deth vòste centre.

/Salut

Generalitat de Catalunya

canalsalut.gencat.cat

DL: B-21.363-2020



Per tal que l'infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte, és molt important detectar-li precoçment la sordesa.

### Cal valorar l'audició del nadó?

Abans de l'alta, al vostre centre maternal es farà la prova d'audició al nadó, que servirà per saber si hi sent correctament.

### Per què es fa la prova d'audició?

Un de cada mil nadons tindrà una sordesa que caldrà tractar perquè l'infant pugui tenir un correcte desenvolupament global.

El Programa del cribratge de la hipoacúsia proporcionarà un diagnòstic en edats precoces.

### Per què és important valorar l'audició de l'infant?

La sordesa té unes repercussions importants en la parla i el desenvolupament psicomotor dels infants.

### Què són els factors de risc?

Són aquells que poden afavorir la presència o l'aparició posterior d'un dèficit auditiu en l'infant.

Els professionals sanitaris us diran què cal fer en el cas que existeixin factors de risc.

### Com es fa la prova d'audició?

La tècnica dels potencials evocats auditius automatitzats és una prova molt senzilla que consisteix en la col·locació d'uns auriculars —a través dels quals s'envien uns estímuls sonors— i uns elèctrodes que ens permeten registrar la resposta auditiva.

### Pot produir alguna incomoditat al vostre nadó?

No li comporta cap tipus d'incomoditat. Sovint, la prova es realitza mentre el nadó dorm o pren el pit.

### Quan us donaran els resultats de la prova d'audició?

Després de dur a terme la prova d'audició, els professionals sanitaris responsables us informaran dels resultats i els anotaran en el carnet de salut infantil.

### Què volen dir aquests resultats?

**Si passa el test**, és molt poc probable que tingui una deficiència auditiva. És important seguir observant l'audició durant els primers anys.

**Si no passa el test**, és essencial repetir la prova al voltant del primer mes de vida, per verificar-ne els resultats, perquè hi ha factors transitoris que dificulten la valoració correcta de l'audició durant els primers dies.

Un cop feta aquesta segona prova, si l'infant no la passa, el professional sanitari us derivarà a la unitat de referència per al diagnòstic de la hipoacúsia per tal que li facin les proves diagnòstiques pertinents (al voltant del tercer mes de vida).

Un cop obtinguts els resultats, se us facilitarà tota la informació necessària per assessorar-vos sobre els passos que s'han de seguir.



Per què cal fer la detecció precoç de la hipoacúsia al nadó?

El Programa de detecció precoç de la hipoacúsia servirà per detectar si l'infant hi sent correctament. És important fer el cribratge a tots els infants.

Davant de qualsevol dubte o sospita de dèficit auditiu, consulteu els professionals sanitaris del vostre centre.

/Salut

Generalitat de Catalunya

canalsalut.gencat.cat

DL: B-21.363-2020

