

کیا آپ کے کسی بچے کی عمر 21 تا 81 سال کے درمیان ہے؟ ان کے
CCOCOGNINEM (میننگوکوکل ویکسین کے تحفظ میں) توسیع کروائیں

VACUNACIÓN
Meningitis

AC
WY



#MeningitisACWY
www.vacunameningitis.es

2014 کے بعد سے، سیروگروپس C، W اور Y کی وجہ سے میننگوکوکل کی بیماری کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں، 12 سال کی عمر میں میننگوکوکل C کا احاطہ کرنے والے ایک ٹیکے کو کیلنڈر میں ایسے ایک اور ٹیکے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے جو میننگوکوکل کے چار سیروگروپس (A، C، W اور Y) کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔

میننگوکوکل بیماری نایاب لیکن سنگین نوعیت کی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور تاعمر رہنے والی سنجیدہ نوعیت کی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔

نوعمر اور نوجوان افراد کو یہ انفیکشن لاحق ہوسکتا ہے، اور بہاں تک کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی علامات کا شکار نہیں ہوتے تو بھی وہ اپنے بہنوں/بھائیوں، دادا/دادی/نانا/نانی اور دوستوں میں بھی اسے منتقل کر سکتے ہیں۔

لہذا 12 سال کی عمر میں ویکسینیشن کے علاوہ، 13 سے 18 سال کی عمر کے نوجوان افراد کو بھی ویکسینیشن کروانی چاہیئے۔

صرف ایک ٹیکے سے ہم اپنا اور دیگر تمام افراد کا تحفظ کرتے ہیں۔

یہ ٹیکہ دسمبر 2022 تک مرحلہ وار بنیادوں پر جاری رہے گا۔

اپنے علاقے میں موجود صحت کی خدمات کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں، تو اپنے صحت کے مرکز یا فارمیسی سے پوچھیں۔

ویڈیو کی معلومات:

تا دسمبر 2022

مرکز ہدایات صحت

فارہسی



اس بارے میں مزید جاننے تاکہ آپ اپنے بچے کو ان چیزوں کی وضاحت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں اور بیماری سے ان کی حفاظت کر سکیں



Generalitat de Catalunya
Departament
de Salut

MenACWY کمیونیکیشن ورکنگ گروپ کے ساتھ شراکت داری میں تیار کیا گیا جنوری 2020



کیا آپ کے کسی بچے کی عمر 12 تا 18 سال کے درمیان ہے؟ ان کے میننگوکوکول (MENINGOCOCCAL) ویکسین کے تحفظ میں توسیع کرائیں

2014 کے بعد سے، سیروگروپس C، W اور Y کی وجہ سے میننگوکوکول کی بیماری کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں، 12 سال کی عمر میں میننگوکوکول C کا احاطہ کرنے والے ایک ٹیکے کو کیلنڈر میں ایسے ایک اور ٹیکے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے جو میننگوکوکول کے چار سیروگروپس (A، C، W اور Y) کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔

میننگوکوکول بیماری ناپاب لیکن سنگین نوعیت کی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور تاعمر رہنے والی سنجیدہ نوعیت کی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔

نوعمر اور نوجوان افراد کو یہ انفیکشن لاحق ہوسکتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی علامات کا شکار نہیں ہوتے تو بھی وہ اپنے بہنوں/بھائیوں، دادا/دادی/نانا/نانی اور دوستوں میں بھی اسے منتقل کر سکتے ہیں۔

لہذا 12 سال کی عمر میں ویکسینیشن کے علاوہ، 13 سے 18 سال کی عمر کے نوجوان افراد کو بھی ویکسینیشن کروانی چاہیئے۔

صرف ایک ٹیکے سے ہم اپنا اور دیگر تمام افراد کا تحفظ کرتے ہیں۔

یہ ٹیکہ دسمبر 2022 تک مرحلہ وار بنیادوں پر جاری رہے گا۔

اپنے علاقے میں موجود صحت کی خدمات کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں، تو اپنے صحت کے مرکز یا فارمیسی سے پوچھیں۔

ویڈیو کی معلومات:

تا دسمبر 2022

مرکز برائے صحت

فارمیسی

اس بارے میں مزید جاننے تاکہ آپ اپنے بچے کو ان چیزوں کی وضاحت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں اور بیماری سے ان کی حفاظت کر سکیں

MenACWY کمیونیکیشن ورکنگ گروپ کے ساتھ شراکت داری میں تیار کیا گیا

جنوری 2020