

# Vacuna COVID-19 Johnson & Johnson / Janssen



## Com actua?

- Adenovirus humà del refredat comú (adenovirus 26) sense capacitat de replicació.
- Produeix immunitat a partir de la reacció del cos a les proteïnes del virus.
- Eficàcia del 66,9% amb una única dosi.



## Presentació i conservació

- Vials multidosi (almenys de 5 dosis).
- Conservar entre 2 °C i 8 °C.
- Caducitat de 3 mesos.
- Es pot conservar fins a 12 hores sense refrigerar.
- Una vegada perforat el vial s'ha d'administrar durant les 3 hores següents.



## A qui es pot administrar?

### Indicada

- Des dels 18 anys.


### Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



## Administració

- Intramuscular en el deltoide o múscul vast de la cuixa.
- Una única dosi.



## Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
  - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
  - Febre o febrícula
  - Fatiga
  - Maldecap
  - Calfreds
  - Nàusees
  - Dolor articular o muscular

\* S'ha descrit un efecte advers molt rar i potencialment molt greu: trombosis associada a trombocitopènia, sobre tot en persones menors de 60 anys.

Per a més informació, consulteu [canalsalut.gencat.cat/vacuna-janssen](https://canalsalut.gencat.cat/vacuna-janssen)