

Vacuna COVID-19 Moderna/Lonza



Com actua?

- Utilitza ARN missatger basat en el genoma de la COVID-19.
- Produeix immunitat combinada: humoral i cel·lular.
- Eficàcia del 94,5%, 14 dies després de la segona dosi.



Presentació i conservació

- Vial multidosi amb 10 dosis de 0,5 ml.
- Conservar entre -25 °C i -15 °C.
- Caducitat de 7 mesos.
- Es pot mantenir refrigerada 30 dies entre 2 °C i 8° C



A qui es pot administrar?

Indicada

- Des dels 18 anys.


Contraindicada

- Hipersensibilitat greu a alguna dosi prèvia o algun dels components.



Administració

- Intramuscular en el deltoide o múscul vast de la cuixa.
- Dues dosis de 0,5 ml.
- Interval entre dosis: almenys 4 setmanes (28 dies)



Efectes adversos

- Reportar-los al sistema de farmacovigilància.
- Es resolen pocs dies després de la vacunació, són lleus o moderats, i es pot fer servir tractament simptomàtic:
 - Sensibilitat o dolor al lloc de la injecció
 - Febre o febrícula
 - Fatiga
 - Maldecap
 - Calfreds
 - Nàusees
 - Dolor articular o muscular

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacuna-moderna