



## **INFORME TÉCNICO DE RESUMEN DE LOS CASOS DE LA COVID-19 EN CATALUÑA – 6.6.2020 (núm. 12)**

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete graves, con una exposición común en un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado se cerró el día 1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia *Coronaviridae*, que fue denominado nuevo coronavirus 2019-nCoV y posteriormente ha sido denominado coronavirus SARS-CoV-2. Su secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero de 2020. El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus SARS-CoV-2 en China emergencia de salud pública de importancia internacional.

Posteriormente, el brote se ha extendido fuera de las fronteras chinas, afectando otros países, muchos de ellos en Europa. El brote en Italia ha afectado a un porcentaje elevado de población y, a partir de aquí, han aparecido un número elevado de casos en Cataluña y en el resto del Estado español.

El primer caso confirmado de infección por coronavirus SARS-CoV-2 en Cataluña se notificó el día 25 de febrero de 2020 en el Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (SUVEC). Se trataba de una mujer de 36 años residente en Barcelona que había viajado del 12 al 22 de febrero a las ciudades de Bérgamo y Milán. Empezó la sintomatología el día 20 de febrero y requirió hospitalización evolucionando de forma favorable.

Los casos crecieron de forma lentamente progresiva en Cataluña durante la fase de contención, primera fase de la pandemia, dado que desde la Red de Vigilancia Epidemiológica (XVEC) las medidas que se aplicaron fueron restrictivas en cuanto a la limitación de movimientos de los contactos próximos de los casos. Esta medida fue pionera en todo el Estado, dado que Cataluña mantuvo la transmisión limitada a cadenas localizadas durante un tiempo antes de pasar a la transmisión comunitaria; con esta medida se consiguió limitar la transmisión durante un tiempo.

Los casos fueron aumentando progresivamente hasta llegar a la situación epidemiológica actual, de transmisión comunitaria generalizada, lo cual tuvo como consecuencia el paso de la fase de contención a la fase de mitigación a partir del día 14 de marzo de 2020. Ello ha comportado la incorporación de una serie de cambios en la gestión de casos y contactos.


Los casos fueron disminuyendo progresivamente y, a partir del día 11 de mayo, se ha entrado en la actual fase de desconfinamiento, en la que es fundamental la detección precoz de casos sospechosos de COVID-19 con el fin de hacer su diagnóstico en estadios iniciales de la enfermedad e indicar su aislamiento inmediato, detectar sus contactos estrechos para hacer la cuarentena y



para su seguimiento. También es prioritaria la identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos.

El día 27 de mayo de 2020 el número de casos confirmados acumulados en Cataluña ha sido de 58.480. Su distribución temporal se muestra en la figura 1. Un 47,1% de los casos han requerido ingreso hospitalario y un 4,7% han presentado criterios de gravedad. La tasa de letalidad es de 11,7%.


Estas tasas se tienen que interpretar con cautela, dado que el denominador común puede ser mucho mayor, teniendo en cuenta el elevado número de casos con síntomas compatibles de carácter leve, en los cuales no se ha practicado ninguna prueba confirmatoria, que se han detectado durante las dos fases anteriores.



**Figura 1. Curva temporal de casos confirmados acumulados de la COVID-19 en Cataluña. Escala logarítmica.**

**Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)**


En la figura 2 se observa que la distribución territorial de los casos no es homogénea, dado que hay diferencias importantes entre las tasas de incidencia acumulada (IA) de los diversos territorios de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC). El territorio de la Catalunya Central presenta la tasa más elevada en el global de los casos acumulados durante toda la pandemia, muy superior al resto de los territorios. La tasa de incidencia acumulada para el total de Cataluña es de 821 casos por 100.000 habitantes.



**Figura 2. Tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de los casos confirmados de la COVID-19 por territorios.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)

Con respecto a la evolución de las tasas de incidencia durante las últimas dos semanas por territorios sigue destacando la heterogeneidad. La tasa global ha sido de 24,5 y 14,5 x 100.000 habitantes, respectivamente. Las tasas de los territorios han oscilado entre las mínimas en Terres de l'Ebre y las máximas presentadas en la provincia de Lleida y la ciudad de Barcelona, aunque estos territorios han presentado una disminución importante con respecto a la semana anterior, durante la cual habían mostrado un incremento notable a causa, fundamentalmente, de agrupaciones de casos aparecidos en algunos ámbitos concretos del territorio (figura 3).




**Figura 3. Tasas de incidencia acumulada en las dos semanas anteriores de los casos confirmados de la COVID-19 por 100.000 habitantes por territorios.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)




En la figura 4 se observa la evolució seguida a lo largo del tiempo por las tasas de incidencia en el ámbito de los diferentes territorios de la Red de Vigilancia Epidemiológica.



**Figura 4. Tasas de incidencia acumulada de los casos confirmados de la COVID-19 por 100.000 habitantes por territorios.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)

Si estudiamos el porcentaje de variación de los casos positivos con respecto a los casos acumulados del día anterior, observamos que las cifras han ido disminuyendo a lo largo del periodo (figura 5), de forma notable durante los últimos días, en los cuales se sitúan en todo momento en torno al 0% de variación respecto del día anterior.




**Figura 5. Variación proporcional de los casos confirmados diarios de la COVID-19 en Cataluña.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)




En la distribución de los casos por grupos de edad se observa, proporcionalmente, que el grupo de edad más afectado es el de 80 a 89 años (17,38%), seguido por el de 50 a 59 (16,01%). Los casos notificados incluidos en los grupos de edad entre 40 y 89 años representan el 72,7% de todos los casos confirmados (figura 6).



**Figura 6. Distribución proporcional por grupos de edad de los casos de la COVID-19 en Cataluña.**

**Fuente y elaboración:** Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)


En la figura 7 se puede observar la evolución de las tasas de incidencia por grupos de edad. El grupo de más de 89 años que había presentado un incremento mucho más pronunciado durante toda la pandemia que el resto muestra una tendencia a estabilizarse. El de 80 a 89 años se ha mostrado estable durante las últimas semanas y el resto de grupos están en la misma tendencia seguida durante el último mes.



**Figura 7. Tasas de incidencia acumulada por 10.000 habitantes de los casos confirmados de la COVID-19 por grupos de edad.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)

La figura 8 muestra la incidencia acumulada semanal distribuida por grupos de edad. Hay una diferencia muy acusada entre las tasas de incidencia de los grupos de más edad con respecto a los otros. La curva del grupo de mayor edad muestra un incremento progresivo hasta la semana 16, para disminuir también de manera progresiva posteriormente, aunque mantiene las tasas más elevadas. La tasa de incidencia global se ha mantenido en situación estable a un nivel mínimo durante las últimas semanas.




**Figura 8. Tasas de incidencia acumulada semanal de casos confirmados de la COVID-19 por 10.000 habitantes por grupos de edad.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)




En la figura 9 se observa de manera más clara como las tasas de incidencia acumulada de los grupos de personas más mayores son mucho más elevadas durante las últimas dos semanas que en el resto de grupos, y de forma mucho más acusada en el grupo de personas de 90 años o más.



**Figura 9. Tasas de incidencia acumulada en las dos semanas anteriores de los casos confirmados de la COVID-19 por 10.000 habitantes por grupos de edad.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)


En la distribución por sexos se observa que afecta más a las mujeres (59,5%) que a los hombres (40,5%), aunque estratificando por edades, en los grupos comprendidos entre los 60 y los 79 años, afecta más a los hombres que a las mujeres (figura 10).



**Figura 10. Distribución por grupos de edad y sexo de los casos de la COVID-19 en Cataluña.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)


En el 17% de los casos confirmados se ha notificado que hay antecedentes de riesgo. El más frecuentemente detectado ha sido la enfermedad cardiovascular (7%) seguido de la hipertensión arterial (6,5%). Algunos pacientes han presentado más de un factor de riesgo (figura 11).



**Figura 11. Antecedentes de riesgo en los casos confirmados de la COVID-19 en Cataluña.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)

Las últimas semanas, de manera general, se ha reducido el número de pruebas diarias de PCR practicadas. El número de casos confirmados en relación con las pruebas de laboratorio realizadas ha ido disminuyendo progresivamente a partir de mediados de abril, y se ha situado las últimas semanas por debajo del 10% (figura 12).




**Figura 12. Proporción de confirmación de casos en las pruebas practicadas.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)






En la figura 13 se muestra la evolución seguida a lo largo del mes de mayo según la fecha de inicio de la sintomatología por los casos confirmados en cada territorio de la Red de Vigilancia Epidemiológica.



**Figura 13. Distribución territorial de los casos de la COVID-19 en Cataluña según la fecha de inicio de los síntomas.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)

La distribución de las defunciones a lo largo del mes de mayo por casos confirmados de la enfermedad según la fecha en la cual se ha producido la defunción se muestra en la figura 14, en la que se observa una reducción progresiva en todos los territorios.



**Figura 14. Distribución territorial de las defunciones por la COVID-19 en Cataluña según la fecha de defunción.**

Fuente y elaboración: Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC)



Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut  
**Secretaria de Salut Pública**

Subdirecció General de Vigilància i Resposta  
a Emergències de Salut Pública

***Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC): servicios de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública en el Barcelonès Nord y Maresme, Barcelona Sud, Vallès Occidental y Vallès Oriental, Catalunya Central, Girona, Lleida-Alt Pirineu i Aran y Tarragona-Terres de l'Ebre, Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Subdirección General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública y Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña.***

*Agradecimientos: red asistencial de Cataluña y sistema de notificación microbiológica de Cataluña.*