



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

La incapacitat temporal a Catalunya
2018
Informe 11

28 octubre 2019

Situació de la incapacitat temporal a Catalunya (1)

❑ Incapacitat temporal per contingències comunes:

1. Estudi de les baixes agregades. Casos vàlids.
2. Indicadors principals d'incapacitat temporal (IT) per contingència comuna (0-18 mesos). Evolució temporal darrers anys.
3. Incidència mensual acumulada, per 100 persones afiliades.
4. Edat mitjana, per sexe.
5. Distribució dels grups diagnòstics, per sexe.
 - 5.1. Distribució grups diagnòstics seleccionats, per tipus d'ocupació i sexe
6. Incidència acumulada, per grups d'edat i sexe.
7. Incidència acumulada, per província.



Situació de la incapacitat temporal a Catalunya (2)

8. Distribució d'interval·ls de durada, per sexe.
9. Durada mitjana d'IT, per grups d'edat i sexe.
10. Dies en IT per contingència comuna per persona afiliada d'alta a la Seguretat Social*, per grups d'edat i sexe.
11. Durada i dies en IT, per grups diagnòstics, total i per sexe.
12. Durada i dies en IT, per província.
13. Variació d'indicadors IT 2018 vs 2017.

*A efectes dels informes de la IT, sempre que s'esmenti persona afiliada o treballador afiliat indica treballador/a afiliat/ada d'alta, o assimilat/ada a l'alta, a la Seguretat Social.

Situació de la incapacitat temporal a Catalunya (3)

- ❑ Incapacitat temporal per contingències professionals (IT-CP) a Catalunya. Notificacions al Sistema d'Informació de Gestió de la IT (SIGIT).

14.1. Introducció.

14.2. Estudi de les baixes per contingències professionals. Casos vàlids.

14.3. Edat mitjana, per sexe.

14.4. Distribució dels grups diagnòstics, per sexe.

14.5. Distribució d'interval de durada, per sexe.

14.6. Durada mitjana d'IT-CP, per grups d'edat i sexe.

14.7. Durada i dies en IT-CP, per grups diagnòstics i sexe.

14.8. Indicadors principals d'incapacitat temporal per contingència professional (IT-CP) (0-18 mesos), notificacions al SIGIT.



1. Estudi de les baixes agregades. Casos vàlids

Casos vàlids per a l'estudi de les baixes en relació a:

- a. Any i mes d'inici de la IT i de l'alta
- b. Sexe
- c. Grup d'edat
- d. Grup diagnòstic (CIM10)
- e. Règim d'afiliació
- f. Província




2. Indicadors principals d'IT per contingència comuna (0-18 mesos). De l'any 2013 al 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre treballadors afiliats (mitjana)	2.886.816	2.935.368	3.038.473	3.151.811	3.274.073	3.370.288
Nombre IT iniciades (noves baixes)	780.815	815.250	910.023	1.035.137	1.137.922	1.310.211
Incidència acumulada/100 treb.	27,0	27,8	30,0	32,8	34,8	38,9
Nombre IT 0-18 obertes final període	76.320	82.839	86.284	103.703	112.385	124.419
Nombre afiliats final període	2.862.396	2.944.870	3.051.396	3.166.137	3.270.659	3.370.512
Prevalença final període/100 treb.	2,7	2,8	2,8	3,3	3,4	3,7
Nombre d'altres d'IT	772.809	807.128	900.211	1.006.710	1.118.593	1.293.572
Dies en IT (0-18 mesos)	26.002.726	28.850.701	30.233.772	31.500.030	36.288.554	41.375.061
Durada mitjana	33,6	35,7	33,6	31,3	32,4	32,0
Durada mediana	7	7	7	5	5	4
Dies IT/afiliat	9,0	9,8	10,0	10,0	11,1	12,3



2.1 Indicadors principals d'IT per contingència comuna (0-18 mesos) 2007-2018. Representació gràfica




Producte interior brut. Variació en volum. Unitats: Tant per cent (Base 2010). Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.

<https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=355&t=2018>



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

3. Incidència mensual acumulada per 100 persones afiliades



Gener-desembre	Inciden�cia acumulada per�ode	Variaci� %
2014	27,8%	
2015	30,0%	7,8%
2016	32,8%	9,7%
2017	34,8%	5,8%
2018	38,9%	11,9%

L'any 2018 presenta una incid ncia acumulada superior a la del 2017.

4. Edat mitjana, per sexe


	Homes	Dones	Total
Baixes 2017	512.888	625.034	1.137.922
Edat mitjana	40,6	40,4	40,5
Desviació típica	11,5	11,4	11,5
Edat mediana	40,1	39,5	39,8

	Homes	Dones	Total
Baixes 2018	594.404	715.807	1.310.211
Edat mitjana	40,4	40,4	40,4
Desviació típica	11,6	11,6	11,6
Edat mediana	40,1	39,7	39,9

L'edat mitjana de les baixes tramitades és similar a la de l'any 2017.



5. Distribució dels grups diagnòstics, per sexe



L'any 2018 les IT per malalties respiratòries són les més freqüents, seguides de les malalties osteomusculars. Les malalties mentals representen el 7,1% de les noves IT (com en el 2017).



5.1. Distribució diagnòstics seleccionats (algunes patologies sentinella de possible relació amb el treball), per tipus d'ocupació i sexe.

% de la IT en homes, per tipus d'ocupació


Tipus d'ocupació per CNO	Asma	Dermatitis	Epicondilitis/Epitrocleititis	Hipoacusia	Manegot rotadors	Mesotelioma	S. Canal carpiana	T. de De Quervain	% grup sentinella respecte total IT homes
No manual	0,4%	0,0%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%	0,1%	0,0%	1,4%
Manual	0,4%	0,0%	0,4%	0,0%	1,1%	0,0%	0,3%	0,1%	2,2%
Total	0,4%	0,0%	0,3%	0,0%	0,9%	0,0%	0,2%	0,0%	2,0%

% de la IT en dones, per tipus d'ocupació

Tipus d'ocupació per CNO	Asma	Dermatitis	Epicondilitis/Epitrocleititis	Hipoacusia	Manegot rotadors	Mesotelioma	S. Canal carpiana	T. de De Quervain	% grup sentinella respecte total IT dones
No manual	0,5%	0,0%	0,1%	0,0%	0,6%	0,0%	0,2%	0,1%	1,6%
Manual	0,6%	0,0%	0,4%	0,0%	1,2%	0,0%	0,7%	0,2%	3,1%
Total	0,6%	0,0%	0,2%	0,0%	0,9%	0,0%	0,5%	0,1%	2,3%

Tant en homes com en dones, hi ha un % més alt de diagnòstics sentinella per possible relació laboral en les ocupacions manuals que en les no manuals. La distribució és molt similar a la de 2017.

6. Incidència acumulada, per grups d'edat i sexe



Total 2017

52,3%

42,4%

33,8%

28,7%

29,5%

34,8%

Nota: Persones afiliades en alta publicats per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Font: <http://www.seg-social.es>

L'augment global de la incidència acumulada del 2018 respecte del 2017 és del 11,9% (12,6% els homes, 11,2% les dones). El grup d'edat on augmenta més la incidència acumulada és el grup de 35-44 anys (16,9% els homes, 14,2% les dones).

7. Incidència acumulada, per província


PROVINCIA	Incidència 2018	Incidència 2017	Variació 17-18
Barcelona	41,3%	36,9%	11,8%
Girona	29,5%	26,2%	12,5%
Lleida	27,0%	23,8%	13,6%
Tarragona	35,8%	32,5%	10,3%
Total	38,9%	34,8%	11,9%

L'augment de la incidència s'observa a totes les províncies.



8. Distribució d'interval de durada, per sexe

Distribució % durada de les altes, per sexe, 2018



S'observa un petit increment de les baixes molt curtes i curtes respecte de la distribució de les durades l'any 2017:

- El 44 % de les altes duren entre 1-3 dies (42% el 2017).
- El 71 % de les altes duren entre 1-15 dies (69% el 2017).
- El 80 % de les altes duren entre 1-30 dies (78% el 2017).

La durada mediana ha passat de 5 a 4 dies.




8.1. Intervals de durada: contribució al % d'altres i dels dies en IT

Durada de les altres	N	Dies en IT	% de les altres	% dels dies en IT
1-3 dies	571.529	1.072.314	44,2%	2,6%
4-15 dies	352.969	2.551.701	27,3%	6,2%
16-20 dies	46.634	833.367	3,6%	2,0%
21-30 dies	59.000	1.469.865	4,6%	3,6%
1-2 mesos	97.710	4.175.095	7,6%	10,1%
2-3 mesos	49.419	3.605.636	3,8%	8,7%
3-4 mesos	27.717	2.859.210	2,1%	6,9%
4-12 mesos	66.182	13.772.292	5,1%	33,3%
12-18 mesos	22.412	11.035.581	1,7%	26,7%
Total 2018	1.293.572	41.375.061	100%	100%

Cal assenyalar que hi ha un 1,7% de les IT (1,6% el 2017) que duren més de 12 mesos i que **des del seu inici** sumen el 26,7% de tots els dies en IT (23,5% el 2017).

9. Durada mitjana d'IT, per grups d'edat i sexe




2017 **11,8** **20,0** **28,8** **42,4** **64,4** **32,4**

La durada mitjana és de 32,0 dies i ha disminuït lleugerament respecte de 2017 (32,4 dies) en els dos sexes i en tots els grups d'edat excepte els de 55 o més anys. La durada mitjana és més alta en les dones que en els homes en els grups de 25 a 54 anys.



10. Dies en IT per persona afiliada, per grups d'edat i sexe



2017

6,1

8,4

9,6

11,9

18,3

11,1

La suma de dies en IT per persona afiliada el 2018 ha augmentat un 10,8% respecte del 2017. L'augment de la incidència, i també de la durada en alguns grups diagnòstics, explica aquest resultat.



11. Durada i dies en IT, per grups diagnòstics, total

Altes 2018, grups diagnòstics	N	Durada mitjana IT	Durada mediana IT	Dies en IT (altes)
13-M. sist. osteomuscular	250.575	53,8	13	13.489.761
05-M. mentals	88.412	75,3	24	6.659.393
19-Traumes i altres causes ext.	98.638	54,7	21	5.394.306
02-Tumors	20.735	137,3	48	2.846.566
10-M.sist. respiratori	291.700	6,5	3	1.890.742
11-M. sist. digestiu	82.046	22,8	3	1.873.732
09-M. sist. circulatori	21.980	82,7	28	1.818.230
18-Síntomes i signes diversos	110.201	15,9	3	1.749.941
06-M. sist. nerviós	26.788	42,7	3	1.144.937
14-M. sist. genitourinari	46.369	22,7	6	1.050.953
15-Gestació, part i puerperi	15.887	59,3	29	942.383
01-M. infeccioses i parasitàries	175.102	3,9	2	688.324
07-M. ull i annexes	22.138	28,0	8	619.018
12-M. pell i teixit subcutani	16.539	23,5	7	387.998
08-M. oïda	18.661	16,5	4	307.253
04-M. endocrines	4.766	61,5	28	292.956
03-M. sang	1.610	70,8	26	113.908
17-M. congènites	1.425	73,4	27	104.660
Total	1.293.572	32,0	4	41.375.061

Els primers quatre grups en consum de dies en IT són els mateixos que el 2017. El grup de malalties respiratòries passa a cinquena posició perquè, malgrat mantenir la durada, ha augmentat la seva incidència respecte de 2017.

11.1. Durada i dies en IT (principals grups diagnòstics)

Altes 2018, grups diagnòstics	% del N total d'IT	Durada mitjana IT	Durada mediana IT	% del total de dies en IT
13-M. sist. osteomuscular	19,4%	53,8	13,0	32,6%
05-M. mentals	6,8%	75,3	24,0	16,1%
19-Traumes i altres causes ext.	7,6%	54,7	21,0	13,0%
02-Tumors	1,6%	137,3	48,0	6,9%
35,4%				68,6%

Els primers quatre grups són els mateixos que el 2017. A més de ser freqüents, tenen durades mitjanes llargues. Els tres primers han augmentat tant la IA com la seva durada mitjana respecte de 2017. Els tumors tenen la mateixa IA però han allargat la seva durada mitjana respecte de 2017.



11.2. Durada i dies en IT (grups diagnòstics per sexe)

Altes 2018, grups diagnòstics	N		Durada mitjana IT		Durada mediana IT		Dies en IT (altes)		Dies en IT/Afiliat	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
13-M. sist. osteomuscular	117.391	133.184	48,1	58,9	10	16	5.641.275	7.848.486	3,1	5,0
05-M. mentals	32.321	56.091	76,2	74,8	22	26	2.462.414	4.196.979	1,4	2,7
19-Traumes i altres causes ext.	56.790	41.848	53,5	56,3	22	21	3.037.011	2.357.295	1,7	1,5
02-Tumors	7.785	12.950	142,4	134,2	54	46	1.108.568	1.737.998	0,6	1,1
10-M.sist. respiratori	132.503	159.197	6,4	6,5	3	3	853.908	1.036.834	0,5	0,7
11-M. sist. digestiu	43.712	38.334	25,5	19,8	4	3	1.115.304	758.428	0,6	0,5
09-M. sist. circulatori	12.782	9.198	97,6	62,0	33	22	1.248.066	570.164	0,7	0,4
18-Síntomes i signes diversos	45.293	64.908	14,4	16,9	3	3	653.757	1.096.184	0,4	0,7
06-M. sist. nerviós	8.674	18.114	51,8	38,4	4	2	449.530	695.407	0,3	0,4
14-M. sist. genitourinari	15.744	30.625	23,7	22,1	7	5	373.719	677.234	0,2	0,4
15-Gestació, part i puerperi		15.887		59,3		29		942.383	0,0	0,6
01-M. infeccioses i parasitàries	83.808	91.294	3,9	4,0	2	2	326.468	361.856	0,2	0,2
07-M. ull i annexes	10.675	11.463	30,6	25,5	8	7	326.288	292.730	0,2	0,2
12-M. pell i teixit subcutani	9.474	7.065	23,9	22,9	8	7	226.558	161.440	0,1	0,1
08-M. oïda	7.334	11.327	17,2	16,0	4	4	125.820	181.433	0,1	0,1
04-M. endocrines	1.779	2.987	57,1	64,1	20	32	101.571	191.385	0,1	0,1
03-M. sang	387	1.223	103,0	60,5	35	22	39.860	74.048	0,0	0,0
17-M. congènites	617	808	68,7	77,1	27	26	42.378	62.282	0,0	0,0
Total	587.069	706.503	30,9	32,9	4	4	18.132.495	23.242.566	10,1	14,7

En l'anàlisi per sexe, s'observa que els dies en IT/Afiliat són més alts en dones que en homes en global i en diversos grups diagnòstics, destacant les malalties osteomusculars, les mentals i els tumors. En canvi, els homes tenen, respecte de les dones, més dies en IT per afiliat en els grups de traumes-causes externes i malalties circulatories.

12. Durada i dies en IT, per província

PROVÍNCIA	Durada mitjana	Durada mediana	Dies en IT	Dies IT/ afiliat 2018	Dies IT/ afiliat 2017	Variació 17-18
Barcelona	30,5	4	31.732.593	12,4	11,2	10,9%
Girona	37,8	7	3.552.092	11,0	9,9	11,0%
Lleida	41,6	8	2.073.322	11,1	10,4	6,2%
Tarragona	37,1	6	4.017.054	13,1	11,7	11,8%
Total	32,0	4	41.375.061	12,3	11,1	10,8%

Pel que fa a les províncies, totes han augmentat el nombre de dies en IT per persona afiliada respecte de l'any 2017.


13. Variació d'indicadors d'IT 2018 vs 2017

2017	Règim general	Altres règims	Total
Baixes tramitades	1.085.727	52.195	1.137.922
%Homes	44,2%	62,7%	45,1%
%Dones	55,8%	37,3%	54,9%
Edat mitjana	40,1	47,2	40,5
Afiliats 2017, mitjana	2.718.807	555.266	3.274.073
Prevalença desembre 17			3,4%
Incidència acumulada	39,9%	9,4%	34,8%
Altes tramitades	1.067.818	50.775	1.118.593
Dies en IT	32.253.846	4.034.708	36.288.554
Durada mitjana de la IT	30,2	79,5	32,4
Durada mediana de la IT	4	36	5
Dies en IT/afiliat	11,9	7,3	11,1


2018	Règim general	Altres règims	Total
Baixes tramitades	1.253.261	56.950	1.310.211
% Homes	44,6%	61,4%	45,4%
% Dones	55,4%	38,6%	54,6%
Edat mitjana	40,1	47,3	40,4
Afiliats 2018, mitjana	2.812.305	557.983	3.370.288
Prevalença desembre 18			3,7%
Incidència acumulada	44,6%	10,2%	38,9%
Altes tramitades	1.240.890	52.682	1.293.572
Dies en IT	37.118.986	4.256.075	41.375.061
Durada mitjana de la IT	29,9	80,8	32,0
Durada mediana de la IT	4	35	4
Dies en IT/afiliat	13,2	7,6	12,3



13.1.Variació d'indicadors 2018 vs 2017, representació gràfica



13.2. Variació d'indicadors 2017 vs 2016, representació gràfica per sexe



14.1 Informe sobre la incapacitat temporal per contingències professionals (IT-CP) a Catalunya. Introducció (1)

- ❑ La contingència professional és la causa d'aquelles IT que s'han produït per accident de treball (AT) o per malaltia professional (MP).
- ❑ La baixa, l'alta fins als 365 dies, l'assistència sanitària i la prestació econòmica d'aquestes IT corresponen generalment a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS). En alguns casos la baixa, l'alta fins els 365 dies i l'assistència sanitària corresponen al Servei Públic de Salut i la prestació econòmica correspon a l'INSS. A Catalunya les notificacions d'AT i MP les gestiona i publicita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF).
- ❑ Les actuacions per a la prevenció de riscos en el lloc de treball corresponen a l'empresa i als treballadors designats o als serveis de prevenció propis o aliens que té cada empresa, sota el control de l'autoritat laboral. A Catalunya l'autoritat laboral és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF).



14.1 Informe sobre la incapacitat temporal per contingències professionals (IT-CP) a Catalunya. Introducció (2)

- ❑ L'ICAM està directa o indirectament involucrat en la gestió dels processos IT-CP quan actua en:
 - El control de totes les IT-CP amb durada superior a 365 dies. Cal el dictamen de l'ICAM perquè l'INSS resolgui si és pròrroga, alta o IP.
 - El control de les IT-CP que tenen com a mútua a l'INSS.
 - Les reclamacions dels treballadors per alta d'una IT-CP.
 - Les determinacions de contingència de les IT amb possible antecedent d'IT-CP, on l'organisme competent per resoldre-les és l'INSS.
 - Les sol·licituds d'IP o les valoracions de seqüeles derivades de contingències professionals.



14.1 Informe sobre la incapacitat temporal per contingències professionals (IT-CP) a Catalunya. Introducció (3)

- ❑ Aquest informe descriu les dades d'IT per AT i MP que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social han notificat al SIGIT l'any 2018. **El % de notificació al SIGIT respecte de les declaracions als sistemes d'informació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social s'estima que és del 78,9% l'any 2018.** Els episodis d'IT-CP notificats al SIGIT inclouen tots els règims, tots els tipus de contracte i tant els AT en jornada de treball com els in itinere. Les dades disponibles a l'informe són l'edat, el sexe, el grup diagnòstic de la IT-CP i la durada i no inclouen mecanismes de la lesió, parts del cos afectades, ni altres variables que no s'utilitzen en la gestió de les IT-CP.
- ❑ La nostra mostra aporta dades sobre els grups diagnòstics d'una part de les IT per lesions i malalties reconegudes com a laborals pel sistema de Seguretat Social i el seu perfil edat-sexe-durada. L'informe no pretén, en cap cas, ser comparable amb les dades totals de sinistralitat (amb o sense IT-CP) que gestiona i publicita el DTSEF, ni es pronuncia sobre temes de seguretat i salut laborals.

14.2. Estudi de les baixes agregades. Casos vàlids

Casos vàlids per a l'estudi de les baixes per contingència professional (IT-CP) en relació a:

- a. Any d'inici de la IT-CP
- b. Sexe
- c. Grup d'edat
- d. Grup diagnòstic (ICD10)
- e. Tipus de contingència professional: accident de treball (AT) o malaltia professional (MP)

Durant l'any 2018 s'han notificat al SIGIT 97.016 noves baixes i 98.636 altes IT-CP.



14.3. Edat mitjana, per sexe


	Accident de treball (AT)			Malaltia professional (MP)		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Baixes tramitades 2017	63.825	33.527	97.352	377	353	730
Edat mitjana	40,9	42,4	41,4	44,9	44,9	44,9
Desviació típica	10,8	11,6	11,1	9,4	9,4	9,4
Edat mediana	40,9	42,7	41,4	44,6	45,1	45,0

	Accident de treball (AT)			Malaltia professional (MP)		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Baixes tramitades 2018	63.211	33.059	96.270	351	395	746
Edat mitjana	41,1	42,3	41,5	44,2	44,1	44,1
Desviació típica	10,9	11,6	11,2	9,5	9,9	9,7
Edat mediana	41,2	42,7	41,6	43,5	44,4	43,9

Durant el 2018 s'han declarat al SIGIT menys AT i més MP que durant el 2017. L'edat mitjana en cada categoria és similar a la de l'any 2017.




14.4.1. Distribució dels grups diagnòstics per sexe, IT-AT




Les dos primeres causes de baixa per accident de treball són els traumes i causes externes i les malalties osteomusculars. Els percentatges són similars als de l'any 2017.

14.4.2. Distribució dels grups diagnòstics per sexe, IT-MP



Les tres primeres causes de baixa per malaltia professional són les malalties osteomusculars, les del sistema nerviós (sobretot la síndrome del túnel carpià) i les malalties de la pell, com també ho eren l'any 2017.

14.5.1. Distribució d'interval·s de durada per sexe, IT-AT



- L'11% de les altes duren entre 1-3 dies (10% el 2017).
- El 52% de les altes duren entre 1-15 dies (52% el 2017).
- El 71% de les altes duren entre 1-30 dies (71% el 2017).

14.5.3. Intervalls de durada: contribució al % d'altres i de la suma de dies en IT-AT

Durada de les altres, IT-AT, 2018	N	Dies en IT	% de les altres	% dels dies en IT
1-3 dies	10.900	22.962	11%	0,6%
4-15 dies	40.101	352.580	41%	9%
16-20 dies	8.220	145.652	8%	4%
21-30 dies	10.398	260.360	11%	6%
1-2 mesos	13.255	564.633	14%	14%
2-3 mesos	5.515	400.212	6%	10%
3-4 mesos	2.711	278.728	3%	7%
4-12 mesos	4.739	925.365	5%	23%
12-18 mesos	2.045	1.081.896	2%	27%
Total 2018	97.884	4.032.388	100%	100%


Cal assenyalar que hi ha un 2% de les IT-AT que duren més de 12 mesos (1% el 2017) i que **des del seu inici** sumen el 27% de tots els dies en IT-AT (17% el 2017).

14.5.4. Intervalls de durada: contribució al % d'altres i de la suma de dies en IT-MP

Durada de les altres, IT-MP, 2018	N	Dies en IT	% de les altres	% dels dies en IT
1-3 dies	30	78	4%	0,1%
4-15 dies	149	1.375	20%	2%
16-20 dies	49	883	7%	2%
21-30 dies	72	1.851	10%	3%
1-2 mesos	178	7.726	24%	13%
2-3 mesos	98	7.036	13%	12%
3-4 mesos	58	6.101	8%	11%
4-12 mesos	86	16.420	11%	28%
12-18 mesos	32	16.532	4%	29%
Total 2018	752	58.002	100%	100%

Cal assenyalar que hi ha un 4% de les IT-MP que duren més de 12 mesos (3% el 2017) i que des del seu inici sumen el 29% de tots els dies en IT-MP (22% el 2017).

14.6.1. Durada mitjana per grups d'edat i sexe, IT-AT



2017

23,7

30,6

37,5


43,0

50,5

38,0

La durada mitjana IT-AT és de 41,2 dies (40,8 en els homes, 41,9 en les dones) i augmenta progressivament des dels grups més joves als més grans. Les durades mitjanes de la IT-AT són una mica superiors a les del 2017. La durada mediana és de 15 dies (14 en els homes, 16 en les dones).

14.6.2. Durada mitjana per grups d'edat i sexe, IT-MP



2017

36,5

64,6

61,8

83,1

80,8

72,1

La durada mitjana és de 77,1 dies (74,3 en els homes, 79,8 en les dones) i ha augmentat respecte del 2017 (72,1 dies) sobretot per l'augment en el grup 35-44 anys. En tractar-se d'una mostra petita, està més subjecte a variacions. La durada mediana és de 41 dies (37 en els homes, 44 en les dones) i també ha augmentat respecte del 2017 (38 dies).



14.7.1. Durada i dies en IT per grups diagnòstics, IT- AT

Altes IT-AT 2018, grups diagnòstics	N	Durada mitjana IT	Durada mediana IT	Dies en IT (altes)
19-Traumes i causes ext.	70.043	40,8	15	2.855.612
13-M.osteomusculars	24.317	40,1	15	974.730
18-Síntomes no classif.	1.261	60,2	21	75.888
09-M.sist.circulatori	141	184,1	138	25.956
06-M.sist.nerviós	279	87,7	42	24.464
11-M.sist.digestiu	150	144,1	59,5	21.621
07-M.ulls i annexes	869	18,4	4	16.005
05-M.mentals i comport.	173	71,4	22	12.353
12-M.pell	366	27,3	10,5	9.998
10-M.sist.respiratori	109	45,9	8	5.007
17-M.congènites	25	94,0	25	2.350
21-Altres exposicions i proves	4	512,0	547	2.048
01-M.infeccioses	62	26,2	7	1.625
08-M.oïda	40	37,7	11	1.508
15-M.gestació, part, puerperi	11	115,2	65	1.267
14-M.genitourinaries	8	80,4	26,5	643
20-Altres causes ext.	1	547,0	547	547
03-M.sang i immunol.	17	29,3	16	498
02-Tumors	5	32,2	6	161
04-M.endocrines	3	35,7	35	107
Total	97.884	41,2	15	4.032.388



14.7.2. Durada i dies en IT per grups diagnòstics, IT-MP

Altes IT-MP 2018, grups diagnòstics	N	Durada mitjana IT	Durada mediana IT	Dies en IT (altes)
13-M.osteomusculars	414	82,0	40	33.949
06-M.sist.nerviós	149	89,4	61	13.317
12-M.pell	65	47,0	15	3.058
10-M.sist.respiratori	31	96,7	64	2.999
18-Síntomes no classif.	22	76,5	42	1.684
19-Traumes i causes ext.	22	75,0	30,5	1.650
01-M.infeccioses	44	15,7	12	689
03-M.sang i immunol.	1	547,0	547	547
07-M.ulls i annexes	3	31,3	29	94
09-M.sist.circulatori	1	15,0	15	15
02-Tumors				
04-M.endocrines				
05-M.mentals i comport.				
08-M.oïda				
11-M.sist.digestiu				
14-M.genitourinaries				
15-M.gestació, part, puerperi				
17-M.congènites				
20-Altres causes ext.				
21-Altres exposicions i proves				
Total	752	77,1	40,5	58.002



14.7.3. Durada i dies en IT principals grups diagnòstics, total IT-CP

Altes 2018, AT+MP, grups diagnòstics	% del N de IT-CP	Durada mitjana IT	Durada mediana IT	% de dies en IT-CP
19-Traumes i causes ext.	71,0%	40,8	15	70,1%
13-M.osteomusculars	25,1%	40,8	15	25,2%
06-M.sist.nerviós	0,4%	88,3	51	1,2%
	96,5%			96,6%

En la contingència professional, els grups diagnòstics que sumen més dies en IT-CP són els traumes i causes externes i en segon lloc les malalties osteomusculars. Les malalties del sistema nerviós són la tercera causa de dies en IT-CP i corresponen sobretot a la síndrome del túnel carpià.

En conjunt aquests tres grups representen el 96,5% de les IT-CP i el 96,6% dels dies en IT per aquesta contingència. Les dades són similars a les obtingudes per a l'any 2017.

14.7.4. Durada i dies en IT per grups diagnòstics i sexe, IT-AT

Altes 2018 IT-AT, grups diagnòstics per sexe	N		Durada mitjana IT		Durada mediana IT		Dies en IT (altes)	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
19-Traumes i altres causes ext.	46.401	23.647	40,9	56,3	14,0	16,0	1.897.110	961.097
13-M. sist. osteomuscular	15.579	8.738	38,4	58,9	13,0	17,0	598.466	376.264
18-Síntomes i signes diversos	833	428	56,1	16,9	20,0	23,5	46.719	29.169
09-M. sist. circulatori	121	20	195,4	62,0	162,0	93,0	23.645	2.311
06-M. sist. nerviós	138	141	98,8	38,4	34,5	45,0	13.637	10.827
11-M. sist. digestiu	130	20	133,7	19,8	59,5	56,5	17.378	4.243
07-M. ull i annexes	692	177	18,1	25,5	4,0	5,0	12.509	3.496
05-M. mentals	65	108	87,2	74,8	29,0	21,0	5.669	6.684
12-M. pell i teixit subcutani	238	128	23,9	22,9	11,0	10,0	5.678	4.320
10-M.sist. respiratori	47	62	42,2	6,5	6,0	9,0	1.982	3.025
17-M. congènites	14	11	81,8	77,1	27,0	9,0	1.145	1.205
01-M. infeccioses i parasitàries	29	33	45,3	9,5	7,0	7,0	1.313	312
08-M. oïda	25	15	47,1	16,0	11,0	18,0	1.177	331
15-Gestació, part i puerperi	0	11		59,3		65,0		1.267
14-M. sist. genitourinari	7	1	90,6	22,1	36,0	9,0	634	9
03-M. sang	8	9	47,8	60,5	38,5	8,0	382	116
02-Tumors	5	0	32,2	134,2	6,0	0,0	161	0
04-M. endocrines	3	0	35,7	64,1	35,0	0,0	107	0
Total	64.335	33.549	40,8	41,9	14,0	16,0	2.627.712	1.404.676



14.7.5. Durada i dies en IT per grups diagnòstics i sexe, IT-MP

Altes 2018 MP, grups diagnòstics	N		Durada mitjana IT		Durada mediana IT		Dies en IT (altes)	
	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
13-M. sist. osteomuscular	230	184	73,1	93,1	35,5	45,5	16.811	17.138
06-M. sist. nerviós	52	97	97,7	84,9	68,0	61,0	5.082	8.235
12-M. pell i teixit subcutani	33	32	56,4	37,4	13,0	21,0	1.862	1.196
10-M.sist. respiratori	21	10	93,9	102,8	65,0	34,0	1.971	1.028
18-Síntomes i signes diversos	5	17	126,8	61,8	44,0	37,0	634	1.050
19-Traumes i altres causes ext.	14	8	41,6	133,4	4,0	57,0	583	1.067
01-M. infeccioses i parasitàries	8	36	19,6	14,8	13,5	11,5	157	532
03-M. sang	0	1	0,0	547,0	0,0	547,0	0	547
07-M. ull i annexes	2	1	36,0	22,0	36,0	22,0	72	22
09-M. sist. circulatori	1	0	15,0	0,0	15,0	0,0	15	0
02-Tumors								
04-M. endocrines								
05-M. mentals								
08-M. oïda								
11-M. sist. digestiu								
14-M. sist. genitourinari								
15-Gestació, part i puerperi								
17-M. congènites								
Total	366	386	74,3	79,8	37,0	43,5	27.187	30.815



14.8. Indicadors principals d'incapacitat temporal per contingència professional (IT-CP) (0-18 mesos), notificacions al SIGIT 2018

IT-CP 2017 notificada al SIGIT	Accident de treball (AT)	Malaltia professional (MP)	Total
Baixes tramitades	97.352	730	98.082
% Homes	65,6%	51,6%	65,5%
% Dones	34,4%	48,4%	34,5%
Edat mitjana	41,4	44,9	41,5
Altes tramitades	96.354	715	97.069
Dies en IT	3.657.372	51.524	3.708.896
Durada mitjana de la IT	38,0	72,1	38,2
Durada mediana de la IT	15	38	15

IT-CP 2018 notificada al SIGIT	Accident de treball (AT)	Malaltia professional (MP)	Total
Baixes tramitades	96.270	746	97.016
% Homes	65,7%	47,1%	65,5%
% Dones	34,3%	52,9%	34,5%
Edat mitjana, anys	41,5	44,1	41,5
Altes tramitades	97.884	752	98.636
Dies en IT	4.032.388	58.002	4.090.390
Durada mitjana de la IT	41,2	77,1	41,5
Durada mediana de la IT	15	41	15





Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/memories/