



PRINCIPALS SÍMPTOMES DE L'ICTUS

S'estima que **1 de cada 6** persones patirà un ictus al llarg de la seva vida

L'ictus constitueix la **primera causa de discapacitat** adquirida en l'adult i la segona de **demència**.

Sol produir símptomes de forma brusca i inesperada i, encara que la seva tipologia depèn de l'àrea del cervell afectada, els principals són:

✓ **Alteració brusca en el llenguatge** amb dificultats per parlar o entendre

✓ **Pèrdua brusca de força** o sensibilitat en una part del cos

✓ **Afectació d'una de les meitats del cos**, manifestant-se sobretot a la cara i/o en les extremitats

✓ **Alteració brusca de la visió**, com pèrdua de visió en un ull, visió doble o incapacitat per apreciar objectes en algun lloc del nostre camp visual

✓ **Pèrdua brusca de coordinació o equilibri**

✓ **Mal de cap molt intens** i diferent a altres cefalees habituals

✓ Sovint l'ictus produeix una combinació d'aquest símptomes, però **la detecció d'un de sol ja és motiu d'urgència**.

✓ Una de les claus per a l'**èxit** és la **rapidesa** amb la qual es detecten els seus **símptomes** i es contacta amb el **sistema d'emergències**.

✓ Quan una persona té una sospita d'ictus pot **trucar al 112 o al 061** CatSalut Respon, adreçar-se al **CAP o al servei d'urgències d'un hospital**.