

Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

Actualitzat: 29.05.2020

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

En aquesta versió hi ha canvis generalitzats en tots els apartats per adequar-la a l'actual procés de desconfinament progressiu

Coordinació:

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Aquest document s'ha fet en col·laboració amb l'Associació Catalana de Salut Laboral i d'acord amb la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

Alguns drets reservats

© 2020, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la **pàgina web de Creative Commons**.

Edició:

Barcelona, març de 2020

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

URL:

<http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

Disseny de plantilla accessible 1.03:

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.



Contingut

1	Introducció.....	4
2	Definicions.....	5
3	Actuacions.....	6
3.1	Suport al 061.....	6
3.2	Estudi i maneig de casos i contactes.....	7
3.3	Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel Coronavirus SARS-CoV-2.....	9
3.4	Realització de proves de diagnòstic microbiològic.....	11
	Annex 1. Models d'informes.....	13
	Annex 2. Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública.....	16
	Annex 3. Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral i Unitats de Salut Laboral.....	18

1 Introducció

Igual que en les fases anteriors, en l'actual fase de desconfinament cal que tots els agents amb responsabilitats sobre la salut de la població (treballadora i no treballadora) col·laborin, dins de les seves possibilitats, per fer front a la pandèmia de COVID-19.

La raó de ser i la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) és assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. Aquesta obligació empresarial continua en les circumstàncies actuals i per tant, també, la funció que pertoca als SPRL.

En aquest context, els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) tenen un paper essencial, adaptant, això sí, les seves activitats a les circumstàncies i necessitats actuals en cooperació amb les autoritats sanitàries i serveis de salut pública, en benefici dels seus propis treballadors, dels treballadors de les empreses a les qual donen servei i per contribuir al manteniment dels serveis essencials de la comunitat i ajudar a controlar la transmissió de la malaltia.

Aquesta guia, feta en col·laboració amb l'Associació Catalana de Salut Laboral, no entrarà en temes que ja estan tractats en altres documents oficials (i als quals es farà referència quan calgui) sinó que pretén aclarir les actuacions (algunes voluntàries, altres no) a desenvolupar pels SPRL i respondre a possibles dubtes.

La cooperació i actuació dels SPRL ve avalada per la normativa vigent, en especial per:

- Rd 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. L'article 38, de col·laboració dels serveis de prevenció amb el Sistema Nacional de Salut, estableix que:

1. D'acord amb el que estableixen l'article 10 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i l'article 21 de la Llei 14/1986, general de sanitat, el servei de prevenció ha de col·laborar amb els serveis d'atenció primària de salut i d'assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de malalties relacionades amb el treball, i amb les administracions sanitàries competents en l'activitat de salut laboral que es planifiqui. Les unitats responsables de salut pública de l'àrea de salut, que defineix la Llei general de sanitat, són les competents per a la coordinació entre els serveis de prevenció que actuen en aquesta àrea i el sistema sanitari. Aquesta coordinació ha de ser desplegada per les comunitats autònomes en l'àmbit de llurs competències.

2. El servei de prevenció col·laborarà en les campanyes sanitàries i epidemiològiques organitzades per les Administracions públiques competents en matèria sanitària.

- Rd 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.

L'article 3, que tracta de les activitats sanitàries dels serveis de prevenció, en el seu

punt i) indica com activitat, col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut, tal i com estableix l'article 38 del Reglament dels serveis de Prevenció.

En el punt k) indica com activitat, participar en qualsevol altra funció que l'autoritat sanitària li atribueixi en el marc de la col·laboració establerta en els articles 38 i 39 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

També cal tenir en compte el document ***Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2*** del Ministerio de Sanidad.

En qualsevol activitat que dugui a terme el servei de prevenció s'ha de tenir en compte, en primer lloc, la seguretat i salut dels propis treballadors, aplicant les mesures establertes per la normativa de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de les autoritats sanitàries i de salut pública.

En el context actual hi ha una gran quantitat de guies, procediments i documentació que canvien ràpidament amb el temps. En cas de dubte, els SPRL seguiran les indicacions del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral, de la Sub-direcció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública. També cal tenir en compte l'assessorament que donen les Unitats de Salut Laboral (USL) distribuïdes pel territori (veure adreces de contacte a l'annex 3).

2 Definicions

L'actual situació de desconfinament progressiu i desescalada comporta canvis en la gestió de casos i contactes. En aquesta fase és important la detecció precoç dels casos en tota la població així com la identificació i seguiment dels contactes estrets per tal d'evitar un nou increment en el nombre de casos.

Segons el ***Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment*** de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):

- **Cas sospitós d'infecció:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol grau que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes atípics com l'odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS_CoV-2 se li ha de fer una PCR (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.

- **Cas confirmat amb infecció activa:**

- Cas amb o sense clínica i PCR positiva (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient).
- Cas que compleix criteri clínic, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia (no per test ràpids).

- Els casos d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb COVID-19 amb resultats de PCR negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, ja sigui en l'àmbit de centres tancats o en l'àmbit familiar, o els casos sospitosos amb PCR no concloent, es consideraran **casos probables**.
- Els casos sospitosos amb PCR negativa i IgM també negativa, si aquesta prova s'ha realitzat, en els quals no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat, es consideraran **descartats**.
- **Contacte estret.** Es considerarà com a contacte estret:
 - Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
 - Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2 metres (ex. convivents, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d'oci...) durant almenys 15 minuts.
 - Es considera contacte estret en un avió, tren o un altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut (sempre que sigui possible l'accés a la identificació dels viatgers) els passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d'un cas, i a la tripulació que hagi tingut contacte amb el cas esmentat.

3 Actuacions

3.1 Suport al 061

Degut a l'evolució de la pandèmia de COVID-19, el 061, malgrat l'augment de personal i altres mesures com la informació disponible a Canal salut, el test online i l'aplicació Stop COVID19-Cat, ha estat sotmès a una sobresaturació de trucades que, en ocasions, pot haver compromès o comprometre la rapidesa de resposta.

Una mesura per ajudar a afrontar aquesta situació és que els serveis de prevenció, tant propis com aliats, estableixin un servei telefònic de consulta per als seus propis treballadors i pels treballadors de les empreses clients pel que fa a la pandèmia de COVID-19. No es tracta, per tant, de substituir al 061 rebent trucades de qualsevol persona i sobre qualsevol tema, sinó de donar un suport dirigit als treballadors propis i d'empreses clients pel que fa a l'actuació enfront del nou coronavirus.

Els serveis de prevenció que optin per aquest servei han de:

- Establir un telèfon o telèfons de contacte per a fer les consultes, establir l'horari de prestació del servei (quan més extens millor si bé seria recomanable com a mínim de 8 AM a 8 PM) i dies de servei, preferiblement els set dies de la setmana.
- Organitzar el servei amb els seus professionals.
- Donar a conèixer el servei als treballadors propis i de les empreses clients pels mitjans que es considerin més idonis.

- Seguir les recomanacions i instruccions dels procediments i guies establertes per l'autoritat sanitària, en especial la versió sempre més actual disponible del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.**
- En el cas de treballadors/es que presentin un quadre clínic o simptomatologia compatible amb la definició de cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2, s'indicarà que se li ha de realitzar una PCR (o la tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores, ja sigui pel propi SPRL (si en té la possibilitat i es compleixen els requisits establerts. Veure punt 3.4) o a través del seu centre d'atenció primària amb el qual s'haurà de posar en contacte (i si no pot amb el 061). Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera dels resultats de la PCR.

El Departament de Salut registrarà els Serveis de Prevenció que faran aquest suport per la qual cosa han de comunicar al correu **salut_laboral_aspcat@gencat.cat** les següents dades:

Nom del Servei de Prevenció

Persona responsable i email

Número/números de contacte del servei telefònic

Horari i dies del servei telefònic

Previsió d'inici d'aquesta activitat

Quan, degut a la progressiva normalització de la situació, un servei de prevenció deixi de prestar aquest servei telefònic cal que ho comuniqui al correu **salut_laboral_aspcat@gencat.cat**

3.2 Estudi i maneig de casos i contactes

En aquesta fase de desconfinament progressiu és molt important la detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i detectar els seus contactes estrets per poder controlar la transmissió de la malaltia i evitar un rebrot.

Els SPRL estan cridats a col·laborar amb les autoritats sanitàries en aquesta detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes i en la seva notificació.

3.2.1 Estudi i maneig de casos

Els SPRL han de col·laborar en la detecció d'aquests casos, donant suport a la tasca que es fa des dels serveis d'atenció primària i hospitalària i contribuint al sistema d'informació de vigilància epidemiològica.

El SPRL, quan detecti un cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2 li indicarà que ha de fer aïllament domiciliari i se li ha de realitzar una PCR (o tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24h. El SPRL pot fer-ho, sempre que es compleixin els requisits establerts (veure punt 3.4), es disposi de mitjans per obtenir les mostres i enviar-

les a un laboratori autoritzat. En cas que no sigui possible, la confirmació s'haurà de fer des de l'atenció primària, amb la qual haurà de contactar la persona afectada.

Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera del resultat de la PCR i s'iniciarà la identificació dels seus contactes.

Dels casos sospitosos i confirmats (per part del SPRL) s'haurà de recollir la informació que consta a l'annex 2 del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.**

Si bé en el **Procediment** posa que la notificació es realitzarà de forma automatitzada, ara per ara, segons indicacions de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP), els SPRL, fins a noves instruccions, hauran d'enviar la informació per correu electrònic al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen). A l'annex 2 hi ha la llista d'adreces dels SVE.

Pel maneig dels casos es seguirà el que estableix el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment** en el seu punt 5.

3.2.2 Estudi i maneig de contactes

Els SPRL seran els encarregats d'establir els mecanismes per la investigació i seguiment de contactes estrets d'aquells casos sospitosos i confirmats, de les empreses a les quals donen servei, de manera coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica, seguint els criteris establerts en el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.**

L'estudi de contactes s'iniciarà en el moment que es detecti un cas sospitós. El període a considerar és des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas i fins el moment en que aquest és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de diagnòstic.

A tots els contactes estrets de casos confirmats se'ls ha de recollir les dades epidemiològiques bàsiques mitjançant el formulari inclòs a l'annex 4 del **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment** de l'ASPCAT. Els annexos s'han d'enviar, per correu electrònic, al SVE corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen). Les dades Codi de cas i Codi de contacte NO les ha d'omplir el SPRL.

De forma general, qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un cas confirmat n'ha de ser informada del fet, se li ha de comunicar que ha de romandre en quarantena al domicili durant un període de 14 dies des de l'últim contacte amb el cas. A més se li faran les recomanacions que consten, per a les persones que són contacte estret d'un cas confirmat, en el **Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.**

Sempre que procedeixi un aïllament domiciliari el SPRL, en la seva funció de col·laboració per fer front al nou coronavirus i en la gestió de la incapacitat temporal (IT), lliurarà a la persona afectada un document (annex 1) que confirmi la procedència d'aquest aïllament. Aquest informe és preceptiu perquè els metges del Sistema Públic de Salut puguin donar la baixa. Per a això, la persona afectada s'haurà de posar en contacte amb el seu CAP.

3.3 Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

El SPRL ha de determinar la presència de personal amb condicions d'especial vulnerabilitat en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (aquells treballadors que per les seves característiques o estat de salut, d'acord amb criteris epidemiològics i clínics, poden tenir una major probabilitat de patir COVID-19 si s'exposen al SARS-CoV-2 o presentar una evolució clínica més desfavorable en cas de patir la COVID-19) i avaluar el nivell de risc al que poden estar exposats per tal de considerarlos treballadors especialment sensibles i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubicació en un altre lloc de treball i el teletreball.

En el document de consens de l'Associació Catalana de Salut Laboral *de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/res especialment sensibles enfront el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de la pandèmia*¹, es diferencia conceptualment les persones especialment vulnerables (PEV), dels treballadors especialment sensibles (TES): *ser considerada PEV amb relació a la COVID-19 no suposa ser considerat TES d'acord amb l'article 25 de la LPRL. Hi ha un element clau que és el "risc laboral" al que s'ha d'exposar i que hauria d'estar específicament avaluat i del qual l'empresa l'ha de protegir.*

El Ministeri de Sanitat, d'acord amb l'evidència científica a 18 de maig de 2020 i el principi de precaució, ha definit com grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, insuficiència renal crònica, malaltia hepàtica crònica severa, càncer en fase de tractament actiu, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys. Aquests grups poden variar en funció de les noves evidències.

La decisió final sobre què fer amb els treballadors que puguin estar inclosos en aquests grups vulnerables ha de ser fruit d'una avaluació individual que tingui en compte l'estat de salut de la persona així com les condicions de treball i tasques a realitzar i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

En el document ***Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)***, en els seus annexos 4 i 5 hi ha les guies per facilitar, de forma general, la gestió de la vulnerabilitat a l'àmbit sanitari i sociosanitari i als àmbits no sanitaris.

¹ Arch PrevRiesgos Labor. 2020;23(2):253-271

En el cas que no es puguin garantir unes condicions de treball que permetin realitzar la feina sense augmentar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora ni sigui possible reubicar-la, està indicat el confinament domiciliari. Si tampoc és possible el teletreball, el SPRL, en la seva funció de col·laboració en la gestió de la IT, emetrà un informe (annex 1.2) que acrediti l'aïllament i, per tant, la indicació de la IT d'acord amb el Document *Actualización a 15 de abril de 2020 de las instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de salud por coronavirus, conforme al Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo* del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

D'acord amb les indicacions de la Sub-direcció General d'Avaluacions Mèdiques (Actualització del document de suport i aclariments sobre la gestió de la IT en relació a SARS-CoV-2/COVID-19, de 27 de maig) el SPRL enviarà aquest informe a l'ICAM, a la bústia de correu electrònic, de la província que correspongui, habilitada per a aquest fet, donant coneixement previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document:

Barcelona: **bustia.sgam@gencat.cat**

Tarragona: **icam.tarragona.salut@gencat.cat**

Lleida: **bustiaicam.lleida@gencat.cat**

Girona: **icam.girona.salut@gencat.cat**

Aquest informe és preceptiu perquè els metges del sistema públic de salut emetin el comunicat de baixa, tal com estableix el Document *actualización emisión y transmisión de partes de incapacidad temporal al INSS, en el caso de trabajadoras especialmente sensibles y de partes de procesos covid19 intercurrentes con otros procesos de it por distintas patologías* de 30 d'abril.

Quan es produeixin canvis en l'evidència científica disponible, en les condicions de treball o en les mesures preventives que facin innecessària la IT, el SPRL haurà d'emetre un informe de fi de la necessitat de la IT (annex 1.3) que, igual que en el cas anterior, farà arribar a l'ICAM, donant coneixement previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document.

El SPRL informarà de les actuacions anteriors a l'empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut en el treball, si n'hi haguessin, guardant la deguda confidencialitat.

3.4 Realització de proves de diagnòstic microbiològic

L'aplicació i la realització de proves diagnòstiques s'ha de fer d'acord amb les indicacions que estableixen els protocols i procediments de les autoritats sanitàries, i en especial el document ***Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas*** del Ministerio de Sanidad i, per tant, els SPRL han de limitar la realització de proves diagnòstiques als àmbits d'actuació que s'hi descriuen (tant pel que fa al diagnòstic precoç de casos d'infecció com a les estratègies de retorn al treball).

En aquells treballadors que no tenen ni han tingut símptomes compatibles amb la COVID-19 o no han tingut contacte de risc no està indicat realitzar tests microbiològics per a la reincorporació al lloc de treball

En el context i coneixements actuals l'OMS i les autoritats sanitàries, només recomanen l'ús de tests ràpids amb finalitats d'investigació i no està indicat el seu ús per al diagnòstic ni per a la presa de decisions clíniques (tret d'indicacions molt concretes que s'estableixin ens els protocols o procediments), fins que l'evidència científica recolzi el seu ús per a aquestes indicacions.

Pel que fa al personal treballador de les residències (tant de titularitat pública com privada) i altres centres tancats, les proves de diagnòstic microbiològic es realitzen des de l'atenció primària per la qual cosa hi ha que contactar amb l'equip d'atenció primària (EAP) de referència de cada residència.

La RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s'ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció del COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya, estableix els requisits d'autorització sanitària perquè qualsevol entitat o empresa, pública o privada, aliena a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, pugui realitzar o comprar proves diagnòstiques. Aquestes proves han d'estar prescrites per un professional mèdic del SPRL, tenint en compte els criteris i indicacions dels protocols i documents del Departament de Salut i autoritats sanitàries, tal com s'ha dit abans.

En cas, però, que una empresa, mitjançant el seu SPRL i laboratoris autoritzats, decideixi fer tests ràpids o altres proves microbiològiques fora de les indicacions de les autoritats sanitàries, ha de poder fer les proves de diagnòstic microbiològic que siguin necessàries per acabar el procés d'interpretació de resultats i diagnòstic i la presa de decisions que se'n derivi.

La sol·licitud d'autorització sanitària per a la realització de proves diagnòstiques als treballadors l'ha de fer l'empresa de manera electrònica a través del **Canal Empresa, mitjançant el tràmit i condicions establerts.**

Els SPRL han de comunicar l'adquisició del material diagnòstic en qualsevol cas, ja sigui si l'adquireix a un laboratori d'anàlisis clíniques com a una empresa fabricant, importadora o distribuïdora d'aquest material. La comunicació s'ha de fer en el moment en què es rep físicament el producte (i per tant, ja està a punt per fer-lo servir o ser subministrat als clients) a través del **Canal Empresa mitjançant el tràmit i condicions establerts.**

ANNEX 1. MODELS D'INFORMES

1. INFORME DE CONFIRMACIÓ D'AILLAMENT DOMICILIARI/QUARANTENA EN CAS SOSPITOS, CONFIRMAT O CONTACTE ESTRET

INFORMACIÓ DIRIGIDA AL METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra., amb DNI professió/ocupació..... a l'empresa compleix criteris per a ser considerat/da:

- cas sospitos
- cas confirmat
- contacte estret d'un cas sospitos o confirmat de coronavirus,

Per la qual cosa, seguint els criteris de les autoritats sanitàries, haurà de realitzar quarantena/aïllament domiciliari durant 14 dies, comptats des del dia....., data en la qual es va produir la manifestació clínica o el contacte. Aquesta persona ha estat informada de les mesures a adoptar d'acord amb el que estableix el *Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament* del Departament de Salut.

Lloc i data

Signatura

2. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. NECESSITAT D'IT

INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació..... a l'empresa....., compleix criteris per a ser considerat/da persona treballadora especialment sensible en relació amb la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

La persona pateix....., que actualment es troba¹, presentant com a comorbiditats

Sobre la base dels annexos 4 o 5 del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad, el seu lloc de treball està en un nivell de risc².....Com que no hi ha possibilitat d'adaptació del lloc de treball (incloent el teletreball), de protecció adequada que eviti el contagi o de reubicació en un altre lloc exempt de risc d'exposició a l'empresa es considera que hauria de passar a situació d'incapacitat temporal.

Lloc i data,

Signatura

¹ Compensada/ descompensada

² Baix (1), mitjà (2), alt (3), molt alt(4)

3. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. FI DE LA NECESSITAT D'IT

INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNImetge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació..... a l'empresa..... d'acord amb els criteris del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad (de data.....), no és necessari que continuï en situació d'incapacitat temporal per:

no pertànyer als grups vulnerables establerts actualment en el citat *Procedimiento*

millora de les condicions de treball i/o adaptació del lloc/reubicació en un altre lloc de treball i/o millora de les mesures preventives

Lloc i data,

Signatura

ANNEX 2.**SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA TERRITORIALS I SERVEI D'URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)**

Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674

Agència de Salut Pública de Barcelona

(Barcelona ciutat) Servei d'Epidemiologia
Pl. Lesseps, 1 08023 Barcelona
Telèfon 932 384 545 (centraleta) A/e mdo@aspb.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme

C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
08005 Barcelona
Telèfon 935 513 900 (centraleta) A/e uve.bnm@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud

C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d'Infermeria, 3a pl.
(Hospital Universitari de Bellvitge)
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon 932 607 500 (centraleta) A/e barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI)

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental

Ctra. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon 936 246 432
A/e epi.valles@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central

C. Muralla del Carme, 7, 5a pl.
08241 Manresa
Telèfon 938 753 381 (centraleta)
A/e uvercc@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona

Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 Girona
Telèfon 872 975 666 (centraleta)

A/e epidemiologia.girona@gencat.cat **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran**

C. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 Lleida
Telèfon 973 701 600 (centraleta)
A/e epidemiologia.lleida@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Av. Maria Cristina, 54
43002 Tarragona
Telèfon 977 22 41 51 (centraleta)
A/e epidemiologia.tarragona@gencat.cat

Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre

Plaça Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Telèfon 977 495512
A/e epidemiologia.ebre@gencat.cat

Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)

Telèfon: 627 480 828. (Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i festius).

ANNEX 3. SERVEI DE COORDINACIÓ D'ACTUACIONS DE SALUT LABORAL I UNITATS DE SALUT LABORAL**Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral**

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 39 00 (centraleta)

A/e: **salut_laboral_aspcat@gencat.cat**

USL Barcelona

Pl. Lesseps, 1, 4a (08023 Barcelona)

Telèfon 93 238 45 65 / Fax: 93 238 45 58

A/e: **usl@aspb.cat / usl.barcelona@gencat.cat**

USL Barcelonès Nord - Maresme

C. Sant Anàstasi, 69 (08911 Badalona)

Telèfon: 93 464 84 64 / Fax: 93 502 90 14

A/e: **usl.bnordimaresme@gencat.cat**

USL Costa de Ponent

C. Rossell, 4-6 (08902 Hospitalet de Llobregat)

Telèfon: 93 332 46 93 / Fax: 93 332 47 00

A/e: **usl.costaponent@gencat.cat**

USL Vallès

Ronda dels Pinetons, 8 (08100 Mollet del Vallès)

Telèfon: 93 563 61 00 – 93 563 61 30 / Fax: 93 576 03 20

A/e: **usl.valles@gencat.cat**

USL Catalunya Central

C. Flor de Lis, 33 (08242 Manresa)
Telèfon 93 873 25 50 / Fax: 93 873 21 08

A/e: usl.catalunyacentral@gencat.cat

USL Girona

C. Maluquer Salvador, 11 (17002 Girona)
Telèfon: 972 94 14 01 – 972 48 79 38 / Fax: 972 21 41 00

A/e: usl.girona@gencat.cat

USL Lleida i Alt Pirineu i Aran

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 2 (25006 Lleida)
Telèfon: 973 23 67 98 – 973 70 16 00 ext. 176

A/e: usl.lleida@gencat.cat

USL del Camp de Tarragona

CAP Llibertat

C. General Moragues, 52, 2a planta (43201 Reus)
Telèfon: 977 32 01 07 / Fax: 977 31 73 80

A/e: usl.reus@gencat.cat i usl.tarragona@gencat.cat

USL Terres de l'Ebre

Avda. Ports de Caro, s/n (43520 Roquetes)
Telèfon: 667 118 137

A/e: usl.ebre@gencat.cat