

# Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

**Actualitzat: 03.08.2020**

**Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral**

Aquesta guia està en revisió permanent en funció de l'evolució de la malaltia i de la nova informació de què es disposi.

**Coordinació:**

Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Aquest document s'ha fet en col·laboració amb l'Associació Catalana de Salut Laboral i d'acord amb la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

**Alguns drets reservats**

© 2020, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la **pàgina web de Creative Commons**.

**Edició:**

Barcelona, març de 2020

**Assessorament lingüístic:**

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

**URL:**

<http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus>

**Disseny de plantilla accessible 1.03:**

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.



## Contingut

1	Introducció.....	4
2	Definicions.....	5
3	Actuacions.....	6
3.1	Servei telefònic de consulta.....	6
3.2	Estudi i maneig de casos i contactes.....	7
3.3	Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel Coronavirus SARS-CoV-2.....	9
3.4	Realització de proves de diagnòstic microbiològic.....	11
	Annex 1. Models d'informe.....	12
	Annex 2. Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública.....	15
	Annex 3. Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral i Unitats de Salut Laboral.....	17

## 1 Introducció

Igual que en les fases anteriors, en l'actual fase cal que tots els agents amb responsabilitats sobre la salut de la població (treballadora i no treballadora) col·laborin per fer front a la pandèmia de COVID-19.

La raó de ser i la funció essencial dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) és assessorar i recolzar les empreses en la seva obligació de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors. Aquesta obligació empresarial continua en les circumstàncies actuals i per tant, també, la funció que pertoca als SPRL.

En aquest context, els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) han tingut i tenen un paper essencial, adaptant, això sí, les seves activitats a les circumstàncies i necessitats actuals en cooperació amb les autoritats sanitàries i serveis de salut pública, en benefici dels seus propis treballadors, dels treballadors de les empreses a les qual donen servei amb l'objectiu general d'evitar contagis i ajudar a controlar la transmissió de la malaltia.

Aquesta actualització de la guia no entrarà en temes que ja estan tractats en altres documents oficials (i als quals es farà referència quan calgui) sinó que pretén aclarir les actuacions (algunes voluntàries, altres no) a desenvolupar pels SPRL i respondre a possibles dubtes.

La cooperació i actuació dels SPRL ve avalada per la normativa vigent, en especial per:

- Rd 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. L'article 38, de col·laboració dels serveis de prevenció amb el Sistema Nacional de Salut, estableix que:
  1. D'acord amb el que estableixen l'article 10 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i l'article 21 de la Llei 14/1986, general de sanitat, el servei de prevenció ha de col·laborar amb els serveis d'atenció primària de salut i d'assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de malalties relacionades amb el treball, i amb les administracions sanitàries competents en l'activitat de salut laboral que es planifiqui. Les unitats responsables de salut pública de l'àrea de salut, que defineix la Llei general de sanitat, són les competents per a la coordinació entre els serveis de prevenció que actuïn en aquesta àrea i el sistema sanitari. Aquesta coordinació ha de ser desplegada per les comunitats autònomes en l'àmbit de llurs competències.
  2. El servei de prevenció col·laborarà en les campanyes sanitàries i epidemiològiques organitzades per les Administracions públiques competents en matèria sanitària.
- Rd 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.

L'article 3, que tracta de les activitats sanitàries dels serveis de prevenció, en el seu punt i) indica com activitat, col·laborar amb el Sistema Nacional de Salut, tal i com estableix l'article 38 del Reglament dels serveis de Prevenció.

En el punt k) indica com activitat, participar en qualsevol altra funció que l'autoritat sanitària li atribueixi en el marc de la col·laboració establerta en els articles 38 i 39 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

També cal tenir en compte el document ***Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2*** del Ministerio de Sanidad.

En qualsevol activitat que dugui a terme el servei de prevenció s'ha de tenir en compte, en primer lloc, la seguretat i salut dels propis treballadors, aplicant les mesures establertes per la normativa de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de les autoritats sanitàries i de salut pública.

En el context actual hi ha una gran quantitat de guies, procediments i documentació que canvien ràpidament amb el temps. En cas de dubte, els SPRL seguiran les indicacions del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral (SCASL), de la Sub-direcció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública. També cal tenir en compte l'assessorament que donen les Unitats de Salut Laboral (USL) distribuïdes pel territori (veure adreces de contacte a l'annex 3).

## 2 Definicions

L'actual situació comporta canvis en la gestió de casos i contactes. En aquesta fase és important la detecció precoç de qualsevol persona que pugui tenir infecció activa i que pugui transmetre la malaltia així com la identificació i seguiment dels contactes estrets per tal d'evitar un increment en el nombre de casos.

Segons el [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):

- **Cas sospitós d'infecció:** qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes atípics com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS\_CoV-2 se li ha de fer una PCR (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.

- **Cas confirmat amb infecció activa:**

- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.
- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia d'alt rendiment (no per test ràpids).
- Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada.
- **Cas confirmat amb infecció resolta:** Persona asimptomàtica amb serologia IgG positiva independentment del resultat de la PCR.
- **Cas probable:** Persona amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb COVID-19 i amb resultats de PCR negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, ja sigui en l'àmbit de centres tancats o en l'àmbit familiar, o els casos sospitosos amb PCR no concloent. Per al maneig de casos probables es seguiran les mateixes indicacions que per als casos confirmats.
- **Cas descartat:** Cas sospitós amb PCR negativa i IgM també negativa, si aquesta prova s'ha realitzat, en el qual no hi ha una alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.
- **Contacte estret.** Es considerarà com a contacte estret:
  - Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
  - Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas a una distància inferior a 2 metres (ex. convivents, visites i altres tipus de contactes esporàdics: sexuals, companys d'oci...) durant almenys 15 minuts.
  - Es considera contacte estret en un avió, tren o un altre mitjà de transport terrestre de llarg recorregut (sempre que sigui possible l'accés a la identificació dels viatgers) els passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d'un cas, i a la tripulació que hagi tingut contacte amb el cas esmentat.

## 3 Actuacions

### 3.1 Servei telefònic de consulta

Els serveis de prevenció, tant propis com aliens, poden contribuir a informar sobre les mesures a prendre per afrontar la pandèmia de COVID-19, actuant de forma complementària als serveis d'informació telefònica (061) i a la informació accessible a les pàgines web, i a la resta del sistema sanitari. Es proposa que els SPRL estableixin un servei telefònic de consulta per als seus propis treballadors i pels treballadors de les empreses clients pel que fa a la pandèmia de COVID-19. No es tracta, per tant, de substituir al 061 rebent trucades de qualsevol persona i sobre qualsevol tema, sinó de donar un suport dirigit als treballadors propis i d'empreses clients pel que fa a l'actuació enfront del nou coronavirus.

Els serveis de prevenció que optin per aquest servei han de:

- Establir un telèfon o telèfons de contacte per a fer les consultes, establir l'horari de prestació del servei i dies de servei.
- Organitzar el servei amb els seus professionals.
- Donar a conèixer el servei als treballadors propis i de les empreses clients pels mitjans que es considerin més idonis.
- Seguir les recomanacions i instruccions dels procediments i guies establertes per l'autoritat sanitària, en especial la versió sempre més actual disponible del [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).
- En el cas de treballadors/es que presentin un quadre clínic o simptomatologia compatible amb la definició de cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2, s'indicarà que se li ha de realitzar una PCR (o la tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores, ja sigui pel propi SPRL (si en té la possibilitat) o a través del seu centre d'atenció primària amb el qual s'haurà de posar en contacte (i si no pot amb el 061). Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera dels resultat de la PCR.

## 3.2 Estudi i maneig de casos i contactes

En aquesta fase és molt important la detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i detectar els seus contactes estrets per poder controlar la transmissió de la malaltia i evitar rebrots.

Els SPRL han de col·laborar amb les autoritats sanitàries en aquesta detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes i en la seva notificació.

### 3.2.1 Estudi i maneig de casos

Els SPRL han de col·laborar en la detecció d'aquests casos, donant suport a la tasca que es fa des dels serveis d'atenció primària i hospitalària i contribuint al sistema d'informació de vigilància epidemiològica.

El SPRL, quan detecti un cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2 li indicarà que ha de fer aïllament domiciliari i se li ha de realitzar una PCR (o tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24h. El SPRL pot fer-ho, sempre que disposi de mitjans per obtenir les mostres i enviar-les a un laboratori autoritzat. En cas que no sigui possible, la confirmació s'haurà de fer des de l'atenció primària, amb la qual haurà de contactar la persona afectada.

Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament en espera del resultat de la PCR i s'iniciarà la identificació dels seus contactes.

Dels casos sospitosos i confirmats (per part del SPRL) s'haurà de recollir i notificar diàriament la informació que consta a l'annex 2 del [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).

Segons indicacions de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP), els SPRL hauran d'enviar la informació per correu electrònic al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen) amb còpia al SCASL a l'adreça salut\_laboral\_aspcat@gencat.cat. A l'annex 2 hi ha la llista d'adreces dels SVE.

Pel maneig dels casos es seguirà el que estableix [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).

A l'annex 1.1 hi ha un model d'informe, dirigit al metge d'atenció primària i que s'ha de lliurar a la persona afectada, perquè el SPRL acrediti la necessitat d'aïllament preventiu del cas i facilitar així la tramitació de la Incapacitat temporal per part del servei públic de salut.

### 3.2.2 Estudi i maneig de contactes

Els SPRL seran els encarregats d'establir els mecanismes per la investigació i seguiment de contactes estrets laborals d'aquells casos sospitosos i confirmats, de les empreses a les quals donen servei, de manera coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica, seguint els criteris establerts en el [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).

L'estudi de contactes s'iniciarà en el moment que es detecti un cas sospitós. Si la PCR del cas sospitós és negativa s'aturarà la identificació i control de contactes. El període a considerar per a la detecció de contactes és des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas i fins el moment en que aquest és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de diagnòstic.

A tots els contactes estrets de casos confirmats se'ls ha de recollir les dades epidemiològiques bàsiques mitjançant el formulari inclòs a l'annex 4 del [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#) de l'ASPCAT. Els annexos s'han d'enviar, per correu electrònic al SVE corresponent (al del municipi del pacient i també al del municipi de l'empresa si no coincideixen) amb còpia al SCASL a l'adreça salut\_laboral\_aspcat@gencat.cat. Les dades Codi de cas i Codi de contacte NO les ha d'omplir el SPRL.

De forma general, qualsevol persona asimptomàtica que compleixi la definició de contacte estret d'un cas confirmat n'ha de ser informada del fet, se li ha de comunicar que ha de romandre en quarantena al domicili durant un període de 14 dies des de l'últim contacte amb el cas. A més se li faran les recomanacions que consten, per a les persones que són contacte estret d'un cas confirmat, en el [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).



Per tal de detectar precoçment nous casos positius es pot realitzar la PCR als contactes estrets, prioritzant els contactes que siguin persones vulnerables o d'àmbits d'especial risc (immunocompromesos i poblacions amb patologia associada, embarassades, personal sanitari o sociosanitari, interns de residències o presons). L'estratègia més efectiva seria realitzar la PCR en el moment de la identificació del contacte, independentment del temps transcorregut des de l'última exposició al cas. Amb l'objectiu de poder reduir la duració de la quarantena, podria realitzar-se una PCR transcorreguts 10 dies de l'últim contacte amb el cas, podent suspendre la quarantena si el resultat és negatiu. Els SPRL ho poden fer sempre que disposin de mitjans per obtenir les mostres i enviar-les a un laboratori autoritzat.

En situació de brot epidèmic (qualsevol agrupació de 3 o més casos confirmats o probables amb infecció activa en els quals s'ha establert un vincle epidemiològic) es farà PCR a tots els contactes estrets el dia 0 i es repetirà la PCR el dia 10.

Sempre que procedeixi un període de quarantena el SPRL, en la seva funció de col·laboració per fer front al nou coronavirus i en la gestió de la incapacitat temporal (IT), lliurarà a la persona afectada un document (annex 1.1) que confirmi la procedència d'aquest aïllament. Aquest informe és preceptiu perquè el Sistema Públic de Salut pugui donar la baixa. Per a això, la persona afectada s'haurà de posar en contacte, preferentment per telèfon o per mitjans telemàtics, amb el seu CAP.

### **3.3 Persones vulnerables i treballadors especialment sensibles en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2**

El SPRL ha de determinar la presència de personal amb condicions d'especial vulnerabilitat en relació amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (aquells treballadors que per les seves característiques o estat de salut, d'acord amb criteris epidemiològics i clínics, poden tenir una major probabilitat de patir COVID-19 si s'exposen al SARS-CoV-2 o presentar una evolució clínica més desfavorable en cas de patir la COVID-19) i avaluar el nivell de risc al que poden estar exposats per tal de considerar-los treballadors especialment sensibles i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent la possible reubicació a un altre lloc de treball i el teletreball.

En el document de consens de l'Associació Catalana de Salut Laboral *de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/res especialment sensibles enfront el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya en el context de la pandèmia*<sup>1</sup>, es diferencia conceptualment les persones especialment vulnerables (PEV), dels treballadors especialment sensibles (TES): *ser considerada PEV amb relació a la COVID-19 no suposa ser considerat TES d'acord amb l'article 25 de la LPRL. Hi ha un element clau que és el*

---

1 Arch PrevRiesgos Labor. 2020;23(2):253-271

“risc laboral” al que s’ha d’exposar i que hauria d’estar específicament avaluat i del qual l’empresa l’ha de protegir.

El Ministerio de Sanidad, d’acord amb l’evidència científica a 2 de juny de 2020 i el principi de precaució, ha definit com grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, insuficiència renal crònica, malaltia hepàtica crònica severa, càncer en fase de tractament actiu, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys. Aquests grups poden variar en funció de les noves evidències.

La decisió final sobre què fer amb els treballadors que puguin estar inclosos en aquests grups vulnerables ha de ser fruit d’una avaluació individual que tingui en compte l’estat de salut de la persona així com les condicions de treball i tasques a realitzar i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

En el document [Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2](#), en els seus annexos 4 i 5 hi ha les guies per facilitar, de forma general, la gestió de la vulnerabilitat a l’àmbit sanitari i sociosanitari i als àmbits no sanitaris.

Si després de la valoració individualitzada, el SPRL considera que la persona treballadora és especialment sensible i requereix una incapacitat temporal emetrà un informe (annex 1.2 ). Aquest informe, que és preceptiu perquè els metges del sistema públic de salut emetin el comunicat de baixa, s’enviarà preferentment a l’ICAM, a la bústia de correu electrònic de la província que correspongui habilitada per a aquest fet, donant coneixement previ a la persona afectada i fent-li arribar una còpia del document:

Barcelona: [\*\*bustia.sgam@gencat.cat\*\*](mailto:bustia.sgam@gencat.cat)

Tarragona: [\*\*icam.tarragona.salut@gencat.cat\*\*](mailto:icam.tarragona.salut@gencat.cat)

Lleida: [\*\*bustiaicam.lleida@gencat.cat\*\*](mailto:bustiaicam.lleida@gencat.cat)

Girona: [\*\*icam.girona.salut@gencat.cat\*\*](mailto:icam.girona.salut@gencat.cat)

El SPRL informarà de les actuacions anteriors a l’empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut en el treball, si n’hi haguessin, guardant la deguda confidencialitat.

### **3.4 Realització de proves de diagnòstic microbiològic**

L’aplicació i la realització de proves diagnòstiques s’ha de fer d’acord amb les indicacions que estableixen els protocols i procediments de les autoritats sanitàries, i en especial el document *Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del*

COVID-19 en el àmbit de las empresas del Ministerio de Sanidad i, per tant, els SPRL han de limitar la realització de proves diagnòstiques als àmbits d'actuació que s'hi descriuen (tant pel que fa al diagnòstic precoç de casos d'infecció com a les estratègies de retorn al treball).

En el moment actual no es recomana la realització de PCR a persones asimptomàtiques fora de determinades estratègies de cribatge plantejades dins del sistema sanitari per a la detecció precoç de casos entre els contactes o en poblacions vulnerables en el context de brots.

Segons l'evidència actual l'OMS i les autoritats sanitàries, només recomanen l'ús de tests ràpids en determinades situacions i estudis i amb finalitats d'investigació. Les tècniques de detecció ràpida d'antígens o anticossos no es consideren adequades per al diagnòstic d'infecció aguda. Tampoc la serologia tipus ELISA o altres tècniques d'immunoassaig d'alt rendiment estan indicades per sí soles per al diagnòstic en la fase aguda de la malaltia.

En el moment actual es pot plantejar la realització d'estudis de cribatge mitjançant tests serològics en poblacions vulnerables o en aquelles poblacions amb major risc d'exposició per a detectar aquelles persones que han passat la infecció d'acord amb el que estableix el [Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2](#).

En cas, però, que una empresa, mitjançant el seu SPRL i laboratoris autoritzats, decideixi fer tests ràpids o altres proves microbiològiques fora de les indicacions de les autoritats sanitàries, ha de poder fer les proves de diagnòstic microbiològic que siguin necessàries per acabar el procés d'interpretació de resultats i diagnòstic i la presa de decisions que se'n derivi.

## ANNEX 1. MODELS D'INFORMES

### 1. INFORME DE CONFIRMACIÓ D'AILLAMENT DOMICILIARI/QUARANTENA EN CAS SOSPITÓS, CONFIRMAT O CONTACTE ESTRET

INFORMACIÓ DIRIGIDA AL METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNI .....metge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL..... informa que el Sr./Sra. ...., amb DNI ..... professió/ocupació..... a l'empresa ..... compleix criteris per a ser considerat/da:

- cas sospitós
- cas confirmat
- contacte estret d'un cas confirmat de coronavirus,

Per la qual cosa, seguint els criteris de les autoritats sanitàries, haurà de realitzar quarantena/aïllament domiciliari durant 10 dies/quarantena domiciliària durant 14 dies , comptats des del dia....., data en la qual es va produir la manifestació clínica o el contacte. Aquesta persona ha estat informada de les mesures a adoptar d'acord amb el que estableix el *Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament* del Departament de Salut.

Lloc i data

Signatura

## 2. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. NECESSITAT D'IT

### INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNI .....metge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra. ...., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació.....a l'empresa....., relació amb la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

La persona pateix<sup>1</sup>....., que actualment es troba<sup>2</sup> ....., presentant comorbiditats Sí  NO

Sobre la base dels annexos 4 o 5 del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad, el seu lloc de treball està en un nivell de risc<sup>3</sup>.....Com que no hi ha possibilitat d'adaptació del lloc de treball (incloent el teletreball), de protecció adequada que eviti el contagi o de reubicació en un altre lloc exempt de risc d'exposició a l'empresa es considera que hauria de passar a situació d'incapacitat temporal.

Lloc i data,

Signatura

**1 Per confidencialitat, especificar grup de malaltia (no patologia concreta) o condició**

**2 Compensada/ descompensada**

**3 Baix (1), mitjà (2), alt (3), molt alt(4)**

### 3. INFORME EN CAS D'ESPECIAL SENSIBILITAT. FI DE LA NECESSITAT D'IT

#### INFORMACIÓ DIRIGIDA A L'ICAM/ METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Sr. /Sra....., amb núm. de col·legiat/da.....i DNI .....metge/essa especialista en medicina del treball del servei de PRL.....informa que el Sr./Sra. ...., de.....anys, amb DNI.....professió/ocupació.....a l'empresa....., d'acord amb els criteris del *Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2* del Ministerio de Sanidad (de data.....), no és necessari que continuï en situació d'incapacitat temporal per:

no pertànyer als grups vulnerables establerts actualment en el citat *Procedimiento*

millora de les condicions de treball i/o adaptació del lloc/reubicació en un altre lloc de treball i/o millora de les mesures preventives

Lloc i data,

Signatura

## **ANNEX 2.**

### **SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA TERRITORIALS I SERVEI D'URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)**

#### **Sub-direcció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública**

**Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)**

Telèfon: 93 551 3693 / 93 551 3674  
epidemiologia@gencat.cat

#### **Agència de Salut Pública de Barcelona**

(Barcelona ciutat) Servei d'Epidemiologia  
Pl. Lesseps, 1 08023 Barcelona  
Telèfon 932 384 545 (centraleta) A/e mdo@aspb.cat

#### **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme**

C. Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)  
08005 Barcelona  
Telèfon 935 513 900 (centraleta) A/e uve.bnm@gencat.cat

#### **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud**

C. Feixa Llarga, s/n – 3a planta Antiga Escola d'Infermeria, 3a pl.  
(Hospital Universitari de Bellvitge)  
08907 L'Hospitalet de Llobregat  
Telèfon 932 607 500 (centraleta) A/e barcelonasud@gencat.cat (brots, MDI)

#### **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental**

Ctra. Vallvidrera, 38  
08173 Sant Cugat del Vallès  
Telèfon 936 246 432  
A/e epi.valles@gencat.cat

## **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central**

C. Muralla del Carme, 7, 5a pl.  
08241 Manresa  
Telèfon 938 753 381 (centraleta)  
A/e uvercc@gencat.cat

## **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona**

Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)  
17002 Girona  
Telèfon 872 975 666 (centraleta)

A/e epidemiologia.girona@gencat.cat **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran**

C. Alcalde Rovira Roure, 2  
25006 Lleida  
Telèfon 973 701 600 (centraleta)  
A/e epidemiologia.lleida@gencat.cat

## **Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre**

Av. Maria Cristina, 54  
43002 Tarragona  
Telèfon 977 22 41 51 (centraleta)  
A/e epidemiologia.tarragona@gencat.cat

## **Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre**

Plaça Gerard Vergés, 1  
43500 Tortosa  
Telèfon 977 495512  
A/e epidemiologia.ebre@gencat.cat

## **Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)**

Telèfon: 627 480 828. ( Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i festius).



## **ANNEX 3. SERVEI DE COORDINACIÓ D'ACTUACIONS DE SALUT LABORAL I UNITATS DE SALUT LABORAL**

### **Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral**

Edifici Salvany. Roc Boronat 81-95 (08005 Barcelona)

Telèfon: 93 551 39 00 (centraleta)

A/e: [salut\\_laboral\\_aspcat@gencat.cat](mailto:salut_laboral_aspcat@gencat.cat)

### **USL Barcelona**

Pl. Lesseps, 1, 4a (08023 Barcelona)

Telèfon 93 238 45 65 / Fax: 93 238 45 58

A/e: [usl@aspb.cat](mailto:usl@aspb.cat) / [usl.barcelona@gencat.cat](mailto:usl.barcelona@gencat.cat)

### **USL Barcelonès Nord - Maresme**

C. Sant Anàstasi, 69 (08911 Badalona)

Telèfon: 93 464 84 64 / Fax: 93 502 90 14

A/e: [usl.bnordimaresme@gencat.cat](mailto:usl.bnordimaresme@gencat.cat)

### **USL Costa de Ponent**

C. Rossell, 4-6 (08902 Hospitalet de Llobregat)

Telèfon: 93 332 46 93 / Fax: 93 332 47 00

A/e: [usl.costaponent@gencat.cat](mailto:usl.costaponent@gencat.cat)

### **USL Vallès**

Ronda dels Pinetons, 8 (08100 Mollet del Vallès)

Telèfon: 93 563 61 00 – 93 563 61 30 / Fax: 93 576 03 20

A/e: [usl.valles@gencat.cat](mailto:usl.valles@gencat.cat)

## **USL Catalunya Central**

C. Flor de Lis, 33 (08242 Manresa)  
Telèfon 93 873 25 50 / Fax: 93 873 21 08

A/e: [usl.catalunyacentral@gencat.cat](mailto:usl.catalunyacentral@gencat.cat)

## **USL Girona**

C. Maluquer Salvador, 11 (17002 Girona)  
Telèfon: 972 94 14 01 – 972 48 79 38 / Fax: 972 21 41 00

A/e: [usl.girona@gencat.cat](mailto:usl.girona@gencat.cat)

## **USL Lleida i Alt Pirineu i Aran**

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 2 (25006 Lleida)  
Telèfon: 973 23 67 98 – 973 70 16 00 ext. 176

A/e: [usl.lleida@gencat.cat](mailto:usl.lleida@gencat.cat)

## **USL del Camp de Tarragona**

CAP Llibertat

C. General Moragues, 52, 2a planta (43201 Reus)  
Telèfon: 977 32 01 07 / Fax: 977 31 73 80

A/e: [usl.reus@gencat.cat](mailto:usl.reus@gencat.cat) i [usl.tarragona@gencat.cat](mailto:usl.tarragona@gencat.cat)

## **USL Terres de l'Ebre**

Avda. Ports de Caro, s/n (43520 Roquetes)  
Telèfon: 667 118 137

A/e: [usl.ebre@gencat.cat](mailto:usl.ebre@gencat.cat)